


الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم
الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم




ملخص (النور) مادة العلوم

لصف الثالث متوسط

الفصل الدراسي الأول

لعام ١٤٣٢ هـ / ١٤٣٣ هـ

معلم المادة : أ- عدنان امالكي



فهرس المحتويات

١. أسلوب العلم	الفصل الأول	الوحدة الأولى
٢. عمل العلم		
٣. العلم والتقنية والمجتمع		
٤. الزلازل	الفصل الثاني	الوحدة الثانية
٥. البراكين		
٦. الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين		
٧. نماذج الذرة	الفصل الثالث	الوحدة الثالثة
٨. الذرة		
٩. مقدمة في الجدول الدوري	الفصل الرابع	
١٠. العناصر الممثلة		
١١. العناصر الانتقالية		
١٢. اتحاد الذرات	الفصل الخامس	الوحدة الرابعة
١٣. ارتباط العناصر		
١٤. الصيغ والمعادلات الكيميائية	الفصل السادس	
١٥. سرعة التفاعلات الكيميائية		

(الدرس الأول : أسلوب العلم)

١. تعريف العلم	هو طريقة أو عملية تستخدم لاكتشاف ما حولك ويوفر إجابات لتساؤلاتك
٢. تعريف التقنية	هي تطبيق العلم لصناعة منتجات وأدوات يستخدمها الناس

- استخدام الحواس فقط قد يؤدي إلى فهم غير صحيح في تفسير المشكلات والظواهر
- يجب استخدام الأدوات والأجهزة العلمية للحصول على قياسات رقمية
- استخدام المعرفة السابقة لتوقع نتائج الاستقصاء وعدم إهدار الوقت
- الاستفادة من التقنية للحصول على المعلومات وتحليل البيانات
- وضع النظريات بعد اختبار الفرضيات عدة مرات
- التواصل مع الآخرين ونقل ما توصلت إليه

□ مهارات العلم الأساسية :-

١- الملاحظة

٢- القياس

٣- المقارنة

(الدرس الثاني : عمل العلم)

 تحديد المشكلة :

 حل المشكلات :

- تعريف الطرائق العلمية : هي خطوات تتبع لحل المشكلات
- هناك طريقتان لحل المشكلات

١. البحث الوصفي : هو بحث يجيب عن الأسئلة من خلال الملاحظات

٢. البحث التجريبي : هو بحث يجيب عن الأسئلة من خلال اختبار الفرضيات (التجربة)


 أولاً / البحث الوصفي

يعتمد البحث الوصفي على :-

- تحديد الهدف من البحث
- الخطوات المتبعة (تصميم البحث)
- الموضوعية : و ذلك بالابتعاد عن التحيز من خلال
- تحويل البيانات إلى قياسات رقمية
- استخدام عينات عشوائية

 الأجهزة والمواد والنماذج :

- اختيار الأجهزة العلمية والأدوات المناسبة
- استخدام النماذج

تعريف النماذج	هي أشياء تحدث ببطء شديد أو بسرعة كبيرة قد تكون كبيرة أو صغيرة
فائدة النماذج	توفير الوقت والمال
أمثلة على النماذج	الرسوم البيانية ، الجداول ، الرسوم ثلاثية الأبعاد في الحاسوب

 القياسات العلمية :

القياس	الوحدة	الرمز	يساوي
الطول	(١) ملي متر	ملم	(٠,٠٠١) م
	(١) سنتيمتر	سم	(٠,٠١) م
	(١) متر	م	١٠٠ سم
	(١) كيلو متر	كم	١٠٠٠ م
حجم السائل	(١) ملي لتر	مللتر	٠,٠٠١ لتر
	(١) لتر	لتر	١٠٠٠ ملي لتر
الكتلة	(١) ملي جرام	ملجزم	٠,٠٠١ جم
	(١) جرام	جم	١٠٠٠ ملي جرام
	(١) كيلو جرام	كجم	١٠٠٠ جم
	(١) طن	طن	١٠٠٠ كجم

النظام العالمي (SI) لوحدات القياس

 البيانات :

- تكون البيانات في صورة منظمة على هيئة
- أ- جداول البيانات

ب- الرسوم البيانية

 استخلاص النتائج : ولها حالتان

- النتائج تدعم توقعك
- النتائج لا تدعم توقعك فيتم الاحتفاظ بها للاستفادة منها في مجال آخر

ثانيا / البحث التجريبي

• تكوين فرضية

تعريف الفرضية : هو توقع أو تخمين قابل للاختبار

• المتغيرات

تعريف المتغير المستقل	هو عامل يتغير أثناء التجربة
تعريف المتغير التابع	هو عامل يمكن قياسه أثناء التجربة
تعريف الثابت	هو عامل لا يتغير أثناء التجربة
تعريف العينة الضابطة	هي عينة لا تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتعامل مثل بقية المجموعات التجريبية

• عدد المحاولات (إجراء التجربة عدة مرات لتكون النتائج أكثر دقة)

• تحليل النتائج

• التواصل مع علماء آخرين ونقل ما توصلوا إليه




أستاذة أمالبي

(الدرس الثالث : العلم والتقنية والمجتمع)

تعريف تقنية المعلومات هي وسائل يستخدمها العلماء أو الناس ليتواصلوا مع الآخرين مثل الهاتف النقال والحواسيب والانترنت

- تؤدي الاكتشافات الجديدة إلى تقنيات جديدة توفر لحياتك أكثر رفاة وأكثر صحة
- تؤدي تقنية المعلومات إلى انتشار المعلومات على نطاق واسع من العالم
- يساهم تطور التقنية في تغيير بعض النظريات القديمة




(الدرس الأول: الزلازل)

- تعريف المطاوعة : [هو تعرض الصخور لقوة كافية ليتغير شكلها]
- تعريف الارتداد المرن : [هو عودة حواف الأجزاء المكسورة سريعاً إلى مكانها الأصلي بعد انكسارها]
- تعريف الزلازل : [هي اهتزازات ناتجة عن تكسر حركة الصخور وتنتقل من باطن الأرض إلى السطح]

□ الصدوع وأنواعها :

تعريف الصدع : هو كسر يحدث في الصخور نتيجة حركتها


سببها	أنواع الصدوع
قوى الشد	١. الصدع العادي
قوى الضغط	٢. الصدع العكسي
قوى القص	٣. الصدع الجانبي أو الإنزلاقي (المضربي)



□ الموجات الزلزالية :


- تعريف الموجات الزلزالية : هي تلك الموجات التي يتكون منها الزلازل وتشمل الموجات الأولية والثانوية والموجات السطحية
- تعريف بؤرة الزلزال : هي نقطة تقع في باطن الأرض تتحرر عندها الطاقة مسببة هزة أرضية
- تعريف المركز السطحي للزلزال : هي نقطة تقع على سطح الأرض فوق بؤرة الزلزال مباشرة

مميزاتها	أنواع الموجات الزلزالية
<ul style="list-style-type: none"> • تهتز جزيئات الصخر في نفس اتجاه حركة الموجة • تكون في باطن الأرض • موجات سريعة جدا 	١. موجات أولية (P)
<ul style="list-style-type: none"> • تهتز جزيئات الصخر عمودياً على اتجاه حركة الموجة • تكون في باطن الأرض • أقل سرعة من الموجات الأولية 	٢. موجات ثانوية (S)
<ul style="list-style-type: none"> • حركتها معقدة (ناتجة من حركة الموجتان الأولية والثانوية) • أقل سرعة من الموجات الأولية والثانوية (بطيئة) • تكون على سطح الأرض • تمتد لمسافات طويلة • ينتج عنها معظم الدمار الذي يحصل على سطح الأرض • سعتها أكبر من سعة الموجات الأولية والثانوية 	٣. موجات سطحية



• كيفية تحديد المركز السطحي للزلزال :

1. عن طريق حساب بعد محطة الرصد عن موقع الزلزال من خلال معرفة زمن وصول الموجات الزلزالية
2. كلما زاد الفرق في الزمن بين الموجتين الأولية والثانوية كلما زاد بعد محطة الرصد عن موقع المركز السطحي للزلزال
3. باستخدام بيانات ثلاث محطات رصد ورسم دائرة حول محطة الرصد نصف قطرها هو بعد محطة الرصد عن المركز السطحي للزلزال
4. النقطة التي تلتقي عندها الدوائر الثلاث تمثل [المركز السطحي للزلزال]



□ أجهزة قياس الزلازل :

الجزء	الوظيفة	التعريف
1. مقياس رختر [السيزموجراف]	قياس قوة الزلزال	<ul style="list-style-type: none"> ○ تعريف قوة الزلزال : هي مقدار الطاقة المتحررة من الزلزال ○ تعريف السيزموجراف : هو جهاز يستخدم لقياس الموجات الزلزالية 
2. مقياس ميركالي	قياس شدة الزلزال	<ul style="list-style-type: none"> ○ تعريف شدة الزلزال : هو مقدار التدمير الجيولوجي والبنائي للزلزال

□ التسونامي :

- تعريف التسونامي : هو موجة زلزالية بحرية تحدث في قاع المحيط ولها القدرة على إحداث تدمير كبير
- مراحل تطور التسونامي :
 1. حدوث صدع (كسر) في قاع المحيط
 2. ينتج عن هذا الكسر تكون موجة في مكان الكسر تنتقل عبر المحيط بسرعة تتراوح بين 500 إلى 950 كم / ساعة
 3. في نفس اللحظة التي تكونت فيها الموجة الناتجة في موقع الكسر يحدث انحسار لمياه الشاطئ
 4. عند تقدم الموجة نحو الشاطئ تقل سرعتها نتيجة الاحتكاك بقاع البحر مما يؤدي على تراكم هذه الموجات وتجمعها وتكون موجة قد يصل ارتفاعها إلى 30 م

□ السلامة من الزلازل :

1. وضع الأشياء الثقيلة في الرفوف المنخفضة
2. وضع حساسات تقفل خطوط الغاز تلقائياً
3. استخدام أنابيب للغاز والماء يمكن أن تنتهي (مرنة) وبالتالي منع كسرها
4. تزويد المباني بدعائم مطاطية ماصة للصدمات وكذلك دعائم فولاذية قوية تتحمل الهزات الأرضية
5. التنبؤ بحدوث الزلازل من خلال الملاحظات والدراسات ومحطات رصد الزلازل

(الدرس الثاني: البراكين)

□ تعريف البركان :

[هو جبل قمعي على سطح الأرض تتدفق منه الماجما الساخنة والمواد الصلبة والغازات إلى سطح الأرض عبر الفوهة]

□ تعريف اللابة : [هي صخور منصهرة تتدفق على سطح الأرض عبر الفوهة]




□ مخاطر البراكين :

١. تدمير المدن والقرى

٢. إغلاق الموانئ والمطارات (حجب الرؤية بسبب الدخان)

٣. تلوث الهواء (بسبب الغازات السامة .. غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره ومن الغازات الأخرى)

أشكال البراكين

مثال	المميزات والخصائص	أشكال البراكين	على شكل جبال وتأخذ شكل
(بركان حرة ثيان) شمال المملكة العربية السعودية	<ul style="list-style-type: none"> • غنية بالحديد و الماغنسيوم • تحوي على نسبة قليلة من السليكا • قليلة للزوجة • نشاطها البركاني ضعيف (هادئ) • حجمها كبير • قليلة الانحدار 	١. البراكين الدرعية	على شكل جبال وتأخذ شكل
(بركان حرة البرك)	<ul style="list-style-type: none"> • تحوي على نسبة عالية من السليكا • لزوجتها عالية • نشاطها البركاني قوي إلى متوسط • حجمها صغير • متوسطة الانحدار إلى شديدة الانحدار 	٢. البراكين المخروطية	على شكل جبال وتأخذ شكل
(بركان جبل القدر)	<ul style="list-style-type: none"> • تحوي على نسبة متوسطة من السليكا • متوسطة اللزوجة • نشاطها البركاني قوي إلى متوسط • شديدة الانحدار • متوسطة الحجم 	٣. البراكين المركبة	على شكل جبال وتأخذ شكل
(حرة رهط)	<ul style="list-style-type: none"> • تكون الماجما ذات سيولة عالية وتنساب بسهولة • تغطي اكبر مساحة من سطح الأرض 	١. ثوران الشقوق (البراكين الشقية)	على شكل جبال وتأخذ شكل

الفصل الثاني

الوحدة الأولى

(الدرس الثالث: حركة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين)



١. الغلاف الصخري : هو عبارة عن الصفائح الأرضية المكونة من القشرة الأرضية والجزء العلوي من الستار (الوشاح).
٢. الغلاف المائع : هو طبقة لدنة من الستار (الوشاح).
٣. الصفيحة : هي قطع من الغلاف الصخري .
٤. حفر الانهدام : هي شقوق طويلة ناتجة من تباعد الصفائح الأرضية بعضها عن بعض .
٥. البقعة الساخنة : هي مادة ناتجة من الصخور المنصهرة والمندفعة من باطن الأرض إلى سطح الأرض .

□ الفرضية المفسرة لحركة الصفائح :


حركة الصفائح ناتجة عن تيارات الحمل المتولدة في منطقة الستار (الوشاح) والتي يتم تسخينها من لب الأرض

□ أنواع الصفائح الأرضية :

نوع الصفائح	الموقع	الخصائص والمميزات
١. صفيحة محيطية	تقع أسفل المحيط	أكبر كثافة وأقل سمك من الصفائح القارية
٢. صفيحة قارية	تقع أسفل القارات	أقل كثافة وأكبر سمك من الصفائح المحيطية

حدود الصفائح


تعريف حدود الصفائح : [هي الحدود الفاصلة بين الصفائح الأرضية] وتقسم حسب حركتها إلى :



□ ملاحظات هامة :

- ١- تتشكل معظم البراكين على حدود الصفائح (المتباعدة والمتقاربة) و (البقع الساخنة) .
- ٢- من الأمثلة على البقع الساخنة (ما يحدث أسفل جزر هاواي) .
- ٣- تتحرك صفيحة المحيط الهادي باتجاه الشمال والشمال الغربي .
- ٤- تتحرك الصفيحة العربية (الجزيرة العربية) بشكل دوراني باتجاه الشمال الشرقي .
- ٥- يتركز النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة العربية السعودية على امتداد البحر الأحمر وحتى خليج العقبة وتمثل هذه المناطق حدود تباعد بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية ومن أمثلة تلك الحرات (حرة رهط) و (الشاقة) .
- ٦- تم دراسة باطن الأرض اعتماداً على الموجات الأولية والثانوية واختلاف سرعتها حسب نوع الوسط (صلب أو سائل) ، وتوصل العلماء من خلال تجاربهم إلى :

الوسط	كثافته	سرعة الموجات الأولية (P)
القشرة	٢,٨ جم / سم ^٣	٦ كم / ثانية
أعلى الستار	٣,٣ جم / سم ^٣	٨ كم / ثانية



✓ مثال (١) :

احسب الزمن الذي تستغرقه موجات (P) للانتقال مسافة ٣٠٠ كم في الستار العلوي ؟

المطلوب :	المعطيات :
الزمن = ؟؟؟؟	المسافة = ٣٠٠ كم سرعة الموجة الأولية في الستار العلوي = ٨ كم / ث

الحد :

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \text{الزمن}$$

$$\frac{٣٠٠}{٨} = \text{الزمن} = ٣٧,٥ \text{ ث}$$

✓ مثال (٢) :

احسب الزمن الذي تستغرقه موجات (P) للانتقال مسافة ٥٠٠ كم في القشرة ؟

المطلوب :	المعطيات :
الزمن = ؟؟؟؟	المسافة = ٥٠٠ كم سرعة الموجة الأولية في القشرة = ٦ كم / ث

الحد :

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \text{الزمن}$$

$$\frac{٥٠٠}{٦} = \text{الزمن} = ٨٣,٣ \text{ ث}$$

(الدرس الأول : نماذج الذرة)


□ الآراء القديمة حول بنية المادة :

- المادة تتكون من جسيمات صغيرة أطلق عليها (الذرات) (atoms) وتعني غير قابلة للتقسيم.
- الآراء القديمة حول بنية الذرة قائمة على التفكير المجرد والجدل والمناقشات بعيد عن التجارب العملية

- **تعريف العنصر :** هو مادة تتكون من نوع واحد من الذرات غير قابل للتقسيم أو التجزئة
- **أمثلة :** عنصر الحديد ، عنصر النحاس ، عنصر الأكسجين ، عنصر الكربون

□ نموذج دالتون للذرة :

١. تتكون المادة من ذرات
٢. الذرة غير قابلة للتقسيم
٣. ذرات العنصر الواحد متشابهة
٤. ذرات العناصر المختلفة تختلف بعضها عن بعض



نموذج دالتون للذرة


نموذج دالتون: [الذرة عبارة عن كرة مصمتة ومتجانسة غير قابلة للانقسام]

□ الإثبات العلمي (تجربة وليام كروكس لإثبات نموذج دالتون) :

• الأدوات (تركيب جهاز أنبوب كروكس) :

١. أنبوب زجاجي يحوي كمية قليلة من الغاز بداخله
٢. قطعتان من مادة فلزية تسمى أحدهما (الكاثود) والأخرى (الأنود)
٣. أسلاك
٤. جسم مثبت في منتصف الأنبوب على شكل (+)

- **تعريف الكاثود (المهبط) :** [هو مادة فلزية يحمل شحنة سالبة (-)]
- **تعريف الأنود (المصعد) :** [هو مادة فلزية يحمل شحنة موجبة (+)]




الاستنتج	المشاهدة
افتراض أن التوهج الأخضر هو سيل من الجسيمات الصغيرة سميت بالأشعة المهبطية لأنها تنتج من المهبط ملحوظة : سمي أنبوب كروكس (بأنبوب الأشعة المهبطية) (CRT)	عند توصيل الأنبوب بأقطاب البطارية يتوهج الأنبوب باللون الأخضر ويظهر ظل الجسم الموجود وسط الأنبوب على الطرف المقابل (المصعد)

□ اكتشاف الجسيمات المشحونة [نموذج طومسون] :

حاول طومسون تفسير التوهج الأخضر الذي حدث في أنبوب كروكس وهل هو ضوء أم جسيمات مشحونة

الاستنتج	المشاهدة	أدوات التجربة
استنتج أن التوهج الذي حدث في أنبوب كروكس ليس ضوء وإنما جسيمات مشحونة بشحنة (سالبة) لأنها انجذبت نحو المصعد ذو الشحنة الموجبة	انحناء الشعاع عند تقريب المغناطيس من الأنبوب حتى عند استبدال المهبط بأنواع أخرى من الفلزات أو استبدال الغاز بأنواع أخرى من الغازات	١. أنبوب كروكس ٢. مغناطيس ٣. أقطاب مهبطية (الكاثود) من فلزات مختلفة وأنواع أخرى من الغازات



نموذج طومسون


نموذج طومسون: [الذرة عبارة عن كرة متعادلة من الشحنات الموجبة والسالبة]

□ نموذج رذرفورد :

أدوات التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
١. مصدر للجسيمات الموجبة (جسيمات ألفا)	١. معظم الأشعة تنفذ	معظم حجم الذرة فراغ
٢. صفيحة رقيقة من الذهب	٢. قليل من الأشعة تنحرف	هناك جسيمات موجبة الشحنة أدت إلى انحراف الأشعة
٣. شاشة فلورسنتية تتوهج بالضوء عند سقوط جسيمات مشحونة عليها	٣. قليل من الأشعة ترتد (تنعكس)	تتركز كتلة الذرة في منطقة صغيرة أطلق عليها (النواة)

تعريف جسيمات ألفا (α) :

[هي عبارة عن ذرة أيون الهيليوم وتحتوي على بروتونين ونيوترونين وهي جسيمات موجبة الشحنة]



نموذج رذرفورد للذرة

نموذج رذرفورد : [تتركز كتلة الذرة في منطقة النواة التي تحوي على البروتونات الموجبة وبقية حجم الذرة فراغ ويحوي على الإلكترونات]


النموذج النووي للذرة :

كان نموذج رذرفورد يخلو من (النيوترونات) والتي أضيفت فيما بعد ضمن مكونات النواة لمعالجة النقص في كتلة الذرة حيث وجد من خلال التجارب أن كتلة الذرة ضعف كتلة بروتوناتها وحسب هذا النموذج يصبح للذرة نواة تحوي كل من (البروتونات والنيوترونات) ويوجد خارج هذه النواة الكتلونات تدور حول النواة

- كتلة النيوترون = كتلة البروتون

جسيمات الذرة	التعريف
١. الإلكترون	هو جسيم سالب الشحنة (-) ويوجد حول النواة.
٢. البروتون	هو جسيم موجب الشحنة (+) ويوجد داخل النواة.
٣. النيوترون	هو جسيم متعادل (لا يحمل شحنة موجبة ولا شحنة سالبة) وكتلته تساوي كتلة البروتون ويوجد داخل النواة .

◀ تطورات في ترتيب الإلكترونات في الذرة :



نموذج نيلز بور


١. تتحرك الإلكترونات حول النواة في مدارات دائرية ثابتة
٢. لكل مدار طاقة محددة
٣. إذا انتقل الإلكترون من مداره إلى مدار آخر فإنه إما إن يمتص طاقة أو يفقد طاقة

□ النموذج الجزي الحديث :

١. تتألف المادة من (ذرات)
٢. تتألف الذرة من :
 - أ- نواة تحوي بروتونات (موجبة) ونيوترونات (متعادلة)
 - ب- الكتلونات سالبة الشحنة وتوجد حول النواة
٣. تتواجد الإلكترونات حول النواة في كل الاتجاهات والأبعاد مشكلة غيمة أو سحابة الكترونية
٤. تمتلك الإلكترونات خصائص موجية وخصائص جسيمية
٥. لا يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة في لحظة معينة

• تعريف السحابة الإلكترونية :

[هي منطقة تحيط بالنواة يحتمل وجود الإلكترون فيها في أي مكان وفي كافة الاتجاهات والأبعاد]



السحابة الإلكترونية

(الدرس الثاني : النواة)

□ مقدمة :

- تختلف العناصر باختلاف عدد بروتوناتها

- تعريف العدد الذري : [هو عدد البروتونات الموجودة في نواة العنصر]
- تعريف عدد الكتلة : [هو مجموع كل من عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة العنصر]

◀ [قوانين هامة] :

١. العدد الذري = عدد البروتونات

٢. عدد البروتونات = عدد الالكترونات

٣. عدد الكتلة = عدد البروتونات + عدد النيوترونات

يمثل العدد الذري ← X A

يمثل عدد الكتلة ← Z

يمثل رمز عام لأي عنصر في الجدول الدوري

○ ملحوظة هامة : عدد الكتلة دائما أكبر من العدد الذري علل !

- تعريف النظائر : [هي ذرات لنفس العنصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات]

• أمثلة على النظائر : نظائر الكربون ${}_{12}^6\text{C}$ ، ${}_{13}^6\text{C}$ ، ${}_{14}^6\text{C}$

نظائر الهيدروجين ${}_{1}^1\text{H}$ ، ${}_{2}^1\text{H}$ ، ${}_{3}^1\text{H}$

نظائر النيتروجين ${}_{12}^7\text{N}$ ، ${}_{13}^7\text{N}$ ، ${}_{14}^7\text{N}$ ، ${}_{15}^7\text{N}$

س / أكمل الجدول التالي :

النظير	العدد الذري	عدد النيوترونات	عدد الكتلة	عدد الالكترونات
${}_{12}^6\text{C}$	٦	٦	١٢	٦
${}_{13}^6\text{C}$	٦	٧	١٣	٦
${}_{14}^6\text{C}$	٦	٨	١٤	٦
${}_{1}^1\text{H}$	١	صفر	١	١
${}_{2}^1\text{H}$	١	١	٢	١
${}_{3}^1\text{H}$	١	٢	٣	١
${}_{12}^7\text{N}$	٧	٥	١٢	٧
${}_{13}^7\text{N}$	٧	٦	١٣	٧
${}_{14}^7\text{N}$	٧	٧	١٤	٧
${}_{15}^7\text{N}$	٧	٨	١٥	٧

□ تعريف القوة النووية الهائلة :

(هي قوة تحافظ على تماسك البروتونات عندما تكون متقاربة من بعضها البعض في نواة الذرة)

□ التحلل الإشعاعي :

- تعريف التحلل الإشعاعي : [هو تحرير جسيمات وطاقة من أنوية الذرات غير المستقرة]
- تعريف التحول : [هو تغيير العنصر غير المستقر إلى عنصر آخر عن طريق عملية التحلل الإشعاعي]
- أمثلة على التحلل الإشعاعي :

وجه المقارنة	جسيمات ألفا	جسيمات بيتا
التعريف	[هي جسيمات تحوي على بروتونين ونيوترونين وذات شحنة موجبة وتمثل أيون الهيليوم]	[هي عبارة عن الكثرونات سالبة الشحنة وذات طاقة عالية تصدر من نواة الذرة]
العدد الذري (عدد البروتونات)	يقفل بمقدار (٢)	يزداد بمقدار (١)
عدد النيوترونات	يقفل بمقدار (٢)	يقفل بمقدار (١)
عدد الكتلة	يقفل بمقدار (٤)	يبقى ثابت
تغير هوية العنصر	يفقد عنصر الأميريسيوم - ٢٤١ بروتونين ونيوترونين ويتحول إلى عنصر آخر أكثر استقراراً	يتحلل النيوترون الزائد إلى بروتون موجب يبقى داخل النواة والكثرون سالب يخرج خارج النواة على هيئة جسيمات بيتا ويتحول إلى عنصر آخر أكثر استقراراً
أمثلة عليها	جهاز كاشف الدخان (تحلل نظير عنصر الأميريسيوم - ٢٤١)	تحلل نظير الهيدروجين - ٣ إلى نظير الهيليوم - ٣
معادلتها	${}_{95}^{241}\text{Am} \longrightarrow {}_{93}^{237}\text{Np} + {}_2^4\text{He} + 2e^-$ <p>(جسيمات ألفا)</p>	${}^1_3\text{H} \longrightarrow {}^2_3\text{H} + e^-$ <p>(جسيم بيتا)</p>
	<p>الأميريسيوم النبتونيوم</p>	<p>هيدروجين - ٣ هيليوم - ٣ + إلكترون (e⁻)</p>

❖ فكرة العمل التي يقوم عليها جهاز كاشف الدخان :

- تقوم الفكرة على استخدام عنصر الأميريسيوم - ٢٤١ حيث أن هذا العنصر يطلق الطاقة وجسيمات ألفا.
- تلعب جسيمات ألفا دور في تأين ذرات الهواء وتحرير الكثرونات وبالتالي تمرير التيار الكهربائي داخل الدائرة الكهربائية وعندها يبقى الجهاز صامتا.
- عند دخول الدخان إلى الجهاز فإنه يمنع انتقال جسيمات ألفا ويمنع تأين الهواء وتحرير الكثرونات مما يسبب قطع التيار الكهربائي وعندها ينطلق صوت الإنذار.

□ معدل التحلل (عمر النصف) :

- تعريف عمر النصف : [هو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية العنصر]

◀ حساب معدل التحلل [عمر النصف] :

$$\text{عمر النصف} = \frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عدد الفترات}} \quad \text{عمر النصف} = \frac{\text{الكتلة المتبقية} - (٢) \text{ الكتلة في البداية}}{\text{عدد الفترات}}$$

مثال (١)

صفحة (١٠٣)

○ المعطيات :

عمر النصف = ١٢,٥ سنة
الكتلة في البداية = ٢٠ جم
المدة الزمنية = ٥٠ سنة

○ المطلوب :

الكتلة المتبقية = ؟؟؟؟

○ الحل :

$$\text{عدد الفترات} = \frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عمر النصف}} = \frac{٥٠}{١٢,٥} = ٤ \text{ فترات}$$

$$\text{الكتلة المتبقية} = \frac{\text{الكتلة في البداية}}{\text{عدد الفترات}} = \frac{٢٠}{٤} = ٥ \text{ جم}$$

○ المعطيات :

عمر النصف = ٥٧٣٠ سنة
الكتلة في البداية = ١٠٠ جم
المدة الزمنية = ١٧١٩٠ سنة

○ المطلوب :

الكتلة المتبقية = ؟؟؟؟

○ الحل :

$$\text{عدد الفترات} = \frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عمر النصف}} \leftarrow \text{عدد الفترات} = \frac{17190}{5730} = 3 \text{ فترات}$$

$$\text{الكتلة المتبقية} = \frac{\text{الكتلة في البداية}}{2^{\text{عدد الفترات}}} = \frac{100}{2^3} = \frac{100}{8} = 12,5 \text{ جم}$$



□ التاريخ الكربوني :

- يُستخدم نظير الكربون - ١٤ في معرفة أعمار الكائنات الحية فقط ويبلغ عمر النصف له (٥٧٣٠ سنة) .
(وذلك من خلال قياس نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢)

النظير	قبل وفاة الكائن الحي	بعد وفاة الكائن الحي
نظير الكربون - ١٢ (عنصر مستقر وثابت لا يتحلل)	تكون نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢ ثابتة لان ما يفقد يتم تعويضه	تقل نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢ لان نظير الكربون - ١٤ تقل نسبته نتيجة التحلل فهو عنصر غير مستقر ومشع ولا يتم تعويضه بعد موت الكائن الحي
نظير الكربون - ١٤ (عنصر غير مستقر ويتحلل مع الوقت)		

- يستخدم العلماء تحلل نظير اليورانيوم- ٢٣٨ إلى الرصاص - ٢٠٦ في تحديد عمر الصخور.

□ التخلص من النفايات المشعة :

يتم التخلص من النظائر المشعة عن طريق طمرها تحت الأرض بعمق يصل إلى (٦٥٥ م)

□ أنواع النظائر المشعة :

١. نظائر طبيعية

٢. نظائر مصنعة (من صنع الإنسان) [ويتم ذلك بتحويل العناصر المستقرة إلى عناصر غير مستقرة من خلال قذف النواة بجسيمات (تسمى قذيفة) وتقوم النواة بامتصاص هذا الجسيم فيتحول العنصر المستهدف إلى عنصر آخر جديد عدده الذري كبير وغير مستقر]

✓ ملحوظة : يستخدم في عملية قذف النواة ما يسمى [بالمسرعات الذرية] والتي تعمل على تسريع الجسيم وإطلاقه بسرعة كبيرة باتجاه العنصر المستهدف يستطيع من خلالها أن يصل إلى نواة الهدف

□ استخدامات النظائر المشعة :

• تسلك النظائر سلوك العنصر المستقر

• النظائر المستخدمة لإغراض طبية تمتاز بأن لها عمر نصف قصير (قد يكون عمر النصف لها بالساعات) وهي غالباً نظائر مصنعة .

أولاً ١٤ النظائر المشعة	١٤ النظائر المشعة
<ul style="list-style-type: none"> ○ يستعمل اليود - ١٣١ لتشخيص المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقية ○ يستعمل التكنيتيوم - ٩٩ لتتبع عمليات الجسم المختلفة [عمر النصف له يقدر بـ ٦ ساعات] ○ تستخدم النظائر المشعة في الكشف عن الأورام السرطانية ومشاكل الهضم ومشاكل الدورة الدموية والتمزقات والكسور 	<ul style="list-style-type: none"> ○ يستخدم الفسفور - ٣٢ لحضن جذور النباتات لمعرفة مدى الاستفادة من الفسفور في عمليتي النمو والتكاثر ○ تستخدم النظائر المشعة في المبيدات الحشرية لمعرفة مدى تأثيرها على النظام البيئي ○ تستخدم النظائر المشعة في الأسمدة لمعرفة كيفية امتصاص النبات للأسمدة ○ تستخدم النظائر المشعة في قياس مصادر المياه وتعقبها في المناطق الجافة ○ تستخدم النظائر المشعة (العناصر المتتبع) في دراسة الظروف البيئية بصورة عامة

(الدرس الأول : مقدمة في الجدول الدوري)

تطورات الجدول الدوري :

جدول مندليف	- رتب مندليف العناصر حسب الزيادة في عدد الكتلة
جدول موزلي	- رتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري (عدد البروتونات)
الجدول الدوري الحديث	<p>١. رتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري (عدد البروتونات)</p> <p>٢. وضعت العناصر في الجدول الدوري في (١٨) مجموعة ، و (٧) دورات</p> <p>٣. قُسم الجدول إلى المناطق التالية:</p> <p>أ- العناصر الممتلئة وتشمل المجموعتان (١ ، ٢) والمجموعات من (١٣) إلى (١٨)</p> <p>ب- العناصر الانتقالية . وتشمل المجموعات من (٣) إلى (١٢)</p> <p>ج- العناصر الانتقالية الداخلية ، وتضم كل من :</p> <p>- سلسلة اللانثانيدات</p> <p>- سلسلة الأكتينيدات</p>

- تعريف المجموعة : صف عمودي يحوي عناصر لها خواص كيميائية وفيزيائية متشابهة
- تعريف الدورة : صف أفقي يحوي عناصر تتغير خصائصها بشكل تدريجي يمكن توقعه
- تعريف العناصر الممتلئة : هي عناصر المجموعتان (١ ، ٢) والمجموعات (١٣ - ١٨) في الجدول الدوري وتشمل الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات
- تعريف العناصر الانتقالية : هي عناصر المجموعات (٣ - ١٢) في الجدول الدوري وجميعها عناصر فلزية

مقارنة بين خصائص كل من الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات :

خصائص الفلزات	خصائص اللافلزات	خصائص أشباه الفلزات
١. لها لمعان و عادة تكون صلبة	١. هشّة وليينة	١. لها لمعان بسيط
٢. قابلة للطرق والسحب	٢. غير قابلة للطرق والسحب	٢. موصلة للكهرباء والحرارة في درجات الحرارة العالية
٣. موصلة جيدة للكهرباء والحرارة	٣. رديئة التوصيل الكهربائي والحراري	٣. هشّة وليينة
مثال النحاس - الذهب - الألومنيوم - الرصاص	مثال الهيدروجين - الهيليوم - الزينون - الفلور	مثال الجرمانيوم - السيلكون

مفتاح العنصر :

- هو صندوق يحوي معلومات عن العنصر ، ومن هذه المعلومات
- اسم العنصر
 - رمز العنصر
 - العدد الذري للعنصر
 - عدد الكتلة للعنصر
 - حالة العنصر [صلب ، سائل ، غاز]
 - نوع العنصر [فلز ، لا فلز ، شبه فلز]

توضيح لبعض الرموز الواردة بالجدول الدوري وما تدل عليه :

المكعب	يدل على الحالة الصلبة للعنصر
القطرة	تدل على الحالة السائلة للعنصر
البالون	يدل على الحالة الغازية للعنصر
دائرة بداخلها دائرة صغيرة	تدل على أن العنصر مصنع

رموز العناصر :

تكتب رموز العناصر في الجدول الدوري الحديث بحرف أو حرفين مختصرين وهذه الأحرف تكون مشتقة من :

أصل التسمية	رمز العنصر	اسم العنصر بالانجليزي	اسم العنصر
كلمة إغريقية وتعني مكون الماء	H	Hydrogen	الهيدروجين
اسم ديني عند الإغريق	Th	Thorium	الثوريوم
كلمة لاتينية تعني يزوغ الضوء	Au	Gold	الذهب
كلمة إغريقية وتعني السائل الفضي	Hg	Mercury	الزئبق
من اسم العالم مندليف	Md	Mendelevium	مندليفيوم
على اسم البلد بولندا حيث ولدت ماري كوري	Po	Polonium	بولونيوم

من اسم العنصر باللغة الانجليزية

من الاسم اللاتيني أو الإغريقي

من أسماء العلماء أو بلدانهم

س / عرف كل من الفلزات وأشباه الفلزات واللافلزات ؟؟؟

لاستفساراتكم واقتراحاتكم مراسلتنا على البريد التالي : al_no0or2008@hotmail.com

(الدرس الثاني : العناصر الممثلة)

عناصر المجموعتين (٢ ، ١) :

❖ عناصر المجموعة (١) :

- تسمى هذه المجموعة [بالفلزات القلوية]
- تعريف الفلزات القلوية : هي عناصر المجموعة (١) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها فلزات ماعدا [الهيدروجين]
- عناصر هذه المجموعة صلبة ولامعة وكثافتها منخفضة
- عناصر هذه المجموعة يزداد نشاطها كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل وتميل إلى الاتحاد بعناصر أخرى وتكوين مواد جديدة

H	الهيدروجين	لا فلز
Li	الليثيوم	فلزات قلوية
Na	الصوديوم	
K	البوتاسيوم	
Rb	الروبيديوم	
Cs	السيزيوم	
Fr	الفرانسيوم	

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

البوتاسيوم	الصوديوم	الليثيوم
✓ يعتبر من العناصر الضرورية للجسم ✓ يوجد بكميات قليلة في البطاطس والموز	✓ يدخل في تركيب مركب (كلوريد الصوديوم) المعروف بـ (ملح الطعام) ✓ يعتبر من العناصر الضرورية للجسم ✓ يوجد بكميات قليلة في البطاطس والموز	✓ يدخل في صناعة بطارية الليثيوم المستخدمة في الكاميرات

❖ عناصر المجموعة (٢) :

- تسمى هذه المجموعة [بالفلزات القلوية الأرضية (الترابية)]
- تعريف الفلزات القلوية الأرضية : هي عناصر المجموعة (٢) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها فلزية
- عناصر هذه المجموعة نشطة وتميل إلى الاتحاد مع عناصر أخرى لتكوين مواد جديدة
- أقل نشاط من عناصر المجموعة الأولى
- عناصر هذه المجموعة أكثر صلابة وكثافة مقارنة بعناصر المجموعة الأولى
- درجة انصهارها أعلى من المجموعة الأولى

Be	البريليوم	فلزات قلوية أرضية
Mg	الماغنسيوم	
Ca	الكالسيوم	
Sr	الاسترانشيوم	
Ba	الباريوم	
Ra	الراديوم	

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الماغنسيوم	البريليوم
✓ يدخل في تركيب كلوروفيل النباتات الخضراء	✓ يوجد في الزمرد

المجموعات من (١٣) إلى (١٨) :

❖ عناصر المجموعة (١٣) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [البورون]
- عناصر هذه المجموعة فلزية ماعدا [البورون] الذي يعتبر عنصر شبه فلز

B	البورون	شبه فلز
Al	الألومنيوم	فلزات
Ga	الجاليوم	
In	الأنديوم	
Tl	الثاليوم	

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الجاليوم	الألومنيوم	البورون
✓ يستخدم في صناعة رقاقات الحاسوب	✓ يستخدم في صناعة علب المشروبات الغازية وأواني الطهي ومضارب البيسبول	✓ يدخل في صناعة أواني الطهي لمقاومته للحرارة والتبريد

تابع

❖ عناصر المجموعة (١٤) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [الكربون]
- يعتبر الكربون عنصر لا فلزي والسليكون والجرمانيوم من أشباه الفلزات والقصدير والرمصاص من الفلزات

C	الكربون	لا فلز
Si	السليكون	شبه فلز
Ge	الجرمانيوم	
Sn	القصدير	فلزات
Pb	الرمصاص	

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الكربون	السليكون والجرمانيوم	القصدير	الرمصاص
<ul style="list-style-type: none"> ✓ له أشكال مختلفة منها الماس والجرافيت ✓ يوجد بأجسام الكائنات الحية 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ يستخدمان في صناعة رقائق الحاسوب (صناعة الإلكترونيات) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ يستخدم في حشو الأسنان ✓ يستخدم في طلاء العلب المعدنية المستخدمة في حفظ الطعام 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ يستخدم في الطب لحماية الجسم من أشعة (X) ✓ يستخدم كجدار واقى حول المفاعلات النووية ✓ يدخل في صناعة بطاريات السيارات ✓ يستخدم في صناعة السبائك

❖ عناصر المجموعة (١٥) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [النيتروجين]
- يعتبر النيتروجين والفسفور من العناصر اللا فلزية و الزرنيخ و الأنتيمون من العناصر شبه الفلزية والبزموت من الفلزات

N	النيتروجين	لا فلز
P	الفسفور	شبه فلز
As	الزرنيخ	
Sb	الأنتمون	فلز
Bi	البزموت	فلز

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الفسفور	النيتروجين
<ul style="list-style-type: none"> □ أنواع الفسفور : ١. الفسفور الأحمر ٢. الفسفور الأبيض ✓ يدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات الجينية والطاقة في الجسم ✓ يعتبر الفسفور مركب أساسي في صحة الأسنان والعظام ✓ يعتبر الفسفور من المكونات الأساسية في الأسمدة ✓ يعتبر الفسفور الأبيض أكثر نشاطاً من الفسفور الأحمر ✓ يستخدم الفسفور الأحمر في صناعة رؤوس أعواد الثقاب حيث يشتعل بفعل الاحتكاك والحرارة 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ يوجد بنسبة ٨٠ % في الغلاف الجوي ✓ يدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات الجينية والطاقة في الجسم ✓ يدخل في تركيب غاز الأمونيا الذي يعتبر مطهر للجراثيم □ ملحوظة هامة : لا يستطيع الجسم أخذ حاجته من النيتروجين عند استنشاقه مباشرة من الهواء ، إذ يجب أن تقوم البكتريا بتحويل غاز النيتروجين إلى مواد يسهل على النبات امتصاصها ثم يأخذ الجسم حاجته من النيتروجين بتناوله للنبات

❖ عناصر المجموعة (١٦) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [الأكسجين]
- يعتبر الأكسجين والكبريت والسيلينيوم من العناصر اللا فلزية وعنصري التيلوريوم والبولونيوم من أشباه الفلزات

O	الأكسجين	لا فلز
S	الكبريت	
Se	السيلينيوم	شبه فلز
Te	التيلوريوم	
Po	البولونيوم	

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الأكسجين	الكبريت	السيلينيوم
<ul style="list-style-type: none"> ✓ يوجد بنسبة ٢٠ % في الغلاف الجوي ✓ يحتاج الجسم إلى الأكسجين لإنتاج الطاقة ✓ يدخل في تركيب المعادن والصخور ✓ ضروري في عملية الاشتعال لذلك تستخدم الرغوة في إطفاء الحرائق 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ صلب وأصفر اللون ✓ يدخل في تركيب حمض الكبريتيك الذي يستخدم في الطلاء والأسمدة والمنظفات والمطاط والأنسجة الصناعية 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عنصر نشط عند تعرضه للضوء ✓ يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية ✓ يستخدم في صناعة آلات التصوير الضوئي

تابع

❖ عناصر المجموعة (١٧) :

F	الفلور	لا فلزات
Cl	الكلور	
Br	البروم	
I	اليود	
At	الأستاتين	شبه فلز

- تسمى هذه المجموعة [بالهالوجينات] وتعني (مكونات الأملاح) فهي تكون أملاح مع الفلزات القلوية
- تعريف الهالوجينات : هي عناصر المجموعة (١٧) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها لا فلزات ما عدا الأستاتين فهو شبه فلز مشع
- أكثر عناصر هذه المجموعة نشاطا هو الفلور ثم الكلور ثم البروم ثم اليود

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الكلور	اليود
يضاف الكلور إلى ماء الشرب لقتل الجراثيم	يحتاجه الجسم وخصوصا (الغدة الدرقية)

❖ عناصر المجموعة (١٨) :

He	الهيليوم	لا فلزات
Ne	النيون	
Ar	الأرجون	
Kr	الكريبتون	
Xe	الزينون	
Rn	الرادون	

- تسمى هذه المجموعة بـ [الغازات النبيلة]
- تعريف الغازات النبيلة : هي عناصر المجموعة (١٨) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها لا فلزات
- عناصر هذه المجموعة جميعها توجد بحالة [غازية]
- عناصر هذه المجموعة غير نشطة لذلك كانت تسمى (بالغازات الخاملة)
- تستخدم في اللوحات الإعلانية فعند مرور التيار الكهربائي فإنها تتوهج بألوان مختلفة

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الهيليوم	الأرجون	الكريبتون	الرادون
أقل كثافة من الهواء ولا يشتعل يستخدم في ملء البالونات والمناطيد	✓ أكثر الغازات النبيلة تواجد في الطبيعة	✓ يستخدم مع النيتروجين في مصابيح الإنارة العادية وذلك لحفظ الفتيل من الاحتراق ✓ تستخدم مصابيح الكريبتون في إنارة أرضية مدارج المطارات	✓ يعتبر غاز مشع ✓ ناتج من تحلل اليورانيوم في التربة والصخور ✓ يعتبر غاز مضر ويسبب سرطان الرئة بسبب الإشعاعات التي يطلقها هذا الغاز في الهواء الجوي

- تعريف أشباه الموصلات : هي مواد توصل الكهرباء بدرجة أقل من الفلزات وأكثر من اللافلزات
- قائمة بأهم رموز العناصر :

رمز العنصر	اسم العنصر	رمز العنصر	اسم العنصر
H	الهيدروجين	C	الكربون
Li	الليثيوم	Si	السيليكون
Na	الصوديوم	Ge	الجرمانيوم
K	البوتاسيوم	N	النيتروجين
Fr	الفرانسيوم	P	الفسفور
Be	البريليوم	O	الأكسجين
Mg	الماغنسيوم	S	الكبريت
Ca	الكالسيوم	F	الفلور
Fe	الحديد	Cl	الكلور
Cu	النحاس	Br	البروم
Ag	الفضة	I	اليود
Hg	الزئبق	He	الهيليوم
Al	الألومنيوم	Ne	النيون

(الدرس الثالث : العناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية)

أ- العناصر الانتقالية :

- هي عناصر المجموعات من (٣) إلى (١٢)
- تعتبر جميعها عناصر فلزية
- تحوي على عناصر صلبة وعناصر مصنعة وعناصر سائل وهو (الزئبق)
- تحوي على ثلاثة عناصر متشابهة في الخصائص تعرف بثلاثية الحديد [الحديد والكوبالت والنيكل]
- توجد متحدة مع عناصر أخرى في صورة خامات أو توجد بصورة حرة مثل الذهب والفضة
- ★ **الاستخدامات :**
- يدخل عنصر التنجستين في صناعة قنيل المصابيح لأن له درجة انصهار عالية (٣٤١٠ م)
- يستخدم الزئبق في صناعة مقاييس الحرارة ومقاييس الضغط لأن له درجة انصهار أقل من أي فلز آخر
- تستخدم [كعوامل مساعدة] أو [عوامل محفزة] في التفاعلات الكيميائية

خواص العناصر الانتقالية واستخداماتها

■ تعريف العامل المساعد (العامل المحفز) :

[هي مادة تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تستهلك فيه]

ثلاثية الحديد :

- تشمل ثلاثية الحديد العناصر التالية [الحديد والكوبالت والنيكل] وأشهرها وأكثرها استخداماً هو عنصر الحديد
- سميت العناصر الثلاثة السابقة (بثلاثية الحديد) لتشابهها في الخصائص (خصائص مغناطيسية) وتوجد جميعها في الدورة الرابعة
- يعتبر الحديد من أكثر العناصر الانتقالية ثباتاً لشدة تماسك مكونات النواة في ذرته
- يدخل الحديد في تركيب [الهيموجلوبين] الذي ينقل الأكسجين في الدم .
- يدخل الحديد في صناعة الفولاذ (الفولاذ : هو مزيج من الحديد و الكربون و فلزات أخرى)

ب- العناصر الانتقالية الداخلية

وتنقسم إلى ما يلي :

- (١) **اللانثانيدات :** وهي تمثل السلسلة الأولى من العناصر الانتقالية الداخلية وتتبع لعنصر اللانثيوم
- (٢) **الأكتنيدات :** وهي تمثل السلسلة الثانية من العناصر الانتقالية الداخلية وتتبع لعنصر الأكتينيوم

١- اللانثانيدات

- تعرف اللانثانيدات بـ [العناصر الترابية النادرة]
- سميت بالعناصر الترابية النادرة لأنه كان يعتقد أنها نادرة الوجود في القشرة الأرضية
- عناصر اللانثانيدات فلزات لينة
- يصعب فصلها عندما توجد في خام واحد لأنها متشابهة

٢- الأكتنيدات

- جميع الأكتنيدات عناصر مشعة لأن أنويتها غير مستقره
- اليورانيوم والثوريوم والبروتكتينيوم هي العناصر المشعة الوحيدة الموجودة في الطبيعة
- بقية عناصر الأكتنيدات عناصر مصنعة ومشعة ولها استخدامات منها :

البلوتونيوم	يستخدم كوقود في المفاعلات النووية
الأميريسيوم	يستخدم في أجهزة الكشف عن الدخان
الكاليفورنيوم - ٢٥٢	يستخدم في قتل الخلايا السرطانية

- يتم الحصول على العناصر المصنعة من خلال دمج نواتين باستخدام مسرعات الجسيمات

طب الأسنان ومواجهه :

- كان يستخدم أطباء الأسنان سابقاً مزيج من النحاس والفضة والقصدير والزنبرق لحشو فجوات الأسنان مما يعرض البعض لأبخرة الزئبق السامة
- الآن يستخدم أطباء الأسنان الصمغ والبورسلان وتمتاز بأنها مواد مقاومة كيميائياً لسوائل الجسم
- كذلك يستخدم اليوم سبائك من النيكل والتيتانيوم لتقويم الأسنان

(الدرس الأول : انهد الذرات)

البناء الجزي : <

- تتألف المادة من [ذرات] وتتألف الذرة من :

موجبة	p	بروتونات	١- نواة (موجبة الشحنة)
متعادلة	n	نيوترونات	
سالبة	e	الكترونات	٢- سحابة الكترونية حول النواة يوجد بها

التوزيع الإلكتروني وترتيب الإلكترونات : <

تتواجد الإلكترونات حول نواة الذرة في مناطق تعرف بـ [مجالات الطاقة]

تعريف مجالات الطاقة : [هي المناطق التي توجد بها الإلكترونات حول النواة في السحابة الإلكترونية]


يتم التوزيع الإلكتروني من خلال [العدد الذري]

يتمتع كل مجال من مجالات الطاقة لعدد محدد من الإلكترونات ولتحديد أقصى عدد ممكن لكل مجال من مجالات الطاقة نستخدم العلاقة التالية:

$$2 \times 2^n \quad \leftarrow \text{حيث أن } (n) \text{ رقم مجال الطاقة}$$

مجال الطاقة	الحد الأقصى من الإلكترونات لمجال الطاقة الأخير للوصول لحالة الاستقرار
الأول	٢
الثاني	٨
الثالث	١٨
الرابع	٣٢

■ أمثلة على التوزيع الإلكتروني لبعض الذرات :



□ وجد من خلال التوزيع الإلكتروني أن جميع عناصر (الغازات النبيلة) مستقرة - لأن مجال الطاقة الأخير ممتلئ تماماً بـ (٨) إلكترونات


معدداً غاز الهيليوم الذي يمتلئ (بإلكترونين) فقط

□ تسعى عناصر كل مجموعة من العناصر الممتلئة إلى مشابهة الغازات النبيلة بحيث يكون مجال الطاقة الخارجي لها ممتلئاً بالإلكترونات

□ يمكن معرفة عدد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي (الأخير) لكل مجموعة من مجموعات العناصر الممتلئة بالرجوع إلى الجدول التالي :

المجموعة (١٨)	المجموعة (١٧)	المجموعة (١٦)	المجموعة (١٥)	المجموعة (١٤)	المجموعة (١٣)	المجموعة (٢)	المجموعة (١)	المجموعات
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	عدد الالكترونات في مجال الطاقة الأخير
مستقر	يكتسب	يكتسب	يكتسب	مشارك	يفقد	يفقد	يفقد	ما يحدث للإلكترونات مجال الطاقة الأخير للوصل للاستقرار (مشابهة الغاز النبيل)
	١ -	٢ -	٣ -	٤	٣ +	٢ +	١ +	

- رقم الدورة في الجدول الدوري يدل على : [يدل على رقم المدار الأخير]
- رقم المجموعة في الجدول الدوري يدل على : [عدد إلكترونات مجال الطاقة الأخير]
- خلال الدورة الواحدة كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين نجد أن: الحجم الذري لذرات العناصر يقل بسبب ثبات المدارات وزيادة عدد الالكترونات وبالتالي يزداد مقدار التجاذب بين النواة والالكترونات مما يؤدي إلى نقصان الحجم الذري
- خلال المجموعة الواحدة كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل المجموعة نجد أن : العدد الذري يزداد وبالتالي يزداد عدد المدارات مما يؤدي إلى زيادة الحجم الذري (انظر إلى الشكل التالي)



١. يقل الحجم الذري
٢. مجال الطاقة ثابت
٣. زيادة بالعدد الذري (عدد الإلكترونات)
٤. يزداد التجاذب بين النواة والإلكترونات
٥. يصعب فصل الإلكترونات

١. يزداد الحجم الذري
٢. يضاف مجال طاقة جديد
٣. زيادة بالعدد الذري (عدد الإلكترونات)
٤. يقل التجاذب بين النواة وإلكترونات المجال الأخير
٥. يسهل فصل الإلكترونات
٦. يزداد نشاط العنصر كلما نزلنا لأسفل المجموعة كما في المجموعة الأولى (الفلزات القلوية)

١	٢	٣	٤
H			
Li	Be	B	C
Na	Mg	Al	Si
K	Ca	Ga	Ge

• يتم تحديد نشاط العنصر من الحالتين التاليتين :

كلما كان مجال الطاقة الخارجي أبعد عن النواة كلما كان فصل الإلكترون أسهل وبالتالي يكون العنصر أكثر نشاطاً من تلك العناصر التي يقترب فيها مجال الطاقة الخارجي من النواة	في حالة الفقد
كلما كان مجال الطاقة الخارجي أقرب إلى النواة كلما كان اكتساب الإلكترون أسهل وبالتالي يكون العنصر أكثر نشاطاً من تلك العناصر التي يبتعد فيها مجال الطاقة الخارجي عن النواة	في حالة الاكتساب

◀ التمثيل النقطي للإلكترونات :

هو عبارة عن رمز العنصر محاط بنقاط تمثل عدد الإلكترونات في مجال الطاقة الخارجي	تعريف التمثيل النقطي للإلكترونات
هي القوى التي تربط ذرتين إحداهما مع الأخرى	تعريف الرابطة الكيميائية
يوضح كيفية ارتباط ذرات العناصر بعضها مع بعض	فائدة التمثيل النقطي للإلكترونات

- س / كيف يتم تمثيل إلكترونات مجال الطاقة الخارجي (الأخير) بالنقاط ؟
- تحديد عدد الإلكترونات في المجال الطاقة الخارجي
 - يكون التمثيل النقطي للإلكترونات باتجاه عقارب الساعة
 - يبدأ التمثيل بوضع نقطه فوق العنصر ثم عن يمين العنصر ثم أسفل العنصر ثم عن يسار العنصر
 - يعاد التمثيل بنفس الطريقة إذا كان هناك الكترونات أخرى بحيث تكون هذه النقاط بصورة أزواج على الجهات الأربع لرمز العنصر

□ أمثلة على التمثيل النقطي للإلكترونات :

المجموعات	(١)	(٢)	(١٣)	(١٤)	(١٥)	(١٦)	(١٧)	(١٨)
التمثيل النقطي للإلكترونات	H	Mg	Al	C	N	O	F	Ne

(الدرس الثاني : ارتباط العناصر)



- تعريف المركب : هو مادة تتكون من عنصرين أو أكثر
- تعريف الأيون : هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر

◀ أنواع الروابط الكيميائية :


١. الرابطة الأيونية
٢. الرابطة الفلزية
٣. الرابطة التساهمية (المشاركة)

■ أولا : الرابطة الأيونية

تعريفها	[هي رابطة تنشأ بين أيونين شحنتيهما مختلفة]
مميزاتها	<ul style="list-style-type: none"> - تتكون الرابطة الأيونية بين فلز ولافلز - الفلزات تفقد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي ولافلزات تكتسب إلكترونات مجال الطاقة الخارجي - العنصر الذي يفقد إلكتروناته تظهر عليه شحنة موجبة بعدد ما فقد من إلكترونات ويسمى (أيون موجب) - العنصر الذي يكتسب تظهر عليه شحنة سالبة بعدد ما اكتسبه من إلكترونات ويسمى (أيون سالب)
أمثلة على الرابطة الأيونية	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>الخطوة الأولى</p> $\text{Mg} \cdot \longrightarrow [\text{Mg}]^{+2} + \cdot\cdot$ <p>ذرة ماغنسيوم أيون ماغنسيوم إلكترونين</p> <p>الخطوة الثانية</p> $\cdot\ddot{\text{O}}: + \cdot\cdot \longrightarrow [:\ddot{\text{O}}:]^{-2}$ <p>ذرة أكسجين إلكترونين أيون الأكسيد</p> <p>الخطوة الثالثة</p> $[\text{Mg}]^{+2} + [:\ddot{\text{O}}:]^{-2} \longrightarrow \text{MgO}$ <p>أيون الماغنسيوم الموجب أيون الأكسيد السالب أكسيد الماغنسيوم</p> <p>اتحاد الماغنسيوم مع الأكسجين لتكوين مركب أكسيد الماغنسيوم</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>الخطوة الأولى</p> $\text{Na} \cdot \longrightarrow [\text{Na}]^{+} + \cdot$ <p>ذرة صوديوم أيون الصوديوم إلكترون</p> <p>الخطوة الثانية</p> $\cdot\ddot{\text{Cl}}: + \cdot \longrightarrow [:\ddot{\text{Cl}}:]^{-}$ <p>ذرة كلور إلكترون أيون الكلور</p> <p>الخطوة الثالثة</p> $[\text{Na}]^{+} + [:\ddot{\text{Cl}}:]^{-} \longrightarrow \text{NaCl}$ <p>أيون الصوديوم الموجب أيون الكلور السالب كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)</p> <p>اتحاد الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم ملح الطعام</p> </div> </div>
	٣- اتحاد الماغنسيوم مع جزئ الكلور لتكوين كلوريد الماغنسيوم (بنفس الطريقة يتم التفاعل)





ثانياً : الرابطة الفلزية

تعريفها	[هي رابطة تنشأ عن تجاذب إلكترونات مجال الطاقة الخارجي لذرات الفلز]
مميزاتها	<ul style="list-style-type: none"> - الرابطة الفلزية تنشأ بين الفلزات - الرابطة الفلزية هي التي تفسر سبب قابلية الفلزات للطرق والسحب - الرابطة الفلزية هي التي تفسر سبب التوصيل الكهربائي والحراري للعناصر الفلزية وذلك بسبب ميل هذه العناصر إلى فقد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي
مثال على الرابطة الأيونية	<p style="text-align: center;">الرابطة الفلزية في الفضة (Ag)</p> 

ثالثاً : الرابطة التساهمية [المشاركة]

تعريفها	[هي رابطة تنشأ بين ذرات العناصر اللافلزية من خلال المشاركة بالإلكترونات مجال الطاقة الخارجي]										
مميزاتها	<ul style="list-style-type: none"> - تنشأ الرابطة التساهمية لذرات العناصر غير القادرة على فقد أو اكتساب إلكترونات في مجال الطاقة الخارجي مثل ذرة الكربون التي تحوي على (٤) إلكترونات بمجال الطاقة الخارجي ففقد أو اكتساب هذا العدد من الإلكترونات لكي تصل ذرة الكربون إلى حالة الاستقرار يصعب على الذرة لأنه يتطلب طاقة كبيرة جداً - تنشأ الرابطة التساهمية بين ذرات العناصر اللافلزية - ينتج عن الرابطة التساهمية [مركبات جزيئية] ومن أمثلة المركبات الجزيئية ما يلي : 										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>جزئ الهيدروجين</td> <td>جزئ الأكسجين</td> <td>جزئ الكلور</td> <td>جزئ النيتروجين</td> <td>جزئ ثاني أكسيد الكربون</td> </tr> <tr> <td>H₂</td> <td>O₂</td> <td>Cl₂</td> <td>N₂</td> <td>CO₂</td> </tr> </table>	جزئ الهيدروجين	جزئ الأكسجين	جزئ الكلور	جزئ النيتروجين	جزئ ثاني أكسيد الكربون	H ₂	O ₂	Cl ₂	N ₂	CO ₂
جزئ الهيدروجين	جزئ الأكسجين	جزئ الكلور	جزئ النيتروجين	جزئ ثاني أكسيد الكربون							
H ₂	O ₂	Cl ₂	N ₂	CO ₂							
	<p>• تعريف الجزيء : [هو الوحدة الأساسية للمركبات الجزيئية] - لا يوجد أيونات في تفاعلات الرابطة التساهمية لأنه لا يوجد فقد أو اكتساب للإلكترونات مجال الطاقة الخارجي</p>										
أنواع الرابطة التساهمية (المشاركة)											
<p>١. الرابطة التساهمية الأحادية</p> <p>تنتج عن مشاركة كل ذرة بإلكترون واحد من مجال الطاقة الخارجي</p> <p>مثال : جزئ الهيدروجين</p> <p style="text-align: center;">H••H</p>	<p>٢. الرابطة التساهمية الثنائية</p> <p>تنتج عن مشاركة كل ذرة بإلكترونين من مجال الطاقة الخارجي</p> <p>مثال : جزئ ثاني أكسيد الكربون</p> <p style="text-align: center;">••O••C••O••</p>	<p>٣. الرابطة التساهمية الثلاثية</p> <p>تنتج عن مشاركة كل ذرة بثلاثة إلكترونات من مجال الطاقة الخارجي</p> <p>مثال : جزئ النيتروجين</p> <p style="text-align: center;">•••N•••N•••</p>									

◀ **الجزيئات القطبية والجزيئات غير القطبية :** وتنقسم حسب المشاركة بالإلكترونات إلى :
 -أ الجزيئات القطبية :

تعريفها	[هي رابطة تنشأ عن المشاركة غير المتساوية بالإلكترونات]	
أمثلة على الرابطة القطبية	<p>كلوريد الهيدروجين</p> <p>شحنة جزيئية سالبة</p> 	<p>الماء (أكسيد الهيدروجين)</p> <p>شحنة جزيئية سالبة</p> 

[هي رابطة تنشأ عن المشاركة المتساوية للإلكترونات وتكون بين ذرات العنصر نفسه]		تعريفها
جزئ النيتروجين	جزئ الهيدروجين	أمثلة على الرابطة غير القطبية
$:N::N:$	$H\cdot\cdot H$	

الرموز والصيغ الكيميائية :

- تعريف الصيغ الكيميائية : [هي رموز كيميائية وأرقام تبين أنواع ذرات العناصر المكونة للمركب أو الجزئ وأعدادها]
- أمثلة على الصيغ الكيميائية :

اسم المركب	صيغته الكيميائية	مكونات المركب أو الجزئ من خلال الصيغة
جزئ الكلور	Cl_2	يتكون من ذرتين كلور
الماء	H_2O	يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين واحدة
الأمونيا	NH_3	يتكون من ثلاث ذرات هيدروجين وذرة نيتروجين واحدة
كبريتيد الفضة	Ag_2S	يتكون من ذرتين فضة وذرة كبريت واحدة
حمض الكبريتيك	H_2SO_4	يتكون من ذرتين هيدروجين وأربع ذرات أكسجين وذرة كبريت واحدة

(الدرس الأول: الصبغ والمعادلة الكيميائية)

◀ أنواع التغيرات التي تطرأ على المادة (خصائص المادة):

1. تغيرات فيزيائية	[هي تغيرات تؤثر في خصائص المادة الفيزيائية فقط] ○ مثال : تغير الحجم – تغير الشكل – تغير حالة المادة (تجمد الماء ، طي الورقة)
2. تغيرات كيميائية	[هي تغيرات تؤثر في خصائص المادة الكيميائية وتنتج مادة جديدة بخصائص مختلفة] ○ مثال : التفاعلات الكيميائية (صدأ الحديد ، احتراق الورقة ، تكون ملح الطعام)

• تعريف النفاعل الكيميائي : [هو تغير كيميائي ينتج عنه مادة جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص المادة الأصلية

(المادة المتفاعلة أو الداخلة في التفاعل)]

• هدلولات (دلائل) حدوث التفاعل الكيميائي :

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 1. تغير اللون | 2. تغير الطعم | 3. انطلاق صوت (انفجار) |
| 4. الضوء | 5. ظهور حرارة | 6. تصاعد غاز |
| | | 7- تكون راسب |

◀ المعادلات الكيميائية :

تعريف المعادلة الكيميائية	[هي صيغة مختصرة توضح المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وأحياناً توضح ما إذا استخدمت طاقة أو تحررت طاقة]
تعريف المتفاعلات (المواد المتفاعلة)	[هي المواد البادئة للتفاعل] أو [هي المواد التي توجد قبل التفاعل الكيميائي]
تعريف النواتج (المواد الناتجة)	[هي مواد ناتجة عن التفاعل الكيميائي]

◀ طرق كتابة المعادلات الكيميائية :

وجه المقارنة	أ- المعادلات اللفظية (باستخدام الكلمات)	ب- المعادلات الرمزية (باستخدام الصبغ الكيميائية)
أهم ما يميزها	- تكون المواد المتفاعلة يمين السهم ويفصل بينهم (+) - تكون النواتج يسار السهم ويفصل بينهم (+) - السهم ينطق بكلمة (ينتج) - لا يمكن من خلالها معرفة عدد الذرات الداخلة في التفاعل أو الناتجة من التفاعل الكيميائي - في هذا النوع من المعادلات تستخدم الأسماء الكيميائية بدلا من الأسماء الشائعة	- تكون المواد المتفاعلة يسار السهم ويفصل بينهم (+) - تكون النواتج يمين السهم ويفصل بينهم (+) - السهم ينطق بكلمة (ينتج) - يمكن من خلالها معرفة عدد الذرات الداخلة في التفاعل أو الناتجة من التفاعل الكيميائي - تعبر الأرقام الصغيرة التي تكتب يمين الذرات إلى الأسفل عن عدد ذرات كل عنصر في المركب
أمثلة	صودا الخبز + خل ← غاز + مادة صلبة بيضاء صوديوم + كلور ← كلوريد الصوديوم فحم + أكسجين ← رماد + غاز + حرارة فضة + كبريتيد الهيدروجين ← مادة سوداء + غاز شريحة تفاح + أكسجين ← تحول لون التفاح إلى البني	① $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2 + \text{طاقة}$ ② $Na + Cl \longrightarrow NaCl$ ③ $2Ag + H_2S \longrightarrow Ag_2S + H_2$

← قانون حفظ الكتلة (قانون لافوزية) :

• نص قانون حفظ الكتلة :

[كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة] (أو) [عدد ذرات المتفاعلات = عدد ذرات النواتج]

← كيفية وزن المعادلة الكيميائية [خطوات وزن المعادلة الكيميائية] :

1. نحسب عدد الذرات لكل عنصر في المتفاعلات (من خلال ضرب الرقم الموجود قبل الصيغة في الرقم الموجود أسفل يمين الصيغة)
2. نحسب عدد الذرات لكل عنصر في النواتج (من خلال ضرب الرقم الموجود قبل الصيغة في الرقم الموجود أسفل يمين الصيغة)
3. (الرقم واحد) عادة لا يكتب - لذلك إذا لم يكن هناك رقم قبل الصيغة أو أسفل يمين الصيغة فيكون هو الرقم (واحد)
4. عندما تكون أعداد الذرات غير متساوية بين طرفي المعادلة الكيميائية نقول أن المعادلة الكيميائية غير موزونة ولوزنها نضع رقم مناسب قبل الصيغة الكيميائية سواء في المتفاعلات أو النواتج
5. نعيد الخطوتين (1) و (2) للتأكد من أعداد الذرات إلى أن تصبح أعداد ذرات المتفاعلات = أعداد ذرات النواتج


• ملاحظات هامة :

- عدم تغيير الأرقام الصغيرة الموجودة يمين أسفل ذرات العناصر في الصيغة الكيميائية
- عدم وضع الرقم بمنتصف الصيغة عند وزن المعادلات الكيميائية وإنما وضع الرقم يسار الصيغة الكيميائية
- في أغلب المعادلات الكيميائية الرقمين (2) و (3) تكفي لوزن المعادلة الكيميائية

أهتلة على وزن المعادلات الكيهائية :

1

المعادلة الكيهائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$2 = \text{Al}$$

$$6 = \text{I}$$

المواد الناتجة

$$2 = \text{Al}$$

$$6 = \text{I}$$

المعادلة الكيهائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = \text{Al}$$

$$2 = \text{I}$$

المواد الناتجة

$$1 = \text{Al}$$

$$2 = \text{I}$$

2

المعادلة الكيهائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$4 = \text{H}$$


$$2 = \text{O}$$

المواد الناتجة

$$4 = \text{H}$$

$$2 = \text{O}$$

المعادلة الكيهائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$2 = \text{H}$$

$$2 = \text{O}$$

المواد الناتجة

$$2 = \text{H}$$

$$1 = \text{O}$$

3

المعادلة الكيهائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = \text{C}$$

$$4 = \text{H}$$

$$4 = \text{O}$$

المواد الناتجة

$$1 = \text{C}$$

$$4 = \text{H}$$

$$4 = 2 + 2 = \text{O}$$

المعادلة الكيهائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = \text{C}$$

$$4 = \text{H}$$

$$2 = \text{O}$$

المواد الناتجة

$$1 = \text{C}$$

$$2 = \text{H}$$

$$3 = 1 + 2 = \text{O}$$

• س / حدد الأخطاء الموجودة في وزن المعادلات الكيميائية التالية ٢٤

①

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$Al + 3I_2 \longrightarrow Al2I_3$		$Al + I_2 \longrightarrow AlI_3$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
١ = Al ٦ = I	١ = Al ٦ = I	١ = Al ٢ = I	١ = Al ٢ = I

②

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O_2 + \text{طاقة}$		$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O + \text{طاقة}$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
٢ = H ٢ = O	٢ = H ٢ = O	٢ = H ٢ = O	٢ = H ١ = O

③

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$CH_2 + 3O_2 \longrightarrow C 2O_2 + H_2 2O + \text{طاقة}$		$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + \text{طاقة}$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
١ = C ٢ = H ٦ = O	١ = C ٢ = H ٦ = ٢ + ٤ = O	١ = C ٤ = H ٢ = O	١ = C ٢ = H ٢ = ١ + ٢ = O


◀ أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث الطاقة:

وجه المقارنة	(أ) - التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية	(ب) - التفاعلات الماصة للطاقة الحرارية
التعريف	[هو ذلك التفاعل الذي يتحرر خلاله طاقة]	[هو ذلك التفاعل الذي يمتص خلاله طاقة]
أهم سمات التفاعل	- تكون المتفاعلات أقل استقرار من النواتج - تكون طاقة روابط المتفاعلات أعلى من طاقة روابط النواتج - تكون الطاقة مع النواتج (يمين السهم) - تنقسم إلى نوعين : ١. تحرير سريع : فيه تتحرر الطاقة بسرعة ٢. تحرير بطئ : فيه تتحرر الطاقة ببطء	- تكون المتفاعلات أكثر استقرار من النواتج - تكون طاقة روابط المتفاعلات أقل من طاقة روابط النواتج - تكون الطاقة مع المتفاعلات (يسار السهم)
صور الطاقة	تظهر الطاقة بالصور التالية : (طاقة حرارية ، طاقة صوتية ، طاقة كهربائية ، طاقة صوتية)	
أمثلة	○ احتراق الفحم النباتي (تحرير سريع) ○ صدأ الحديد (تحرير بطئ)	○ الطاقة الكهربائية اللازمة لكسر جزيئات الماء (تفاعلات التحلل الكهربائي) ○ الكمادات الباردة التي توضع على مكان الألم
	$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + \text{طاقة}$	$2H_2O + \text{طاقة} \longrightarrow 2H_2 + O_2$


■ أمثلة أخرى على وزن المعادلة الكيميائية
س : أوزن المعادلات الكيميائية التالية :



■ الحد :



②




■ الحد :



③




■ الحد :



④



■ الحد :



■ المعادلة :- (١)

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٣ = Na	٣ = Na	١ = Na	١ = Na
١ = Al	١ = Al	١ = Al	١ = Al
٣ = Cl	٣ = Cl	١ = Cl	٣ = Cl

■ المعادلة :- (٢)

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٢ = K	٢ = K	١ = K	١ = K
٢ = Br	٢ = Br	٢ = Br	١ = Br
٢ = Cl	٢ = Cl	١ = Cl	٢ = Cl

■ المعادلة :- (٤)

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٦ = Fe	٦ = Fe	٢ = Fe	٢ = Fe
٢ + ٨ = O	١ + ٩ = O	٢ + ٤ = O	١ + ٢ = O
١٠ =	١٠ =	٦ =	٤ =
١ = C	١ = C	١ = C	١ = C

(الدرس الثاني : سرعة التفاعلات الكيميائية)

◀ أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث طريقة حدوثها :

١- تلقائية

٢- غير تلقائية

◀ تعريف طاقة التنشيط :

[هو الحد الأدنى (الأقل) من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي] أو [هو الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي]

◀ سرعة التفاعل الكيميائي

تعريف	[هو مقياس لمدى سرعة حدوث التفاعل الكيميائي]
كيفية قياس سرعة التفاعل الكيميائي	<ul style="list-style-type: none"> • سرعة استهلاك أحد المتفاعلات • سرعة تكون أحد النواتج
العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي	١. درجة الحرارة ٢. تركيز المواد المتفاعلة ٣. مساحة السطح (منطقة التلامس)

◀ العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي :

وجه المقارنة	التعريف	الأثر على سرعة التفاعل الكيميائي	الأمثلة
١. درجة الحرارة		ارتفاع درجة الحرارة يزيد من معدل التصادمات بين الجزيئات وزيادة التصادمات بين الجزيئات يوفر طاقة تكفي لكسر الروابط (طاقة التنشيط)	<ul style="list-style-type: none"> ○ حفظ الفواكه واللحوم داخل الثلاجة ○ نضوج العجين أو الكيك داخل الفرن
٢. التركيز (تركيز المواد المتفاعلة)	<ul style="list-style-type: none"> • تعريف التركيز: [هو كمية المادة الموجودة في حجم معين] 	زيادة تركيز المواد المتفاعلة يزيد من التصادمات بين الجزيئات وهذا بدوره يوفر طاقة تكفي لكسر الروابط (طاقة التنشيط)	
٣. مساحة السطح (منطقة التلامس)		زيادة مساحة منطقة التلامس بين المواد المتفاعلة يزيد من سرعة التفاعل	<ul style="list-style-type: none"> ○ برادة الحديد تصدأ بمعدل أسرع من قضيب من الحديد (بافتراض أن الكتلة واحدة) ○ نشارة الخشب تشتعل بمعدل أسرع من قطعة من الخشب (بافتراض أن الكتلة واحدة)

