



تم تحميل ملف المادة من مكتبة طلابنا
زورونا على الموقع 

www.tlabna.net

مكتبه طلابنا تقدم لكم كل ما يحتاج المعلم والمعلمه والطلبه ، الطبعات الجديده للكتب والحلول ونماذج الاختبارات والتحاضير وشروحات ال دروس بصيغة الورد والبي دي اف وكذلك عروض البوربوينت.



tlabna



www.tlabna.net

التهيئة

أوجد قيمة كل من العبارتين الآتىتين عند القيم المعطاة
بجوارهما :

$$1) 3s + c \text{ إذا كانت } s = -4, c = 2$$

$$3s + c$$

$$(2) + (-4)^3 =$$

$$10 - = 2 + 12 - =$$

$$2) -m^2 + 3k \text{ إذا كانت } m = -8, k = 3$$

$$-m^2 + 3k$$

$$(-8)^3 + (-8)^2 - =$$

$$25 = 9 + 16 =$$

٣) سارات: تمثل العبارة $\frac{ف\text{ كم}}{ل\text{ لتر}}$ معدل استهلاك الوقود في السيارة. احسب (إلى أقرب جزء من عشرة) معدل استهلاك سيارة للوقود إذا استهلكت ١٢ لترًا من البنزين عندما قطعت ٩٥ كم.

$$\text{معدل استهلاك الوقود} = \frac{95}{12} = 7.9$$

حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$٤) س - ٣ = ٨ + ٣$$

$$س = ٨ - ٣$$

$$س = ٥$$

$$16 = 4 \times 4$$

$$s = 4$$

$$v = \frac{s}{3} \times 6$$

$$v \times 3 = \frac{s}{3} \times 3$$

$$s = 21$$

$$9 = 1 + 2 \times 4$$

$$1 - 9 = 1 - 1 - 2$$

$$s = 8$$

$$s = 4$$

$$10 - 2s = 8 + 3s$$

$$10 - 2s = 8 + 3s$$

$$10 - 2s = 8 + 3s$$

$$2 - s = 8 + 3s$$

$$(13 + 2s) - 2 = (2 - 3s)$$

$$13s - 6 = 2s - 2$$

$$13s + 2s = 2 - 6$$

$$15s = 2 - 6$$

$$s = -4$$

١٠) **نقود:** في حصالة صالح ٣٢٥ ريالاً، ويرغب في أن يدخر ١٠٠ ريال كل شهر. اكتب معادلة لإيجاد المبلغ (م) الذي سيصبح معه بعد (ن) شهراً.

$$m = 100 + 325n$$

حل كلاً من المعادلتين الآتىتين:

$$18 = |11 + s| \quad (11)$$

$$18 = 11 + s$$

$$s = 11 - 18$$

$$s = -29$$

$$18 = 11 - s$$

$$s = 18 - 11$$

$$s = 7$$

$$\{7, -29\}$$

$$16 = |2 - 3s| \quad (12)$$

$$16 = 2 - 3s$$

$$s = 2 - 14$$

$$s = \frac{14}{3} - 2$$

$$16 = 2 - 3s$$

$$s = 3 - 18$$

$$s = -6$$

$$\{-6, \frac{14}{3} - 2\}$$

١٣) دراسة: في دراسة مسحية، وجد أن ٧٢٪ من الأشخاص يفضلون قراءة الكتب الدينية ، فإذا كانت نسبة الخطأ في النتائج ٢٪، فما الحدان الأدنى والأعلى للنسبة المئوية للذين يفضلون قراءة الكتب الدينية.

الحد الأدنى: ٧٠٪

الحد الأقصى: ٧٤٪

٤-١

حل المتباينات بالجمع أو بالطرح

تحقق

حل كلاً من المتباينتين الآتىتين، وتحقق من صحة الحل:

$$8 < 22 - m$$

المتباعدة الأصلية

$$8 < 22 - m$$

أضف 8 إلى كلا الطرفين

$$8 + 8 < 22 - m$$

بسط

$$16 < 22 - m$$

مجموعة الحل: {كل الأعداد الأقل من 30}.

تحقق: للتحقق من صحة الحل عوض عن m في المتباعدة الأصلية بعدين مختلفين على أن يكون أحدهما أقل من 30 والأخر أكبر من 30.

$$14 - \leq 19 -$$

$$d - \leq 14 -$$

$$d - 14 + 19 \leq -$$

بسط

$$d \leq -5$$

مجموعة الحل: {كل الأعداد الأكبر أو تساوي - 5}.

تحقق: للتحقق من صحة الحل عوض عن d في المتباينة الأصلية بثلاثة أعداد مختلفة على أن يكون أحدها - 5، والعدد الثاني أكبر من - 5 والعدد الثالث أصغر من - 5.

$$2) حل المتباينة
$$f + 8 \geq 18 .$$$$

$$f + 8 \geq 18$$

$$f + 8 - 8 \geq 18 - 8$$

$$f \geq 10$$

مجموعة الحل: { $f | f \geq 10$ }.

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، ثم مثل مجموعه حلها بيانياً على خط الأعداد:

$$n - 1 > 10 \quad (1)$$

المتبينة الأصلية


اطرح 9 من كلا الطرفين

$$n - 1 > 10 \quad (2)$$

$$n - 9 - 1 > 10 - 9 \quad (3)$$

$$-1 > n$$

مجموعه الحل: $\{n | n < -1\}$.



$$h - 5 \geq 12 + h \quad (1)$$

المتبينة الأصلية

$$h - 5 \geq 12 + h \quad (2)$$

اطرح h من كلا الطرفين

$$h - h - 5 \geq 12 + h - h \quad (3)$$

$$-5 \geq 12$$

مجموعه الحل: $\{h | h \leq -5\}$.



٤) **تسوق**: يرغب خالد في إنفاق ١٩٥ ريالاً في مركز تجاري، فائض فنيضاً بمبلغ ٧٥ ريالاً، وحزاماً بمبلغ ٤٢ ريالاً. فإذا أراد أن يشتري بنطالاً، فما المبلغ الذي يمكن أن يدفعه لذلك؟

$$س + ٧٥ + ٤٢ \geq ١٩٥$$

أطرح ١١٧ من الطرفين

$$س + ١١٧ \geq ١٩٥$$

$$س + ١١٧ - ١١٧ \geq ١٩٥ - ١١٧$$

$$س \leq ٧٨ \text{ ريالاً.}$$

يجب ألا يزيد ثمن البنطلون عن ٧٨ ريال.



المثالان ١

حل كلاً من الم tapiات الآتية، ثم مثل مجموقة حلها بيانياً على خط الأعداد:


$$1) \quad s - 3 < 7$$

أضف 3 إلى كلاً من الطرفين

$$3 + s - 3 < 7 + 3$$

$$s < 10$$

مجموقة الحل: $\{s \mid s < 10\}$.




$$٢) ٥ \leq ٧ + ص$$

اطرح ٧ من الطرفين

$$٥ - ٧ \leq ٧ - ٧ + ص$$

$$-٢ \leq ص$$

مجموعة الحل: $\{ص | ص \geq -٢\}$.




$$٣) ٢ > ٦ + ق$$

اطرح ٦ من الطرفين

$$٢ - ٦ > ٦ - ٦ + ق$$

$$ق < -٤$$

مجموعة الحل: $\{ق | ق < -٤\}$.




$$4 + k \geq 11$$

اطرح 4 من الطرفين

$$4 - 4 + k \geq 11 - 4$$

$$k \geq 7$$

مجموعة الحل: $\{k \mid k \leq 7\}$.



$$n - 1 < 10$$

أضاف 1 إلى كل من الطرفين

$$1 + n - 1 < 1 + 10$$

$$n < 11$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n < 11\}$.




$$6) 8n \leq 7n - 3$$

اطرح 7n من الطرفين

$$8n - 7n \leq 7n - 7n - 3$$

$$n \leq -3$$

مجموعة الحل: $\{n | n \leq -3\}$.



المثال 3

عرف كل متغير فيما يأتي، ثم اكتب المتباينة وحلها:

7) ناتج جمع عدد وأربعة لا يقل عن 10.

لتكن $n = \text{العدد}$,

$$n + 4 \leq 10$$

اطرح 4 من كلا الطرفين

$$n + 4 - 4 \leq 10 - 4$$

$$n \leq 6$$

مجموعة الحل: $\{n | n \leq 6\}$.

٨) ناتج جمع عدد وثلاثة يقل عن مثليه.

$$\text{لتكن } n = \text{العدد،}$$

$$n + 3 > 2n$$

اطرح n من كلا الطرفين

$$n - n + 3 > 2n - n$$

$$3 > n$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n < 3\}$.

المثال ٤

٩) مدينة العاب، تتحرك أرجوحة إلى الأمام وإلى الخلف وترتفع قليلاً في كل مرة بحيث لا يتجاوز أقصى ارتفاع لها ١٣٧ قدماً. فإذا كان ارتفاع الأرجوحة بعد ٣٠ ثانية هو ٤٥ قدماً، فكم قدماً يمكن أن يزيد ارتفاعها على ذلك؟

$$s + 45 \geq 137$$

اطرح ٤٥ من كلا الطرفين

$$s + 45 - 45 \geq 137 - 45$$

$$s \geq 92$$

أي لا يزيد الارتفاع عن ٩٢ قدماً.

تدريب وحل المسائل:



المثالان ١ ، ٢

حل كلاً من المتباينات الآتية، ثم مثل مجموعه حلها بيانياً على خط الأعداد:


$$10) \quad f - 6 \leq 3$$

أضف 6 إلى كلا الطرفين

$$f - 6 + 6 \leq 3 + 6$$

$$f \leq 9$$

مجموعه الحل: { $f | f \leq 9$ }.




$$r \geq 8 - 7 \quad (11)$$

أضاف 7 إلى كلا الطرفين

$$r - 8 \geq 8 + 7$$

$$r \geq 15$$

مجموعة الحل: $\{r | r \geq 15\}$.




$$t - 3 < 8 \quad (12)$$

أضاف 3 إلى كلا الطرفين

$$t - 3 + 3 < 8 + 3$$

$$t < 11$$

مجموعة الحل: $\{t | t < 11\}$.




$$13 < 18 + r \quad (13)$$

اطرح 18 من كلا الطرفين

$$13 - 18 < 18 - r \quad 13 - 18 < -r$$

$$-5 < r$$

مجموعة الحل: $\{r | r > -5\}$.




$$x \geq j + 5 \quad (14)$$

اطرح 5 من كلا الطرفين

$$x - 5 \geq j - 5$$

$$x \geq j - 5$$

مجموعة الحل: $\{x | x \geq j - 5\}$.




$$15) -23 \leq q - 30$$

أضف 30 إلى كلا الطرفين

$$-23 + 30 \leq q - 30 + 30$$

$$7 \leq q$$

مجموعة الحل: $\{q | q \geq 7\}$.




$$16) w - 5 \geq 2w$$

اطرح w من كلا الطرفين

$$w - w - 5 \geq 2w - w$$

$$-5 \geq w$$

مجموعة الحل: $\{w | w \leq -5\}$.



$$17) 3x + 6 \geq 2x$$

اطرح ٢ ص من كلا الطرفين


$$3x - 2x + 6 \geq 2x - 2x$$

اطرح ٦ من كلا الطرفين

$$0 \geq x + 6$$

$$x \leq -6$$

مجموعة الحل: { $x | x \leq -6$ }.




$$18) 13 - 12 > 9 - 12 + 9$$

اطرح ١٢ من كلا الطرفين

$$1 - 12 > 9 - 12$$

$$-11 > -3$$

مجموعة الحل: { $a | a > -3$ }.



مثال ٣

عُرِّف كل متغير فيما يأتي، ثم اكتب المتابينة، وحلها:

١٩) ناتج طرح ٨ من عدد ما أقل من ٢١.

n = العدد المتغير،

$$n - 8 < 21$$

أضف ٨ إلى كلا الطرفين

$$n - 8 + 8 < 21 + 8$$

$$n < 29$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n < 29\}$.

٢٠) مثلاً عدد ما أكبر من مجموع ذلك العدد و ٩.

n = العدد المتغير،

$$2n > n + 9$$

$$2n - n > n - n + 9$$

$$n > 9$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n > 9\}$.

مثال ٤

حل كلاً من المسائل (٢١-٢٤) بتعریف متغیر، وكتابه متباینة، ثم حلها:

- ٢١) **توفير:** يريد عانم أن يشتري سيارة ثمنها ٥٤٤٠٠ ريال على الأقل. وقد وفر ١٣٠٠٠ ريال، فما المبلغ المتبقى عليه لشراء السيارة؟

المتغير(ب) هو المبلغ المتبقى،

$$ب + ٥٤٤٠٠ \leq ١٣٠٠٠$$

$$ب + ١٣٠٠٠ - ٥٤٤٠٠ \leq ١٣٠٠٠ - ١٣٠٠٠$$

$$ب \leq ٤١٤٠٠$$

مجموعة الحل: {ب | ب ≤ ٤١٤٠٠ }.

المبلغ المتبقى على الأقل ٤١٤٠٠ ريال.

٢٢) تقنية: أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من ٢١ مليوناً ممن هم بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة يستعملون الإنترنٌت. منهم ١٦ مليوناً يستعملون الإنترنٌت في المدرسة، فما عدد الذين يستعملون الإنترنٌت خارج المدرسة؟

افرض أن $s =$ عدد الذين يستعملون الإنترنٌت خارج المدرسة بالملايين؛

$$s > 21 - 16$$

$$s > 5$$

مجموعة الحل: $\{s \mid s > 5\}$.

هناك أكثر من ٥ ملايين من الشباب يستعملون الإنترنٌت خارج المدرسة.

(٢٣) مكتبة، أضاف أحمد ٢٠ كتاباً جديداً إلى مكتبه فأصبح لديه أكثر من ٦١ كتاباً. فكم كتاباً كان لديه؟

افرض أن $ق =$ عدد الكتب الموجودة في مكتبة أحمد أصلاً،

$$٦١ < ٢٠ + ق$$

اطرح ٢٠ من كلا الطرفين

$$٦١ - ٢٠ < ٢٠ - ق$$

$$٤١ < ق$$

مجموعة الحل: $\{ق | ق > ٤١\}$.

أي أنه كان في المكتبة أصلاً أكثر من ٤١ كتاباً.

(٢٤) كرة سلة، أراد أحد اللاعبين إحراز ١٥٠ نقطة على الأقل في هذا الموسم. وسجل حتى الآن ١٢٣ نقطة، فكم نقطة بقيت عليه؟

افرض أن $ص =$ عدد النقاط اللازمة،

$$١٥٠ \leq ١٢٣ + ص$$

اطرح ١٢٣ من كلا الطرفين

$$١٢٣ - ١٢٣ \leq ١٥٠ - ص$$

$$٢٧ \leq ص$$

مجموعة الحل: $\{ص | ص \leq ٢٧\}$.

أي يجب أن يسجل ٢٧ نقطة على الأقل.

٢٥) متحطرون، يتطلع بعض الشباب لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة ومنى. ويقول أحدهم: إن بإمكانه أن يتطلع لمدة لا تتجاوز ٣٠ ساعة في الأسبوع. فإذا تطوع المدة المبينة في الجدول المجاور، فما المدة التي يستطيع أن يتطلع بها هذا الأسبوع؟

الزمن	المكان
٥ ساعات و ٢٠ دقيقة	مكة المكرمة
٤ ساعات و ١٥ دقيقة	منى

افرض أن الزمن المتبقى = ن ساعة.

$$30 \geq 4\frac{1}{4} + 5\frac{1}{3} + n$$

اضرب كلا الطرفين في ١٢

$$30 \times 12 \geq \frac{17}{4} \times 12 + \frac{16}{3} \times 12 + n \times 12$$

$$360 \geq 51 + 16 + 12n$$

اجمع

$$360 \geq 64 + 51 + 12n$$

اطرح ٦٤ من كلا الطرفين

$$360 - 64 \geq 115 + 12n$$

بسط

$$360 - 115 \geq 115 + 12n$$

اقسم كلا الطرفين على ١٢

$$245 \geq 12n$$

$$n = 20\frac{5}{12}$$

أي الوقت المتبقى ٢٠ ساعة و ٢٥ دقيقة على الأكثر.


حل كلاً من المتباينات الآتية، وتحقق من صحة الحل، ثم مثل مجموعه الحل بيانياً على خط الأعداد:

$$26) 1 < 4 + 5 \leq 10 \quad \text{ص} < 4, 5 \leq 10 \quad \text{ص}$$

$$1 < 4 + 5 \leq 10 \quad \text{ص} - 1 < 4 \leq 9 \quad \text{ص}$$

$$4 < \text{ص}$$

مجموعه الحل: $\{\text{ص} | \text{ص} > 4\}$.



$$27) \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \geq \frac{2}{3} - \frac{3}{2} \quad d$$

اطرح $\frac{1}{2}$ من كلا الطرفين

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{9} \geq \frac{2}{3} - \frac{3}{2} \quad d$$

أضف $\frac{2}{3}$ إلى كلا الطرفين

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{9} \geq \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \quad d$$


$$\frac{6}{9} + \frac{4}{9} \geq \quad d$$

$$\frac{10}{9} \geq \quad d$$

مجموعه الحل: $\{d | d \geq \frac{10}{9}\}$



٢٨) تمثيلات متعددة، سوف تكتشف في هذه المسألة عمليتي الضرب والقسمة على المتباينات.



أ) هندسياً، افترض وجود ١٢ كجم على الكفة اليمنى للميزان، و ١٨ كجم على الكفة اليسرى. وضع بالرسم هذا الموقف.



ب) عددياً، اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

$$12 \text{ كيلوجرام} < 18 \text{ كيلوجرام.}$$

ج) جدولياً، أنشئ جدولًا يبين نتيجة جعل الكتل على كلتا الكفتين: مثلين، وثلاثة أمثال، وأربعة أمثال. وأنشئ جدولًا آخر يبين نتيجة إنفاص الكتل على كلتا الكفتين بنسبة $\frac{1}{2}$ ، و $\frac{1}{3}$ ، و $\frac{1}{4}$ وخصص عموداً للمتباعدة في كلا الجدولين.

١٨	>	١٢	
٣٦	>	٢٤	٢
٥٤	>	٣٦	٣
٧٢	>	٤٨	٤
٩	>	٦	$\frac{1}{2}$
٦	>	٤	$\frac{1}{3}$
٤,٥	>	٣	$\frac{1}{4}$

د) لفظياً، صف تأثير ضرب أو قسمة كل من طرفي المتباعدة، في العدد الموجب نفسه، على المتباعدة.

إذا ضرب طرفاً متباعدة في عدد موجب تكون المتباعدة الناتجة صحيحة،
وإذا قسم كلاً من طرفي متباعدة صحيحة على عدد موجب تكون المتباعدة
الناتجة صحيحة أيضاً.

مسائل (مهارات التفكير العليا:

٢٩) **بيان:** حدد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين التمثيل البياني لـ كل من المتباينتين $\{x\}$ و $x \geq 4$.

كلا الخطرين مظلل إلى اليسار، هناك دائرة عند العدد ؛ في المتباعدة
س < ؛ تدل على أن ؛ ليست ضمن التمثيل، وهناك نقطة عند ؛ في المتباعدة
س \geq ؛ تدل على أن ؛ ضمن التمثيل.

٣٠) تحد: افترض $b > d + \frac{1}{3}$, $j + 1 > \alpha - 4$, $d + \frac{5}{8} < \alpha + 2$. رتب الأعداد a, b, c, d من الأصغر إلى الأكبر.

$$\frac{1}{3} + d < \text{افرض ب}$$

$$t - 1 > 1 + \frac{1}{2}$$

$$r + l < \frac{5}{8} + s$$

ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر: $ج > د > ب$

(٣١) مسالة مفتوحة:

اكتب ثلث متبادرات خطية تكافيء ص > ٣.

$$ص + ١ > ٢$$

$$ص - ١ > ٤$$

$$ص + ٣ > ٠$$

(٣٢) اكتب: لخض عملية حل المتبادرات الخطية وتمثيل مجموعة حلها على خط الأعداد.

أن حل المتبدرة الخطية مشابه لحل المعادلة الخطية إذ يجب أن تفصل المتغير في أحد طرفي المتبدرة، وعند تمثيل المتبدرة بيانياً استعمل دائرة مفتوحة إذا كانت المتبدرة تضم إحدى الإشارتين <أو>، إن كانت غير ذلك استعمل دائرة مغلقة.

وإذا كان المتغير في الجهة اليمنى من المتبدرة وكانت إشارة المتبدرة "أقل من" أو "أكبر من أو يساوى" فإن التمثيل البياني يمتد إلى اليسار وما عدا ذلك يمتد التمثيل البياني إلى اليمين.

تدریب علی اختبار

٣٣) ما مجموعه حل المتباعدة $7 + s > 95$

ج) $\{s | s > -2\}$

أ) $\{s | s > 2\}$

د) $\{s | s < -2\}$

ب) $\{s | s < 2\}$

$$s + 7 > 95$$

$$7 - 7 + s > 95 - 7$$

$$s > -2$$

الإجابة: ج) $\{s | s > -2\}$.

٣٤) كان متوسط درجات ١٠ طلاب في مادة الكيمياء ٧٨٠. ثم اكتشف المعلم أنه أخطأ في رصد درجة أحد هؤلاء الطلاب فكانت أقل من درجته الحقيقية بعشرين درجات. فكم يصبح متوسط درجات الطلاب بعد التعديل؟

$$790 = 10 + 780$$

$$\text{إذن متوسط الدرجات} = \frac{790}{10}$$

مراجعة تراكمية

(٣٥) اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ٣) والمعامد للمستقيم $s = -3s + 7$. (الدرس ٢-٣)

$$s - s_1 = m(s - s_1)$$

$$s = \frac{1}{3}s + 7$$

(٣٦) أوجد قيمة الحد الثامن عشر في المتتابعة: -٩، -٧، -٥، -٣، ... (الدرس ٩-٤)

$$h_n = a + (n - 1)d$$

$$h_{18} = 2 \times (1 - 18) + 9$$

$$h_{18} = 2 \times 17 + 9$$

$$h_{18} = 34 + 9$$

$$h_{18} = 43$$

الحد الثامن عشر = 43

(٣٧) حل المعادلة : $| ٦ - ٣s | = ١٢$. (الدرس ٥ - ١)

$$12 = | 6 - 3s |$$

$$12 = 6 - 3s$$

$$12 = 6 - 3s$$

$$6 = 3s$$

$$18 = 3s$$

$$6 = s$$

$$6 = s$$

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة :

حل كل معادلة فيما يأتي:

$$56 = 8s \quad (38)$$

بقسمة طرفي المعادلة $\div 8$ $s = 7$

$$120 - 4s = 4 \quad (39)$$

بقسمة طرفي المعادلة $\div 4$ $s = 30$

$$\frac{2}{5}l = 4 \quad (40)$$

بضرب طرفي المعادلة $\times 5$ $20 = 2l$

بقسمة طرفي المعادلة $\div 2$ $l = 10$

$$\frac{2}{3}s = 6 \quad (41)$$

بقسمة طرفي المعادلة $\div -6$ $s = \frac{1}{9}$


معلم الجبر: حل المتباينات

التمثيل والتحليل

استعمل بطاقة الجبر لحل كل من المتباينات الآتية:


$$1) -3s > 9$$

الخطوة ١: استعمل بطاقة لاصقة لتغطي إشارة المساواة على لوحة المعادلة، واكتب على البطاقة إشارة $<$ ثم مثل المتباينة ببطاقات الجبر.




$$-3s > 9$$

الخطوة ٢: بما أنك لا تريدين قيمة س السالبة فيجب حذف بطاقات س السالبة إضافة ٣ بطاقات موجبة إلى كل طرف من طرفي اللوحة واحذف الأزواج الصفرية.




$$س - 3 > س + 3 > س$$

الخطوة ٣: أضف ٩ من بطاقات العدد سالب ١ إلى طرفي اللوحة واحذف الأزواج الصفرية.



$$س > س - 9$$

الخطوة ٤: افصل البطاقات إلى مجموعتين.



$$س < -3$$

مجموعة الحل: $\{س | س < -3\}$.

(٢) $-4s < -4$

الخطوة ١: استعمل بطاقة لاصقة لتغطي إشارة المساواة على لوحة

المعادلة، واكتب على البطاقة $<$ ثم مثل المتباعدة ببطاقات الجبر.

الخطوة ٢: بما أنك لا تريدين قيم s السالبة فيجب حذف بطاقات s السالبة
إضافةً إلى بطاقات موجبة إلى كل طرف من طرفي اللوحة واحذف الأزواج
الصفرية.

$-s + s < -4 + 4s$

الخطوة ٣: أضف s من بطاقات العدد الموجب ١ إلى طرفي اللوحة
واحذف الأزواج الصفرية.

$s < 4s$

الخطوة ٤: افصل البطاقات إلى مجموعتين

$s > 1$

مجموعة الحل: $\{s | s > 1\}$.

$$3) -5 \leq s \leq 15$$

الخطوة ١ : استعمل بطاقة لاصقة لتغطي إشارة المساواة على لوحة

المعادلة، واتكتب على البطاقة إشارة \leq ثم مثل المتباعدة ببطاقات الجبر.

الخطوة ٢ : بما أنك لا تريدين قيم s السالبة فيجب حذف بطاقات s السالبة

إضافة ٥ بطاقات موجبة إلى كل طرف من طرفي اللوحة واحذف الأزواج الصفرية.

$$-5 + s + 5 \leq 15 + 5$$

الخطوة ٣ : أضف ١٥ بطاقة من العدد سالب ١ إلى طرفي اللوحة واحذف

الأزواج الصفرية.

$$-15 \leq s$$

الخطوة ٤ : افصل البطاقات إلى مجموعتين.

$$s \geq 3$$

مجموعة الحل: $\{s | s \geq 3\}$.

$$4) -6s \geq -12$$

الخطوة ١: استعمل بطاقة لاصقة لتغطي إشارة المساواة على لوحة المعادلة، واتكتب على البطاقة إشارة \geq ثم مثل المتباعدة ببطاقات الجبر.

الخطوة ٢: بما أنك لا ت يريد قيم s السالبة فيجب حذف بطاقات s السالبة بالإضافة لـ ٦ بطاقات موجبة إلى كل طرف من طرفي اللوحة واحذف الأزواج الصفرية.

$$-6s + 6s \geq -12 + 6s$$

الخطوة ٣: أضف ١٢ من بطاقات العدد موجب ١ إلى طرفي اللوحة واحذف الأزواج الصفرية.

$$12 \geq 6s$$

الخطوة ٤: افصل البطاقات إلى مجموعتين.

$$s \leq 2$$

مجموعة الحل: $\{s \mid s \leq 2\}$.

٥) هل معامل س موجب أم سالب في كل من المتباينات السابقة؟

معامل س سالب في كل المتباينات السابقة.


٦) ماذا تلاحظ على إشارة المتباينة وموقع المتغير في الأسئلة ١ - ٤، وحلولها؟

عند كتابة حل المتباينة (في كل من الأسئلة ١ - ٤) مع بقاء المتغير في الطرف نفسه كما في المتباينة الأصلية فإن إشارة المتباينة تنعكس.

٧) مثل حل المتباينة: $3s \geq 12$ بيانياً، وبين كيف يختلف حل هذه المتباينة عن حل المتباينة: $-3s \geq 12$.

$$3s \geq 12$$

$s \geq 4$; رمز المتباينة يبقى كما هو عند حل $3s \geq 12$, بينما ينعكس اتجاهه عند حل $-3s \geq 12$.




$$-3s \geq 12$$

$$-3s + 12 \geq 12 + 3s$$

$$-12 \geq 12 + 3s$$

$$-24 \geq 3s$$

$$-8 \geq s$$



٨) اكتب قاعدة لحل مطابقات تتضمن الضرب والقسمة.

عند حل مطابقات تتضمن الضرب يبقى رمز المطابقة دون تغير عند الضرب في عدد موجب ولكنه ينعكس عند الضرب في عدد سالب، وعند حل مطابقات تتضمن القسمة يبقى رمز المطابقة دون تغير عند القسمة على عدد موجب ولكنه ينعكس عند القسمة على عدد سالب.

٤-٢

حل المطالبات بالضرب أو بالقسمة

تحقق

١) علم النبات، تتركز أشجار النخيل بصفة خاصة في العالم العربي، حيث يوجد به أكثر من ٦٠ مليون شجرة تمثل نحو ثلاثة أخماس أشجار النخيل في العالم. فما عدد أشجار النخيل في العالم؟

افرض عدد أشجار النخيل ص؛

$$\text{اضرب كلا الطرفين في } 5 \quad \frac{3}{5} \text{ ص} \leq 60$$

$$60 \times 5 \leq \frac{3}{5} \times 5$$

$$\text{اقسم كلا الطرفين على } 3 \quad 300 \leq \text{ص}$$

$$\text{ص} \leq 100$$

هناك أكثر من ١٠٠ مليون شجرة نخيل في العالم.

حل كلاً من المتباينات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$8 - \frac{n}{6} \geq 0$$

اضرب كلا الطرفين في 6

$$8 \geq \frac{n}{6}$$

$$6 \times 8 \geq 6 \times \frac{n}{6}$$

$$n \leq 48$$

لتحقق:

$$8 = \frac{48}{6}$$

$$10 - \frac{4}{3}f < 0$$

اضرب كلا الطرفين في $\frac{3}{4}$

$$10 - \frac{4}{3}f < 0$$

$$\left(\frac{3}{4} - \right) \times 10 - > f > \left(\frac{4}{3} - \right) \times \left(\frac{3}{4} - \right)$$

$$f > \frac{15}{2}$$

$$f > 7\frac{1}{2}$$

لتحقق: عوض بعدد أقل من $7\frac{1}{2}$ في المتباينة الأصلية.

إذا كانت $f = 6$ فإن

$$8 - = 6 \times \frac{4}{3}$$

والعدد $- 8$ أكبر من العدد $- 10$.

$$3 - \leq m \frac{1}{5} \quad (ج)$$

$$\text{اضرب كلا الطرفين في } 5 \quad m - \leq m \frac{1}{5}$$

$$5 \times 3 - \leq m \frac{1}{5} \times 5$$

$$15 - \leq m$$

للتحقق: عوض عن $m = 15$ في المتباينة الأصلية.

$$\text{إذا كانت } m = 15 - \times \frac{1}{5} \quad \text{فإن } 15 - = 3 -$$

$$t > \frac{3}{8} \quad (د)$$

$$\text{اضرب كلا الطرفين في } 8 \quad t > \frac{3}{8}$$

$$8 \times 5 > t > \frac{3}{8} \times 8$$

$$\text{اقسم كلا الطرفين على } 3 \quad t > 40$$

$$t > 13 \frac{1}{3}$$

للتحقق: عوض بعدد أقل من $13 \frac{1}{3}$ في المتباينة الأصلية.

إذا كانت $t = 8$ فإن $8 > \frac{3}{8} \times 3$ ، والعدد 3 أصغر من العدد 5

$$(5 > 3).$$

٥٨ > ف ٨) ١٣

اقسم كلا الطرفين على ٨ ٥٨ > ف ٨

$$\frac{58}{8} > \frac{8}{8}$$

٧,٢٥ > ف

٦ر < ٤٢ -) ٣ب

- ٤٢ < ٦ر اقسم كلا الطرفين على ٦

$$6 > \frac{42}{6} -$$

- ٧ < ر

١٥ جـ) - ١٢ هـ >

اقسم كلا الطرفين على - ١٢ - ١٥ < ٥١٢ -

$$\frac{15}{12} - > \frac{12}{12} -$$

١٢٥ - > ٥

٦ > $\frac{1}{2}$ ن - (د)

اضرب كلا الطرفين في - ٢ - ٦ > $\frac{1}{2}$ ن -

$$6 \times 2 - < \frac{1}{2} n - \times 2 -$$

ن < - ١٢



مثال ١

١) كتب: جمعت دار نشر أكثر من ٥٥٠٠ ريال من بيع كتاب جديد، ثمن النسخة الواحدة ١٥ ريالاً.
عُرف متغيراً، واكتب متباعدة تمثل عدد الكتب المبيعة، ثم حلها وفسّر الحل.

لتكن k عدد الكتب المبيعة

$$5500 > 15k$$

$$k < 366,67$$

أي عدد الكتب المبيعة على الأقل ٣٦٦,٦٧ كتاب.

المثالان ٢، ٣

حل كلاً من المتباينات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$30 < \frac{1}{2}n \quad (2)$$

اضرب كلا الطرفين في ٢

$$\frac{1}{2}n < 30$$

$$\frac{1}{2} \times 2 < 30 \times 2$$

ن > ٦٠

للتتحقق: عوض عن n بعدد أصغر من ٦٠ في المتباينة الأصلية، إذا كانت $n = 40$ ، فإن $40 \times \frac{1}{2} = 20$ والعدد ٢٠ أصغر من ٣٠ ($30 > 20$).

$$108 < 9L \quad (3)$$

اقسم كلا الطرفين على ٩

$$108 < 9L$$

L < 12

للتتحقق: أي $108 < 15 \times 9 = 135$

$$v \leq \frac{7}{6} - (\epsilon)$$

اضرب كلا الطرفين في - ٦ $7 \leq 2 \frac{1}{6} -$

$$7 \times 6 - \geq 2 \frac{1}{6} \times 6 -$$

$$42 - \geq$$

للحقيق: $7,3 = \frac{44}{6}$

$$v > 84 - (5)$$

اقسم كلا الطرفين على ٧ $7 > 84 - m$

$$\frac{7}{7} > \frac{84}{7} - m$$

$$1 > m -$$

للحقيق: $15 = 7 \times 10 - m$

تدريب وحل المسائل:



مثال ١

عرف متغيراً في كل من المسؤلين ٦ ، ٧ واتكتب متباعدة، وحلها، ثم فسر الحل:

- ٦) **هاتف نقال**: اشتري سعد بطاقة هاتف بمبلغ ٥٠ ريالاً، فإذا كان سعر الدقيقة ٢٤,٠ ريال، فكم دقيقة يمكنه أن يتكلم بهذه البطاقة؟

نفرض أن المتغير (د) هو عدد الدقائق التي يمكن أن يتكلمها سعد بالبطاقة المدفوعة.

$$٥٠ \geq ٢٤,٠ \cdot د$$

$$٣,٢ \geq د$$

أي يمكن لسعد أن يتحدث ٢٠٨ دقيقة على الأكثر.

٧) **نقود:** يحتاج رائد إلى ٥٦٠ ريالاً على الأقل لتنعيم نفقات رحلته. وقد بدأ بتوفير ٢٥ ريالاً من مصروفه كل أسبوع. فبعد كم أسبوع يمكنه القيام بالرحلة؟

افرض أن المتغير s هو عدد الأسابيع يجب أن يوفر فيها رائد

$$25s \leq 560$$

$$s \leq 22,4$$

أي أن على رائد أن يوفر مدة ٢٣ أسبوع حتى يجمع المبلغ الكافي للرحلة.

المثالان ٢، ٣

حل كلاً من المطابقات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$17 - \frac{1}{4}m \geq 8$$

$$17 - m \geq -\frac{1}{4}$$

اضرب كلا الطرفين في ٤

$$17 - 4m \geq -\frac{1}{4}$$

$$m \geq -68$$

$$\text{لتحقق: } -16,5 = -\frac{1}{4} > -17$$

$$\frac{ج}{11} - < 11 - (9)$$

اضرب كلا الطرفين في - ١١ -

$$ج \frac{1}{11} - < 11 -$$

$$ج \frac{1}{11} - \times 11 - > 11 - \times 11 -$$

$$ج > 121$$

للتحقق: - ١١ - ١١,٩ - = ١١ ÷ ١٢٢ - أي >

$$\frac{s}{2} \geq 10 - (10)$$

اضرب كلا الطرفين في - ٢ -

$$\frac{s}{2} \geq 10 -$$

$$\frac{s}{2} \times 2 - \leq 10 - \times 2 -$$

$$s \geq 20$$

للتحقق: - ١٠ - ٩ - = ٢ - ÷ ١٨ - أي <

$$\frac{f}{6} > 72 - (1)$$

اضرب كلا الطرفين في - ٦

$$\frac{f}{6} > 72 -$$

$$\frac{f}{6} \times 6 - < 72 - \times 6 -$$

$$f > 432$$

للتتحقق: $72 - 71,6 - = \frac{430}{6}$ أي $< -$

$$14 < \frac{2}{3} h - (2)$$

اضرب كلا الطرفين في $\frac{3}{2}$

$$14 < \frac{2}{3} h \cdot \frac{3}{2}$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)14 < \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$21 < h$$

للتتحقق: $14 < 18 = 27 \times \frac{2}{3}$ أي $< -$

$$18 - \geq \frac{1}{6} - (13)$$

$$\text{اضرب كلا الطرفين في } -6 \quad 18 - \geq \frac{1}{6} - n$$

$$18 - \times 6 - \leq \frac{1}{6} - \times 6 - n \leq 108$$

$$\text{للتتحقق: } 18 - = 108 \times \frac{1}{6} -$$

$$(14) \quad 96 \geq 6s$$

$$\text{اقسم كلا الطرفين على } 6 \quad 96 \geq 6s$$

$$\frac{96}{6} \geq \frac{6}{6}s$$

$$s \geq 16$$

$$\text{للتتحقق: } 6 \times 16 = 96$$

٦٤) ٤ س >

اقسام كلا الطرفين على ٤ س > ٦

$$\frac{64}{4} > \frac{4}{4}$$

س > ١٦

للتتحقق: ٤ × ١٥ = ٦٠ أى >

١٦) ٣٢ < ٢ ع

اقسام كلا الطرفين على ٢ ع < ٣٢

$$\frac{2}{2} > \frac{32}{2}$$

ع < ١٦

للتتحقق: ٣٢ < ٢ ع - ٢٨ = ١٤ أى >

٧٢ - < ط ٦ -) ١٧

اقسم كلا الطرفين على - ٦

٧٢ - < ط ٦ -

$$\frac{72}{6} - < \frac{6}{6}$$

٦ > ط

للتحقق: - $6 \times 11 = 66$ - أي <

٣٣ - ≤ ٣٣ -) ١٨

اقسم كلا الطرفين على - ٣

٣٣ - ≤ ٣٣ -

$$\frac{3}{3} - \geq \frac{33}{3} -$$

٣٣ - ≤ س

للتحقق: - $12 \times 3 = 36$ - أي >

١٩) $f < 5$

أقسم كلا الطرفين على ٧ -

$$\frac{5}{7} < \frac{f}{7}$$

$$f > \frac{5}{7}$$

للتتحقق: $-7 < f < 5$

٢٠) دورات تدريبية: من متطلبات الحصول على شهادة في إحدى الدورات حضور المشترك $\frac{3}{5}$ أيام التدريب على الأقل. فإذا حقق سالم هذا الشرط بحضوره ١٥ يوماً تدريبياً. فما الحد الأعلى لعدد أيام التدريب في هذه الدورة؟

افرض $n =$ عدد أيام التدريب،

$$\frac{3}{5}n < 15$$

$$\text{أقسم كلا الطرفين على } \frac{5}{3}$$

$$\frac{5}{3} < \frac{n}{5} < \frac{5}{3} \times 15$$

$$n > 25$$

إذن الحد الأعلى لعدد أيام التدريب في هذه الدورة ٢٥ يوم.

٢١) **متاحف:** أراد مدرس التاريخ في مدرسة متوسطة اصطحاب طلابه لزيارة متحف، فإذا كان سعر بطاقة دخول المتحف للفرد ٨ ريالات، فما عدد الطلاب الذين يمكن أن يزوروا المتحف بمبلغ ٢٦٠ ريالاً؟

$$\text{أقسـم كـلا الـطـرـفـيـن عـلـى } 8$$

$$\frac{260}{8} \geq \frac{8}{8}$$

$$32 \frac{1}{2} \geq$$

أدنـى عـدـد الطـلـاب لا يـزـيد عـلـى ٣٢ طـالـباً.


٢٢) **بنزين:** إذا كان سعر لتر البنزين لا يقل عن ٤٥,٠ ريال، فكم لترًا من البنزين (الأقرب جزء من عشرة) يمكن أن يشتري خالد بمبلغ ٢٤ ريالاً؟

$$24 \leq 45$$

$$L \leq 53,3$$

أي أن عدد اللترات لا يزيد عن ٥٣,٣ لتر.


اكتب أمام كل متباعدة رمز التمثيل البياني لحلها:




(ب)



(ج)



(د)



(هـ)

$$9 \geq \frac{2}{3}h - 22$$

$$\begin{aligned} 9 \times \left(\frac{3}{2} -\right) &\leq h \left(\frac{2}{3} -\right)\left(\frac{3}{2} -\right) \\ \frac{27}{2} - &\leq h \\ \text{(تمثيل ب)} \end{aligned}$$

$$8 \leq k \leq 25 \quad (24)$$

$$\frac{8}{25} \leq k$$

$$0,32 \leq k$$

(تمثيل جـ)

٤,٥ < س < ٣,٦ (٢٥)

$$\frac{4,5}{3,6} < س$$

س < ١,٢٥

التمثيل: (د)

٢,٣ < ت < ٢,٥ (٢٦)

$$\frac{2,3}{5} < ت$$

ت < ٠,٤٦

التمثيل: (ج)


٢٧) حلوي: أشار ثلثا طلاب الصف الثالث في مدرسة متوسطة، وعدهم أقل من ٣٦ طالباً، إلى أنهم يفضلون الشوكولاتة على غيرها من الحلوي. فما عدد طلاب الصف؟

$$\begin{aligned} 36 &> \frac{2}{3}t \\ 36 \times \frac{3}{2} &> \frac{2}{3}t \times \frac{3}{2} \\ 54 &> t \end{aligned}$$

أي أن عدد الطلاب أقل من ٥٤ طالباً.

٢٨) تمثيلات متعددة: حجم الهرم = $\frac{1}{3}$ مساحة قاعدته \times الارتفاع.

أ) هندسياً، ارسم هرماً قاعدته مربعة طول ضلعها ٩ سم وارتفاعه ٥ سم.



ب) عددياً، إذا كان حجم الهرم 72 سم^3 ، فاكتبه معادلة لإيجاد ارتفاعه.

$$ح = \frac{1}{3} ل \cdot ع$$

$$\frac{1}{3} ل \cdot ع = 72$$

$$ل \cdot ع = 216$$

$$\frac{216}{ل^2} = ع$$

ج) جدولياً، أنشئ جدولًا يبين قيم ع عند مال = 12، 9، 6، 3، 1

١٢	٩	٦	٣	١	L
$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{3}$	٦	٢٤	٢١٦	ع

د) عددياً، اكتب متباينة لقيم L الممكنة على أن يكون L < ع، واكتبه متباينة أخرى لقيم ع الممكنة على أن يكون L > ع.

$$L < ع \text{ عندما } 0 < L < 6$$

$$L > ع \text{ عندما } ع > 6$$

مسائل مهارات التفكير العليا:

اكتشف الخطأ: حل كل من طلال وجمال المتباعدة $6 \leq x \leq 8$. فما كانت إجابته صحيحة؟ اشرح تبريرك.

جمال

$$\begin{array}{r} 84 - 6 \\ \hline 84 - 6 \\ \hline 14 - 6 \\ 14 - 6 \end{array}$$

طلال

$$\begin{array}{r} 6 - 84 \\ \hline 6 - 84 \\ \hline 6 - 14 \\ 6 - 14 \end{array}$$

طلال؛ لأنه لا يحتاج لعكس اتجاه إشارة المتباعدة عند القسمة على عدد موجب.

تحدي: حدد إذا كانت المتباعدةان $s^2 > 1$ ، $s > 1$ متكافئتين أم لا، وفسر إجابتك.

لا؛ غير متكافئين، مجموعة حل $s^2 > 1$ تتضمن قيمة سالبة.

٣١) **نحو:** وضع إذا كانت العبارة "إذا كان $A > B$ فإن $\frac{1}{A} < \frac{1}{B}$ " صحيحة أحياناً، أم دائماً، أم غير صحيحة أبداً، وفسر إجابتك.

أحياناً، فهي صحيحة عندما $A > 0, B < 0$.

٣٢) **مسألة مفتوحة:** اكتب موقفاً من واقع الحياة يمثل المتباينة $-\frac{5}{8} \leq s$.

لا تزيد درجة الحرارة في مكان ما على $-\frac{5}{8}$ سيليزية.


٣٣) **أكتب:** أشرح الحالات التي يتغير فيها اتجاه إشارة المتباينة، وأعط أمثلة تؤيد ذلك.

يتغير اتجاه إشارة المتباينة عند الضرب أو القسمة على عدد سالب، لتبقي المتباينة صحيحة.

مثال: عند قسمة $-2 < s < 2$ على -2 ينتج أن $s > -2$.

تدريب على اختبار

٣٤) اجابة قصيرة، أوجد قيمة س في الشكل الآتي.



$$\text{طول الوتر} = \sqrt{2^2(15) + 2^2(20)} = 25 \text{ سم}$$

$$\text{تشابه مثلثات} \quad \frac{6}{15} = \frac{s}{25}$$

$$6s = 15 \times 25$$

$$s = 10 \text{ سم}$$

٣٥) ما حل المعادلة : $4s - 3 = 2s$ ؟

$\frac{1}{2}$ (ج)

٢ - (أ)

٢ (د)

$\frac{1}{2} - (ب)$

$$4s - 3 = 2s$$

$$4s + 2s - 3 = 2s + 2s$$

$$6s - 3 = 3 + 3$$

$$6s = 6$$

$$s = \frac{1}{2}$$

الحل (ج)


مراجعة تراكمية

حل كلاً من الم tapiات الآتية، وتحقق من صحة الحل، ثم مثله على خط الأعداد: (الدرس ١٠١)

$$36) ٤ < ٨ + أ$$

$$4 - ٨ < ٥ + أ$$
$$أ > ٨ - ٤$$

مجموعة الحل: $\{أ | أ > 8 - 4\}$.



$$37) ١١ + ص \leq ٢٤$$

$$ص \leq ٢٤ - ١١$$

$$ص \leq ٣٥$$


مجموعة الحل: $\{ص | ص \leq 35\}$.



$$7 - 2b < -b \quad (38)$$

$$7 - b + 2b > 2b - b \\ 7 > b$$

مجموعة الحل: $\{b | b > 7\}$.




(٣٩) مثل المعادلة $k = 16.5s + 75$ بيانياً، ثم أوجد قيمة k عندما $s = 8$. (الدرس ٣٠٢)

$$k = 16.5s + 75$$

$$8 \times 16.5 + 75 = k$$

$$207 = k$$



الاستعداد للدرس اللاحق

حل كل معادلة فيما يأتي:

$$19 = 11 + 4s \quad (40)$$

$$11 - 19 = 11 - 11 + 4s \quad (41)$$

$$4s = 8$$

$$\frac{8}{4} = \frac{4s}{4}$$

$$s = 2$$

$$2s - 7 = 4 + 9 \quad (41)$$

$$2s - 9 = 7 + 4$$

$$2s - 16 =$$

$$\frac{16}{2} = \frac{s2 -}{2}$$

$$s - 8 =$$

$$8 - 4s = 2 + \frac{1}{\xi} \quad (42)$$

$$\frac{1}{4} - 8 - = 4s - 2$$

$$\frac{33}{4} - = 2s -$$

$$s = 5, 5$$

$$12 + 3l = (3 - l) \frac{1}{\xi} \quad (43)$$

$$12 + 3l = 1 - l$$

$$1 + 12 = 3l - l$$

$$13 = -l$$

$$l = -13$$

$$١٣ = \frac{٥ + ٧}{٢} \quad (٤٤)$$

$$\text{بضرب طرفي المعادلة} \times ٢ \quad ٢٦ = ٥ + ٧$$

$$٢٦ - ٥ = ٥ - ٥ + ٧$$

$$٢١ = ٧$$

$$\text{بقسمة طرفي المعادلة} \div ٧ \quad ٣ = ر$$

$$\frac{٣ - ب}{٤} = ب - \frac{١}{٢} \quad (٤٥)$$

$$\text{بضرب طرفي المعادلة} \times ٤ \quad ٣ - ب = ب - ٢$$

$$٣ - ب = ب - ٢$$

$$٣ = ب$$

٤-٣

حل المطالبات متعددة الخطوات

تحقق

١) **نقود:** أعلنت إحدى المطابع عن عرض خاص لطباعة ٤٠٠ نسخة من نشرة إعلانية بأقل من ١٣٣,٥٠ ريالاً. فإذا علمت أن سعر الطباعة يشمل رسوماً مقدارها ١٣,٥٠ ريالاً، فما سعر طباعة النسخة الواحدة من النشرة الإعلانية؟

$$(عدد النسخ \times السعر) + الرسوم > 133,5$$

$$133,5 + 13,5 > 133,5$$

$$120 < 133,5$$

$$س < 0,3$$

أي سعر النسخة الواحدة أقل من ٠,٣٠ ريال.

حل كلاً من المتباينتين الآتىين:

$$12 \leq 23 - 10$$

اطرح ١٠ من كلا الطرفين

$$2 \leq 13 - 10$$

اقسم كلا الطرفين على ٢

$$1 \leq 6.5 - k$$

$$k \leq -6.5$$

مجموعة الحل: $\{k | k \leq -6.5\}$.

$$11 + 4x < 43$$

اطرح ١١ من كلا الطرفين

$$4x < 32$$

اقسم كلا الطرفين على ٤

$$x < 8$$

مجموعة الحل: $\{x | x < 8\}$.

٣) نصف عدد زائد اثنين أكبر من سبعة وعشرين.

افرض أن العدد = s

اطرح ١٠ من كلا الطرفين

$$\frac{1}{2}s + 2 < 27$$

اضرب كلا الطرفين في ٢

$$\frac{1}{2}s < 25$$

$$s < 50$$

مجموعة الحل: $\{s | s < 50\}$.

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، وتحقق من صحة الحل:

$$42 \geq (3 - 5)u$$

خاصية التوزيع

$$42 \geq 3u - 5$$

أضف ١٨ إلى كلا الطرفين

$$42 \geq 18 - 3u$$

اقسم كلا الطرفين على ٣٠

$$14 \geq u$$

$$u \leq 14$$

مجموعة الحل: $\{u | u \leq 14\}$.

للتحقق: $6(2 \times 14 - 5) = 42$ أي $42 = 42$ والحل صحيح

$$(h - 8)3 - < (6 + h)2$$

$$53 + 24 - < 12 + 52$$

$$12 + 24 > 52 - 53$$

$$36 > 5$$

$$\{36 > 5\}.$$

للتحقق: $(34 - 8)(3 - 6) < (6 + 34)2$

العبارة صحيحة. $78 < 80$

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، وتحقق من صحة الحل:

$$18 - 6(4j + 3) \leq -18$$

المتباينة الأصلية

$$18 - 6(4j + 1) \leq -18$$

خاصية التوزيع

$$18 - 24j - 6 \leq -18$$

جمع الحدود المتشابهة

$$6 - 24j \leq -6$$

بما أن نتيجة الحل عبارة صحيحة دائماً، فإن مجموعة حل هذه المتباينة هي مجموعة الأعداد الحقيقية.

مجموعة الحل: $\{j \mid j \text{ عدد حقيقي}\}$.

$$4m - 4(2m + 5) \geq 6$$

المتباينة الأصلية

$$4m - 4(2m + 5) \geq 6$$

خاصية التوزيع

$$4m - 8m - 20 \geq 6$$

جمع الحدود المتشابهة

$$-4m - 20 \geq 6$$

بما أن نتيجة الحل عبارة غير صحيحة أبداً، فإن مجموعة حل هذه المتباينة هي المجموعة الخالية \emptyset .

مجموعة الحل: \emptyset



مثال ١

١) قوارب، إذا أراد أربعة أشخاص ركوب قارب ومعهم حمولة مقدارها ٤٠ كجم، فاكتب متباينة لإيجاد معدل الكتلة المسموح بها للشخص الواحد (ن)، وحلها، علماً بأن حمولة القارب ٤٠٠ كجم.

$$ن + ٤٠ \leq ٤٠٠$$

$$ن + ٤٠ - ٤٠ \leq ٤٠ - ٤٠$$

$$ن \leq ٣٦٠$$

$$ن \leq ٩٠$$

وزن الشخص الواحد ٩٠ كجم على الأكثر.

مثال ٢

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، وتحقق من صحة الحل:

$$43 - 3s < 7 + s \quad (1)$$

$$7 - 43 < 7 - 3s \quad (2)$$

اضرح 7 من كلا الطرفين

$$-3s > 36 \quad (3)$$

اقسم كلا الطرفين على -3

$$s < -12 \quad (4)$$

مجموعة الحل: $\{s | s < -12\}$.

للحقيق: عوض عن s في المتباينة الأصلية بعده أصغر من 12 ،

لتكن $s = -13$ ، فأن $-3 \times -13 - 7 = 46$ ، إذا العدد الناتج أكبر

من 43 ($47 > 43$).

$$25 + 6 > 17 - 4 \quad (3)$$

$$6 - 4 < 17 - 25$$

$$2 < 17 - 24$$

$$2 < -21$$

مجموعة الحل: $\{m | m < -21\}$.

للتتحقق: عوض عن m في المتباينة الأصلية بعده أكبر من -21 .

لتكن $m = 1$,

$$25 + 1 > 17 - 1 \times 4$$

$26 > 13$ العبارة صحيحة.

مثال ٣

عرف المتغير، واكتب المتباينة وحلها، ثم تتحقق من صحة الحل:

٤) أربعة أمثال عدد ناقص ٦ أكبر من ٨ مضافاً إليها مثلاً ذلك العدد.

المتغير هو العدد n

$$n - 6 < 8 + 2$$

$$n - 6 < 8 + 2$$

$$n < 14$$

$$n > 7$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n > 7\}$.

المثالان ٤ ، ٥

حل كلاً من المتباينات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$5 - 6 \geq 3(5s - 2)$$

$$-6 \geq 15s - 6$$

$$15s \leq 0$$

$$s \leq 0$$

مجموعة الحل: $\{s \mid s \leq 0\}$.

للحتحقق: $3(5 \times 1 - 2) = 9$ أي أكبر من -6

$$6 - 5(4 + q) < 3(4 - q)$$

$$-5q - 20 < 12 - 3q$$

$$20 - 12 > 3q - 5q$$

$$8 > -2q$$

$$q < -4$$

مجموعة الحل: $\{q | q < -4\}$.

$$\text{للتتحقق: } -5(4 + 2) < 3(4 - 2)$$

العبارة صحيحة.

$$7 - 3s \leq 1(2 + 9) - 4s$$

$$-3s + 2 + 9 \leq 8s$$

$$11 - 3s \leq 8s$$

$$11 \leq 11s$$

مجموعة الحل: \emptyset

تدريب و حل المسائل:



مثال ١

٨) **تسوق**: ي يريد سليمان شراء حاسوب ثمنه ٢١٩٥ ريالاً وعددًا من البرمجيات التعليمية تمن الواحدة ٥ ريالاً. فإذا كان معه ٢٥٠٠ ريال، فاكتب متباينة لإيجاد أكبر عدد من البرمجيات يمكن أن يشتريها، ثم حلها، وفسّر إجابتك.

$$2500 \geq 5s + 2195$$

$$305 \geq s$$

$$s \leq 61$$

إذا يمكنه أن يشتري ٦ برمجيات على الأكثر.

مثال ٢

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، وتحقق من صحة الحل:

$$10 - 7 > 37 \quad (٩)$$

$$10 - 7 - 7 > 7 - 37$$

$$10 - > 30$$

$$d > -3$$

$$\text{مجموعة الحل: } \{d \mid d > -3\}.$$

للتحقق: $47 = 4 - 10 + 7 < 37$ أي أكبر من 37

$$12 > 6 + \frac{5}{4}c \quad (١٠)$$

$$12 > 6 + c + \frac{5}{4}$$

$$c > \frac{5}{4} - 6$$

$$\left(\frac{4}{5} - \right)6 < c \left(\frac{5}{4} - \right)\left(\frac{4}{5} - \right)$$

$$c < \frac{24}{5}$$

$$\text{مجموعة الحل: } \{c \mid c < \frac{24}{5}\}.$$

للتحقق: $6 = 0 \times \frac{4}{5} - 6$ أصغر من 12

مثال ٣

عرف متغيراً في كل من الأسئلة (١١-١٣)، واتبِع المتابنة وحلها، ثم تحقق من صحة الحل:

١١) ثلاثة أرباع عدد ناقص تسعة يساوي على الأقل اثنين وأربعين.

المتغير هو العدد s

$$42 \leq 9 - \frac{3}{4}s$$

$$9 + 42 \leq 9 - \frac{3}{4}s$$

$$51 \leq \frac{3}{4}s$$

$$\frac{4}{3} \times 51 \leq \frac{3}{4}s \times \frac{4}{3}$$

$$s \leq 68$$

مجموعة الحل: $\{s | s \leq 68\}$.

١٢) عشرة لا تزيد على ٤ أمثال مجموع مثلثي عدد مع ثلاثة.

$$4(n^2 + 3n + 1) \leq 10$$

$$12n + 12 \geq 10$$

$$12 - 12 - 10 \geq 12n + 12$$

$$-2 \geq n - 8$$

$$n \geq -\frac{1}{4}$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n \leq -\frac{1}{4}\}$.

١٣) ثلاثة أمثال مجموع عدد مع سبعة أكبر من خمسة أمثال ذلك العدد ناقص ثلاثة عشر.

$$3(n + 7) < 5n - 13$$

$$3n + 21 < 5n - 13$$

$$5n - 13 + 21 > 3n + 21$$

$$2n > 8$$

$$n > 4$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n > 4\}$.

المثالان ٤ ، ٥

حل كلاً من المتباينتين الآتتين، وتحقق من صحة الحل:

$$14 - (3n + 7) > 6n.$$

$$21 - 9 > 6n$$

$$21 + 9 < 6n$$

$$27 < 6n$$

$$n < \frac{1}{3}$$

مجموعة الحل: $\{n | n < -\frac{1}{3}\}$.

التحقق:

$$1 - (3 + 7) > 6 \times 1$$

العبارة صحيحة.

$$15) 3(2 - b) > 10 - 3(b - 6).$$

$$6 - 3b > 10 - 3b + 18$$

$$6 - 3b > 28 - 3b$$

العبارة صحيحة.

مجموعة الحل: $\{b \mid b \text{ عدد حقيقي}\}$.

التحقق:

$$13) 1(1 - 2) > 10 - 3(1 - 6)$$

العبارة صحيحة.

١٦) حل المتباعدة: $6(m - 3) < 5(2m + 4)$, موضحا كل خطوة مع التبرير.

المتباعدة الأصلية

$$6(m - 3) < 5(2m + 4)$$

خاصية التوزيع

$$6m - 18 < 10 + 20m$$

اطرح ٦م من الطرفين

$$6m - 6m - 18 < 10 + 20m - 6m$$

بالتبسيط

$$-18 < 4m + 20$$

اطرح ٢٠ من الطرفين

$$-18 - 20 < 4m + 20 - 20$$

بالتبسيط

$$-38 < 4m$$

اقسم طرفي المتباعدة على ٤

$$-9.5 < m$$

مجموعة الحل: $\{m \mid m > -9.5\}$.

١٧) علوم: درجة حرارة جسم الجمل الطبيعية $97,7^{\circ}\text{F}$ في الصباح. وإذا لم يشرب ماءً حتى الظهر ترتفع درجة حرارته إلى أكثر من 104°F . اكتب متباعدة تمثل درجة حرارة جسم الجمل عند الظهر إذا لم يشرب ماءً بكل من درجتي الحرارة الفهرنهايتية (ف)، والسليزية (س)، علمًا بأن

$$F = \frac{9}{5}S + 32$$

ف < ١٠٤ متباعدة درجة الحرارة الفهرنهايتية.

$$F = \frac{9}{5}S + 32$$

$$32 + \frac{9}{5}S = 104$$

$$\frac{9}{5}S = 72$$

$$S = 360$$

$$S = 40$$

س < ٤٠ متباعدة الحرارة السلزية.

(١٨) هدايا: يردد حسن أن يشتري هدية لوالدته بمبلغ لا يقل عن ٥٠٠ ريال. ويملك الآن ٣٨٠ ريالاً، ويمكنه توفير ١٠ ريالات يومياً.

أ) اكتب متباعدة لإيجاد عدد الأيام اللازمة ليتحقق هدفه، ثم حلها.

$$500 \geq 380 + 10n$$

$$380 - 380 \geq 500 - 380 - 10n$$

$$120 \leq 10n$$

$$12 \leq n$$

مجموعة الحل: $\{n \mid n \leq 12\}$.

ب) مثل مجموعة الحل بيانياً.




١٩) تمثيلات متعددة، سوف تحل في هذه المسألة المتباينات المركبة، مثل التي يكون فيها العدد س أكبر من ٤، وأقل من ٩.

أ) عددياً، اكتب متباينتين منفصلتين لهذه العبارة.

$$س > 4, س < 9$$

ب) بيانياً، مثل مجموعة حل المتباينة الأولى باللون الأحمر، ومجموعة حل المتباينة الثانية باللون الأزرق، وظلل بالقلم الفسفوري جزء التمثيل البياني الذي يتداخل فيه اللوان.



جـ) جدولياً، أنشئ جدولًا باستعمال عشر نقاط من خط الأعداد الذي مثّله متضمنة أعداداً من الجزرains. استعمل عموداً لكل متباعدة وعموداً ثالثاً بعنوان «حل مشترك»، وأملأ الجدول بكتابه «صح» أو «خطأ».

كلتا المتباعدةين صحيحة	$s > 9$	$s < 4$	النقط
d	c	d	١
d	c	d	٢
d	c	d	٣
d	c	d	٤
c	c	c	٥
c	c	c	٦
c	c	c	٧
c	c	c	٨
d	d	c	٩
d	d	c	١٠

د) لفظياً، صف العلاقة بين الأجزاء الملونة في التمثيل البياني والجدول.

النقط التي تجعل المتباينة $s < 4$ صحيحة تقع في المنطقة الحمراء
والنقط التي تجعل المتباينة $s > 9$ صحيحة تقع في المنطقة
الزرقاء وبالتالي النقط التي تجعل المتباينة $4 < s < 9$ صحيحة تقع
في المنطقة المظللة بالقلم الفسفوري.

هـ) منطقياً، ماذا تتوقع أن يكون التمثيل البياني للمتباينة $4 < s < 9$ ؟

سيكون التمثيل هو الجزء المظلل بالقلم الفسفوري من خط الأعداد.

عرف المتغير في المسألة الآتية، واتكتب المتباعدة، ثم حلها، وفسّر إجابتك:

- ٢٠) **حيوانات**: كتلة حصان 414 كجم، وكتلته الطبيعية أقل من 390 كجم، ويمكن أن يفقد من كتلة 3 كجم في الأسبوع باستعمال برنامج غذائي معين. فكم أسبوعاً يلزم ليصل إلى كتلته الطبيعية؟

المتغير s هو عدد الأسابيع اللازمة ليعود الحصان إلى

الوزن الطبيعي

$$390 - 414 > 3$$

$$414 - 390 > 3$$

$$3 > 24$$

$$1 > 8$$

مجموعة الحل: $\{1 | 1 < 8\}$.

إذن بحاجة إلى أكثر من 8 أسابيع ليعود للوزن الطبيعي.

- ٢١) **نظرية الأعداد**: أوجد جميع المجموعات المكونة من ثلاثة أعداد صحيحة زوجية موجبة متالية لا يزيد مجموعها على 36 .

مجموعات الأعداد هي: $(2, 4, 6), (4, 6, 8), (6, 8, 10),$

$(8, 10, 12), (10, 12, 14)$.

حل كلاً من الم tapiات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$2(s - 4) \geq 2 + 3(s - 6) \quad (22)$$

$$2s - 8 \geq 2 + 3s - 18$$

$$2s - 8 \geq 3s - 16$$

$$16 - 8 \geq 3s - 2s$$

$$8 \geq s$$

مجموعة الحل: $\{s | s \leq 8\}$.

التحقق:

$$2(s - 4) \geq 2 + 3(s - 6) \quad (22)$$

العبارة صحيحة.

$$37 + 7s \geq 11 - 13s \quad (23)$$

$$13s - 7s \geq 11 + 37$$

$$6s \geq 48$$

$$s \geq 8$$

مجموعة الحل: $\{s | s \geq 8\}$

التحقق:

$$37 + 1 \times 7 \geq 11 - 1 \times 13$$

العبارة صحيحة.

$$4,7 - 2,5 > 1,5 + 5,6 \quad (24)$$

$$1,5 - 4,7 > - 2,5 \quad 6$$

$$6,2 > - 3,1$$

$$6,2 > - 3,1$$

$$6 > - 2$$

مجموعة الحل: $\{x | x > - 2\}$

التحقق:

$$4,7 - (3 - 2,5) > 1,5 + (- 5,6)$$

$- 15,3 > - 2,8$ العبارة صحيحة.

$$2s - \frac{2}{3} \leq s - 22 \quad (25)$$

$$\frac{2}{3}s - s \leq - 22 + \frac{2}{3}$$

$$-\frac{1}{3}s \leq - \frac{64}{3}$$

مجموعة الحل: $\{s | s \leq - \frac{64}{3}\}$

مسائل مهارات التفكير العليا:

٢٦) **نرير:** اشرح كيف يمكن أن تحل المتباينة: $-3 \leq f + 7 \leq -2$ دون أن تضرب كلا الطرفين في عدد سالب أو تقسمهما عليه.

أضف ٣ ف، ٢ إلى كل طرف فتصبح المتباينة $9 \leq 3f$ ثم اقسم كل طرف على ٣ لتحصل على $3 \leq f$.

٢٧) **تحد:** إذا كان للمتباينة $As + B < As + G$ عدد لا نهائي من الحلول، فما مجموعة حل المتباينة $As + B > As + G$? وضع الطريقة التي عرفت بها الإجابة.

Ø؛ إذا كانت المتباينة الأولى صحيحة دائماً، فعكسها خطأ دائماً.

٢٨) مسالة مفتوحة: اكتب متباينتين مختلفتين تحلان بخطوات متعددة ولهمما التمثيل البياني نفسه؟

$$2s + 4 < 2 \text{ و } 3s + 1 < -1$$

كلتا هما لها التمثيل البياني نفسه $s < -1$.

٢٩) حدد المتباينة التي تختلف عن المتباينات الثلاث الأخرى. وفسّر إجابتك.

$$13 - 5s > 2 + s$$

$$5 - 2s > 1 + s$$

$$3s - 5 < 4$$

$$4s + 9 < 3$$

$$s + 9 < -3$$

إنها المتباينة الوحيدة من بين المتباينات الأربع التي مجموعة حلها ليست $\{s | s < 3\}$.

٣٠) اكتب: أشرح متى تكون مجموعة حل المتباينة المجموعة الخالية أو مجموعة كل الأعداد الحقيقية، وأعط مثالاً على كل حالة.

المجموعة الخالية هي مجموعة حل المتباينة التي نتيجتها عبارة خطأ كما في $12 < 15$. أما المتباينة التي تبقى صحيحة مهما كانت قيمة s فتكون مجموعه حلها هي مجموعه الأعداد الحقيقية كما في $12 \geq 12$.

تدريب على اختبار

٣١) ما مجموعة حل الممتاينة:

$$4t + 2 > 8t - (6t - 9)$$

ج) $\{t | t < 4\}$

أ) $\{t | t > -6, 5\}$

د) $\{t | t > 4\}$

ب) $\{t | t < -6, 5\}$

الإجابة: ج) $\{t | t > 4\}$.

٣٢) اجابة قصيرة، تلقى ماجد ٧٢ ريالاً مقابل ٤ ساعات عمل. فكم ساعة يعمل بهذا المعدل، حتى يحصل على ١١٧٠ ريالاً؟

$$\frac{4}{72} = \frac{s}{1170}$$

$$4 \cdot 1170 = 72s$$

$$s = 65 \text{ ساعة.}$$

مراجعة تراكمية

(٣٣) حل المتباعدة: $\frac{ص}{٢} \geq -٥$ وتحقق من صحة الحل. (الدرس ٢-٤)

$$\frac{ص}{٢} \geq -٥$$

$$ص \geq -١٠$$

مجموعة الحل: {ص | ص ≥ -١٠}.


(٣٤) حل المتباعدة: ف - ٩ > ٢ وتحقق من صحة الحل ومثله على خط الأعداد. (الدرس ١-١)

$$ف - ٩ > ٢$$

$$ف - ٩ + ٩ > ٢ + ٩$$

$$ف > ١١$$

للتحقق: ١٠ = ٩ - ١ أي أصغر من ١١



(٣٥) حل المعادلة: $2(s - 3) = 5s + 12$ بيانياً، وتحقق من صحة الحل جبرياً. (الدرس ٤-٢)

الحل جبرياً:

$$2(s - 3) = 5s + 12$$

$$2s - 6 = 5s + 12$$

$$2s - 5s = 12 + 6$$

$$-3s = 18$$

$$s = -6$$

التحقق: $2(s - 3) = 5s + 12$

$$2(-6 - 3) = 5(-6) + 12$$


الحل بيانياً:

$$2(s - 3) = 5s + 12$$

$$2s - 6 = 5s + 12$$

$$-3s = 18$$

$$s = -6$$



إذا كان $q(s) = 4s - 3$ ، $h(s) = 2s^2 + 5$ ، فأوجد كلاً مما يأتي : (الدرس ٢-٢)

(٣٦) $q(٣)$

$$٣ - ٤ - \times ٤ =$$

$$١١ - = ٣ - ٨ - =$$

(٣٧) $h(٣)$

$$٥ - (٥ + ١٢ \times ٤) =$$

$$\Delta = ٥ - ٥ + \Delta =$$

(٣٨) $q(j)$

$$٣ - (٣ + \Delta) ٤ =$$


$$٣ - ١٢ + \Delta ٤ =$$

$$٩ + \Delta ٤ =$$


الاستعداد للدرس اللاحق

حدد على خط الأعداد جميع الأعداد المعطاة في كل مما يأتي:


(٣٩) $\{ -4, -2, 2, 4 \}$




(٤٠) $\{ -3, 0, 3, 6 \}$




(٤١) الأعداد الصحيحة الأصغر من ٣




(٤٢) الأعداد الصحيحة الأكبر من أو تساوي -٢



٤٣) {الأعداد الصحيحة الأصغر من -١}



٤٤) {الأعداد الصحيحة الواقعة بين -٤، ٣}



اختبار منتصف الفصل


4

حل كلاً من الم tapiات الآتية، ثم مثل مجموحة حلها بيانياً على خط الأعداد. (الدرس ٤ - ١)

$$1) \quad s - 8 < 4$$

$$s + 4 < s + 8$$


$$s > 12$$



$$2) \quad m + 2 \leq 6$$

$$m + 2 \leq 6 - 2$$

$$m \leq 4$$



$$b - 4 > 7 - 4$$

$$b - 3 > 4 + 4$$


$$b > 3 - 4$$



$$q - 9 \geq 12$$

$$q + 9 - q \geq 9 + 12$$

$$q \geq 21$$



٥) **مدينة الألعاب:** مع حمزة ٦٠ ريالاً، دفع منها ١٠ ريالات ثمن تذكرة دخول مدينة الألعاب.

أ) اكتب متباينة تبين المبلغ (s) الذي يمكن لحمزة إنفاقه داخل مدينة الألعاب، وحلها.

$$s \leq 50$$

ب) إذا أنفق حمزة ٢٠ ريالاً ثمن وجبة الغداء، فاكتب مثابنة تبين المبلغ الذي يمكن لحمزة إنفاقه، بعد دفع ثمن تذكرة الدخول وثمن وجبة الغداء. وحلها.

$$س \geq ٢٠ - ٥٠$$

$$س \geq ٣٠$$

عّرف كل متغير فيما يأتي، ثم اكتب المثابنة، وحلها:

٦) ناتج جمع عدد ٢ - لا يزيد على ٦ .

افترض أن المتغير هو العدد س

$$س - ٢ \leq ٦$$

$$س - ٢ + ٢ \geq ٦ + ٢$$

$$س \leq ٨$$

٧) ناتج طرح ٨ من عدد ما أكبر من ١ .

افترض أن المتغير هو العدد س

$$س - ٨ < ١$$

$$س - ٨ + ٨ < ١ + ٨$$

$$س < ٩$$

٨) العدد ٣ مضاعفاً إلى مثلي عدد أصغر من ذلك العدد.

افتراض أن المتغير هو العدد s

$$s^2 + 3 > s$$

$$s^2 - s > 3$$

$$s < -3$$

$$s < 3$$

٩) اختيار من متعدد: وفَرت عزيزة ٥٢ ريالاً، لشراء كتاب يزيد ثمنه على ٩٠ ريالاً، ما المبلغ الإضافي الذي يجب أن توفره عزيزة

لشراء الكتاب؟ (الدرس ٤-١)

أ) ٣٨ ريالاً.

ب) أكثر من ٣٨ ريالاً.

ج) ليس أكثر من ٣٨ ريالاً.

د) ٣٨ ريالاً على الأكثر.

الإجابة: ب) أكثر من ٣٨ ريالاً

حل كلاً من المطالبات الآتية، وتحقق من صحة الحل:

$$10) \frac{1}{3}x \leq 5$$

$$x \leq 15 \quad \text{بضرب طرفي المعادلة في 3}$$

التحقق

$$x = 18 \quad \text{إذن } 6 \leq 5$$

$$11) \frac{x}{5} > 4$$

$$x > 20 \quad \text{بضرب طرفي المعادلة في 5}$$

التحقق:

$$x = 25 \quad \text{إذن } 5 > 4$$

$$12) -8s < 24$$

$$s < -3 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة ÷ -8}$$

التحقق:

$$s = -4 \quad \text{إذن } 4 < 32$$

$$10 - 2m \geq 13$$

بقسمة طرفي المعادلة $\div 2$ $m \leq -5$

التحقق:

$$m = -6 \quad \text{إذن} \quad 10 - 2(-6) \geq 13$$

$$s > \frac{5}{2} \quad (14)$$

بضرب طرفي المعادلة $\times 2$ $s > \frac{5}{4}$

التحقق:

$$s = 1.5 \quad \text{إذن} \quad 0.25 < 0.5$$

$$45 - 9 \leq r \quad (15)$$

بضرب طرفي المعادلة $\times 6$ $w < 18$

التحقق:

$$w = 12 \quad \text{إذن} \quad 12 - 3 < 2$$

$$\frac{w}{6} < 3 \quad (16)$$

بضرب طرفي المعادلة $\times 6$ $w < 18$

التحقق:

$$w = 12 \quad \text{إذن} \quad 12 - 3 < 2$$

$$17) \frac{f}{7} > 2$$

$$f > 14 \quad \text{بضرب طرفي المعادلة \times 7}$$

التحقق:

$$f = 21 \quad \text{إذن } 21 > 3$$

حل كلاً من المطالبات الآتية، وتحقق من صحة الحل: (الدرس ٤ - ٣)

$$18) 14 < 2 < 4$$

$$4 < 2 + 14 < 2 + 2 \quad \text{بإضافة 2 للطرفين}$$

$$4 < 16$$

$$4 < 4 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة \div 4}$$

$$19) 2s + 11 \geq 10 - 5s$$

$$2s - 5s \geq 10 - 11$$

$$-3s \geq -1$$

$$s \leq \frac{1}{3}$$

$$9 - > 4 + b - (20)$$

بإضافة -4 للطرفين $-b + 4 - 9 - > 4 - 4$

قسمة طرفي المعادلة $\div -1$ $-b > 13 -$

$$b < 13$$

$$3 - \leq 1 + \frac{b}{4} (21)$$

بضرب طرفي المعادلة $\times 4$ $12 - \leq 4 + b$

بإضافة -4 للطرفين $b + 4 - 12 - \leq 4 - 4$

$$b \leq 16 -$$

$$8 + b^3 - > (1 + b) 2 - (22)$$

$$8 + b^3 - > 2 - b 8 -$$

$$2 + 8 > b^3 + b 8 -$$

$$10 > b^5 -$$

$$2 - < b$$

عرف المتغير، واتبِ المتباعدة وحلها، ثم تحقق من صحة الحل.

٤٣) ثلاثة أمثال عدد مضاعفٍ إليه ٨ لا يزيد على العدد مطروحاً منه ٤

افتراض أن المتغير هو العدد s

$$s^3 + 8 \geq s - 4$$

$$s^3 - s \geq -4 - 8$$

$$s^2 \geq -12$$

$$s \geq -6$$

معلم الجبر: قراءة العبارات المركبة

تمارين:

حدد ما إذا كانت كل من العبارات المركبة الآتية صحيحة أم لا، وفسر إجابتك:

١) العدد ٥ أولي أو العدد ٢ فردي.

العبارة صحيحة؛ لأن العدد ٥ أولي، فإذا أحدها العبارتين صحيحة، لذا فالعبارة المركبة صحيحة.

٢) للمثلث ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا.

العبارة صحيحة؛ لأن كلا جزئي العبارة المركبة صحيح، لذا فالعبارة المركبة صحيحة.

(٣) $١١ > ٥$ أو $٧ > ٩$

العبارة خطأ؛ لأن كلا العبارتين خطأ، لذا فالعبارة المركبة خطأ.

(٤) $٧ < ٣$ و $٠ < ٢$

العبارة خطأ؛ لأن (-٢) ليس أكبر من (-٠)، فإحدى العبارتين خطأ، لذا فالعبارة المركبة خطأ.

(٥) $٥ < ٨$ أو $٨ \neq ٨$

العبارة صحيحة؛ لأن (-٢) أكبر من (-٥)، فإحدى العبارتين صحيحة، لذا فالعبارة المركبة صحيحة.

(٦) $٢ < ٤$ و $٥ < ١٠$

العبارة خطأ؛ لأن ٥ ليس أكبر من ١٠، فإحدى العبارتين خطأ، لذا فالعبارة المركبة خطأ.

Σ-Σ


حل الم tapiقات المركبة

تحقّق

١) حل المُتباينة $6 \geq r + 7 > 10$ ، ومثل مجموعه الحل بيانياً.

$$\begin{aligned} 10 &> 7 + r \geq 6 \\ 10 &> 7 + r \quad \text{و} \quad 7 + r \geq 6 \\ 10 - 7 &> 7 - 7 + r \quad 7 - 7 + r \geq 6 - 7 \\ 3 &> r \quad r \leq 1 \end{aligned}$$

$$\text{مجموعة الحل: } \{r | -1 \leq r < 3\}$$



٢) صناعة: تنتج شركة جهازاً لا يقل طوله عن ١١,٢ سم، ولا يزيد على ١١,٤ سم. اكتب متباينة مركبة تصف الأطوال الممكنة لهذا الجهاز، ومثلها بيانياً.

ل طول الجهاز.

$$ل \leq ١١,٢ \text{ و } ل \geq ١١,٤$$



مجموعة الحل: $\{l \mid 11,2 \leq l \leq 11,4\}$.

حل كلاً من المتباينتين المركبتين الآتتين، ومثل مجموعة الحل بيانياً:

$$٣ \leq ١ - ٤ \text{ أو } ١ + ٣ \geq ٤$$

$$٣ \leq ١ - ٤ \quad \text{أو} \quad ١ + ٣ \geq ٤$$

$$١ + ٣ \leq ١ - ٤ \quad \text{أو} \quad ١ - ٤ > ١ + ٣$$



$$١ \leq ٤ \quad \text{أو} \quad ٤ < ١$$

مجموعة الحل: $\{a \mid a > 1 \text{ أو } a \leq 4\}$.

$$x > 3$$

$$x \leq 4$$

ايجاد الاتحاد



$$\text{ب) } s \geq 9 \text{ أو } 2 + 4s > 10$$


$$s \geq 9 \text{ أو } 2 + 4s > 10$$

$$2 - 10 + 4s > 2$$

$$4s > 8$$

$$s > 2$$

مجموعة الحل: $\{s | s \geq 9\}$.





المثالان ١، ٢

حل كلاً من المتباينات المركبة الآتية، ومثل مجموعه الحل بياناً:


$$2 \geq 14 - 8 \quad \text{و} \quad f - 4 \geq 2$$

$$f - 4 \geq 2 \quad \text{و} \quad 8 - 8 \geq f - 4$$

$$14 + 2 \geq 14 + 4 \quad f \leq 16$$

$$f \leq 16 \quad 12 \leq f$$

مجموعه الحل: $\{f | 12 \leq f \leq 16\}$.



$$r + 6 > 10 \quad \text{أو} \quad r - 3 < 8 \quad (2)$$

$$r - 3 < 10$$

$$r + 6 > 8$$


$$r + 3 < 10 \quad \text{أو} \quad r - 3 < 8$$

$$r + 6 > 8 \quad \text{أو} \quad r - 6 < 8$$

$$r < 7$$

$$r > 14$$

مجموعة الحل: $\{r | r < 7 \text{ أو } r > 14\}$.




$$0 < 31 \leq 7 + a \quad \text{أو} \quad 0 < a + 31 \quad (3)$$

$$0 < 7 - 31 \leq 7 - 7 + a \quad \text{أو} \quad 0 < a - 24$$

$$24 \leq a$$

$$6 \leq a$$

مجموعة الحل: $\{a | a > 6\}$.



$$7 > 4 + 2 \quad (4)$$

$$7 > 4 + 2 \quad (4)$$

$$7 - 4 > 4 - 2 \quad 7 - 4 > 4 - 2$$

$$2 < 4 \quad 2 < 4$$

مجموعة الحل: $\{q | 2 < q < 4\}$.



مثال ٢

٥) **دراجات**: ينصح صانعو الدراجات الجبلية ألا يقل ضغط الهواء في الإطارات عن ١٦ كجم للبوصة المربعة الواحدة ولا يزيد على ٣٦ كجم.

فإذا كان ضغط الهواء في إطار دراجة ١١ كجم للبوصة المربعة الواحدة، فما مدى الضغط الذي ينصح بإضافته إلى الإطارات؟

$$36 \geq s + 11 \geq 16$$

$$36 \geq s + 11 \geq 16$$

$$36 - 11 \geq s + 11 - 11 \geq 16 - 11$$

$$s \leq 25 \geq 5$$

$\{s | 5 \leq s \leq 25\}$.

مدى الضغط الذي ينصح بإضافته إلى الإطارات هو ٥ و ٢٥ للبوصة المربعة الواحدة.

تدريب وحل المسائل:



المثالان ١، ٣

حل كلاً من المتباينات المركبة الآتية، ثم مثل مجموعه الحل بيانيًّا:

$$٦) ن + ٢ - ٥ \leq ن + ٦ - ٦$$


$$ن + ٦ - ٦ \leq ٦ - ٥ \geq ن$$

$$ن + ٦ \leq ٦ + ٥ \geq ن$$

$$٦ - ٦ \leq ٦ - ٦ - ٥ \geq ٢ - ٢$$


$$ن \leq ١٢ \geq ن$$

$$\{ن | ن \geq ١٢\}$$




$$(7) \quad ص - 1 > 3 \text{ أو } ص + 1 < 7$$

$$\begin{array}{lll} 1 - > 3 + ص & \text{أو} & 7 \leq ص - 1 \\ ص - 1 - > 3 - 3 + ص & & 1 + 7 \leq 1 + ص \\ ص > -4 & & ص \leq 8 \\ \{ ص | ص \leq 8 \text{ أو } ص > -4 \}. & & \end{array}$$



$$(8) \quad 22 \geq 7 + ب \cdot 3 > 5 -$$

$$\begin{array}{lll} 22 \geq 7 + ب \cdot 3 & & 7 + ب \cdot 3 > 5 - \\ 22 - 7 \geq 7 - 7 + ب \cdot 3 & & 7 - 7 + ب \cdot 3 > 7 - 5 - \\ 15 \geq ب \cdot 3 & & ب \cdot 3 > 2 - \\ 5 \geq ب & & ب > 4 - \\ \{ ب | ب \geq 4 - \leq 5 \}. & & \end{array}$$



$$18 > 4 + 7 \geq 3 - (9)$$

$$18 > 4 + 7$$

$$4 + 7 \geq 3 -$$

$$4 - 18 > 4 - 4 + 7$$

$$4 - 4 + 7 \geq 4 - 3 -$$

$$14 > 7$$

$$7 \geq 7 -$$

$$2 > m$$

$$m \geq 1 -$$

$$\{2 > m \geq 1 - | m\}$$



مثال ٢

١٠) سرعة: تبين اللوحتان المجاورتان أقصى سرعة وأدنى سرعة على طريق. عبر عن ذلك بمتباينة، ومثلها بيانياً.



افرض أن ع تمثل السرعة.

$$125 \geq u \geq 60$$



١١) **نظرية الأعداد:** أوجد جميع المجموعات التي يتكون كل منها من عددين صحيحين فرديين متتاليين مجموعهما على الأقل ٨ ويقل عن ٢٤.


$$\begin{array}{ll}
 \text{افتراض العددين الفرديين } s, s+2 \\
 24 \geq s + (s+2) \\
 24 \geq 2s + 2 \\
 24 \geq 2s + 2 \\
 24 \geq 2s + 2 - 2 \\
 24 \geq 2s + 2 - 2 \\
 22 \geq 2s \\
 11 \geq s
 \end{array}$$

المجموعات: (٣، ٥)، (٥، ٧)، (٧، ٩)، (٩، ١١).


اكتب متباعدة مركبة تعبر عن كل تمثيل بياني فيما يأتي:



$$-1 \leq s \leq 4$$



$$s < -4 \text{ أو } s > 3$$



$$s \geq 3 \text{ أو } s \leq 6$$



$$s \geq -3 \text{ أو } s < 0$$

حل كلاً من المتبالتين المركبتين الآتتين، ثم مثل مجموعه حلها بيانياً:

$$9 + 2b \geq 6 - 5b \quad (16)$$

$$9 + 2b \geq 6 - 5b$$

$$6 + 9 \geq 6 - 3b$$

$$6 + 9 \geq 6 - 3b$$

$$15 \geq 3b$$

$$15 \geq 3b$$

$$5 \geq b$$

$$5 \geq b$$

$$b < 5$$

$$\{b \mid b < 5\}$$



$$8 > 1 - 3n \quad \text{أو} \quad 16 - 1 > 1 - 3n \quad (17)$$

$$8 > 1 - 3n$$

$$16 - 1 > 1 - 3n$$

$$1 + 8 > 1 + 1 - 3n$$

$$16 - 1 > 1 + 16 - 1 - 3n$$

$$9 > -3n$$

$$15 > n$$

$$n < 3$$

$$n > -3$$

$$\{n \mid n > -3 \text{ أو } n < 3\}$$



١٨) **أفاعٍ**: تعيش معظم الأفاعي في المناطق التي تتراوح درجة الحرارة فيها من 24° سيليزية إلى 33° سيليزية. اكتب متباينة تمثل درجات حرارة المناطق التي لا تعيش فيها الأفاعي.

تبين المسألة درجة الحرارة التي تعيش فيها الأفاعي والمطلوب درجة الحرارة التي لا تعيش فيها الأفاعي.


$$س < 24 \text{ أو } س > 33$$

١٩) **سلاحف**: نادراً ما تفتقس بيوض السلاحف البحرية في درجة حرارة أقل من 23° أو فوق 33° سيليزية. اكتب متباينة تمثل درجات الحرارة التي يجب أن تحضن فيها البيوض كي تفتقس.

درجات الحرارة التي تحضن فيها البيوض كي تفتقس هي:

$$23^{\circ} \leq ت \leq 33^{\circ}$$

٢٠) **هندسة**: تنص متباينة المثلث على أن مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث.



أ) اكتب ثلاثة متباينات تعبّر عن العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث المجاور، وحلها.

$$س + 9 > 4 \quad \text{و} \quad 9 + 4 > س$$
$$س < 13 \quad س < 5 \quad س < -5$$

ب) أعطِ أربعة أطوال ممكنة للضلع الثالث في هذا المثلث.

الأطوال الممكنة: ١١، ١٠، ٩، ٦

ج) اكتب متباينة مركبة تمثل قيم س الممكنة.

المتباينة: ٥ < س < ١٣

٢١ تمثيلات متعددة: سوف تكتشف في هذه المسألة: الخطأ المطلق للقياس الذي يساوي نصف وحدة القياس، والخطأ النسبي وهو نسبة الخطأ المطلق إلى القياس نفسه.

أ) جدولياً، انقل الجدول الآتي وأكمله:

الخطأ النسبي	الخطأ المطلق	القياس
$\frac{0,05}{14,3} \approx 0,0035$ أو 4%	$0,05 = \frac{1}{2} \times 0,05$ سم	سم ١٤,٣
		سم ١,٨٥
		سم ٦١,٢
		سم ٢٣٧

الخطأ النسبي	الخطأ المطلق	القياس
$\frac{0,05}{14,3} \approx 0,0035$ أو 4%	$0,05 = \frac{1}{2} \times 0,05$ سم	سم ١٤,٣
$\frac{0,05}{1,85} \approx 0,0027$ أو 3%	$0,05 = \frac{1}{2} \times 0,05$ سم	سم ١,٨٥
$\frac{0,05}{61,2} \approx 0,00082$ أو $0,8\%$	$0,05 = \frac{1}{2} \times 0,05$ سم	سم ٦١,٢
$\frac{0,05}{237} \approx 0,00021$ أو $0,2\%$	$0,05 = \frac{1}{2} \times 0,05$ سم	سم ٢٣٧

ب) تحليلياً، إذا كان طول قطعة مستقيمة $12,8$ سم، فاحسب الخطأ المطلق، ثم اكتب مدى الأطوال الممكنة.

$$\text{الخطأ المطلق: } \frac{1}{2} (0,1) = 0,05 \text{ سم}$$

مدى الأطوال الممكنة:

$$0,05 + 12,8 \geq m \geq 0,05 - 12,8$$

$$12,85 \geq m \geq 12,75$$

ج) منطقياً، إلى أي حد تقيس دقة الطول بالستراتات لكي يكون الخطأ المطلق أقل من $0,05$ سم؟

يُقاس لأقرب جزء من مئة.

عرف متغيراً في كل من الأسئلة (٢٢ - ٢٤)، واكتب المتباعدة، ثم حلها، وتحقق من صحة الحل:
 (٢٢) عدد ناقص ثمانية لا يزيد على ١٤ ولا يقل عن ٥.

افرض أن العدد المتغير هو n .

$$5 \leq n - 8$$

$$n - 8 \geq 5$$

$$n \geq 13$$

$$\{n | 13 \leq n \leq 22\}$$

التحقق: افترض العدد $n = 14$ وقم بالتعويض عنه في المتباعدة الأصلية.

$$14 \geq 8 - 14$$

$5 \leq 14$ العبارة صحيحة.

(٢٣) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين -٨ و ١٠.

$$10 > 8 - 3n + 4$$

$$8 - 3n + 4 > 10$$

$$12 - 3n > 8$$

$$n < 2$$

$$\{n | -4 < n < 2\}$$

التحقق: افترض العدد $n = 0$ وقم بالتعويض عنه في المتباعدة الأصلية.

$$10 > 8 - 3 \times 0 + 4$$

$10 > 8 - 4$ العبارة صحيحة.

٢٤) ناتج ضرب عدد في -٥ يزيد على ٣٥ أو يقل عن ١٠.

-٥ < ٣٥ أو -٥ > ١٠

ن < -٧ ن > ٧

{ن | ن < -٧ أو ن > -٦}.

٢٥) أعاصر، تصنف قوة الأعاصير في ٥ فئات بـالسرعة رياحها.


أ) اكتب متساوية مركبة تعبر عن سرعة الرياح في إعصار من الفئة ٣، ثم في إعصار من الفئة ٤.

الفئة	سرعة الرياح ميل / ساعة
١	٩٥-٧٤
٢	١١٠-٩٦
٣	١٣٠-١١١
٤	١٥٥-١٣١
٥	< ١٥٥

الفئة الثالثة: $111 \geq s \geq 130$

الفئة الرابعة: $131 \geq s \geq 155$

ب) ما تقاطع التمثيلين البيانيين للمتباينتين اللتين كتبتهما في الفرع أ؟



$$\text{التقاطع} = \emptyset$$

مسائل مهارات التفكير العليا:

٢٦) اكتشف الخطأ: حل كل من سعد ومسفر المتباينة $2 < s - 5 < 7$. فأيهما إجابته صحيحة؟
وضح تبريرك.

فاللظرف

$$\begin{aligned} &7 > s - 5 > 3 \\ &12 > s > 3 \\ &\frac{3}{2} < s < 6 \end{aligned}$$

للعدد

$$\begin{aligned} &7 > s - 5 > 3 \\ &7 > s > 8 \\ &\frac{2}{4} < s < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

كلاهما خطأ، لأن كلاهما أضاف ٥ إلى طرف واحد من المتباينة.

٢٧) اكتب متباينة مركبة يكون تمثيلها البياني المجموعة الخالية، ومتباينة أخرى يكون تمثيلها البياني مجموعة جميع الأعداد الحقيقية.

المجموعة الخالية: $s \geq 4$ و $s \leq 1$

جميع الأعداد الحقيقية: $s \geq 5$ أو $s \leq 1$

مسألة مفتوحة:

(٢٨)

أعطِ مثلاً لمتباينة مركبة تحتوي (أو) وحلولها كثيرة وغير منتهية.

$$س \geq 2 \text{ أو } س \leq 4$$



(٢٩)

اكتب: أعطِ مثلاً من واقع الحياة يمكن تمثيله بممتباينة مركبة، ثم حلها.

تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان الحي بين ٣٦ و ٣٩ درجة سيليزية.

$$39 \geq س \geq 36$$

تدريب على اختبار

٣٠) ما مجموع حل المثلثة: $-7 > s + 2 > 4$

ج) $\{s | -9 < s < 2\}$


أ) $\{s | -5 < s < 6\}$

د) $\{s | -9 < s < 6\}$

ب) $\{s | -5 < s < 2\}$

الإجابة: ج) $\{s | -9 < s < 2\}$.

٣١) هندسة، ما مساحة سطح المنشور الرباعي المجاور؟



ج) ٣١٣,٦ سم^٢

أ) ٢٤٩,٦ سم^٢

د) ٣٧١,٢ سم^٢

ب) ٢٧٨,٤ سم^٢

الإجابة: ج) ٣١٣,٦ سم^٢

مراجعة تراكمية

(٣٢) ينافي عامل في مصنع أجرًا شهريًّا مقداره ٣٠٠٠ ريال بالإضافة إلى ٢٠ ريالًا عن كل ساعة عمل إضافية، فإذا أراد الحصول في هذا الشهر على ٣٤٣٠ ريالًا على الأقل، فما عدد الساعات الإضافية التي يجب أن يعملها؟ (الدرس ٤-٣)

افتراض أن كل ساعة عمل إضافية ص

$$٣٤٣٠ \leq ٣٠٠٠ + ص$$

$$٤٣٠ \leq ص$$

$$٢١,٥ \leq ص$$

عدد الساعات الإضافية التي يجب أن يعملها على الأقل ٢٢ ساعة.

(٣٣) اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (١، ٢) وميله $\frac{3}{2}$. (الدرس ٤-٣)

$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

$$ص - ٢ = \frac{3}{2} (س - ١).$$

٣٤) أوجد ميل المستقيم المار بال نقطتين $(1, 6)$ ، $(6, 1)$. (الدرس ٥.٢)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{6 - 1}{1 - 6}$$

الاستعداد للدرس اللاحق

حل كل معادلة فيما يأتي:

$$6 - = 2 - 4b \quad (35)$$

$$2 + 6 - = 2 + 2 - 4b \quad (35)$$

$$4 - = 4b \quad (35)$$

$$1 - = b \quad (35)$$

$$3 + s^5 = 18 \quad (36)$$

$$3 - 3 + s^5 = 3 - 18$$

$$s^5 = 15$$

$$s = 3$$

$$\frac{f}{v} + 1 = 9 \quad (37)$$

$$m + v = 63$$

$$m + v - v = v - 63$$

$$m = 56$$

$$11 = 8 - s, 5 \quad (38)$$

$$8 + 11 = 8 + 8 - s, 5$$

$$19 = s, 5$$

$$s = 12, 7$$

$$17 - \frac{e + b}{2 -} \quad (39)$$

$$34 = e + b$$

$$e - 34 = e - e + b$$

$$30 = b$$

$$2^+ = \frac{3^-}{\wedge} \quad (\text{ex.})$$

$$160 = 3^-$$

$$3 + 160 = 3 + 3^-$$

$$n = 163$$

٤-٥

حل الم tapiات التي تتضمن القيمة المطلقة



$$n - 2 \geq |n - 8|$$

أعد كتابة إن $- 2 \geq |n - 8|$ لكل من الحالتين ١، ٢.
الحالة ١: إن $- 8$ غير سالبة.

$$-n + 2 \geq n - 8$$

$$2 \geq n - 8$$

$$-n + 2 \geq 8 - n$$


$$8 + 2 \geq 8 + n$$

$$-n \geq n$$

$$10 \geq n$$

$$n \leq 10$$

$$\{n | n \geq 10\}.$$



$$1) \quad 5 - |x| > 3$$

مجموعة الحل: \emptyset ; لأن $|x| - 5 > 3$ لا يمكن أن تكون سالبة.

٢) كيمياء: درجة انصهار الجليد هي 0°سيليزيه . لكن خالدًا لاحظ في أثناء إجراء تجربة أن درجة انصهار الجليد تتغير ضمن 1°سيليزيه . اكتب مدى درجات الحرارة التي لاحظها خالد.

افتراض أن درجات الحرارة s .

$$s - 1 \geq 0$$

$$s \geq 1 - s$$

مدى درجات الحرارة التي لاحظها خالد هي: $\{s \mid 1 \leq s \leq 1\}$.

٣) حل كلاً من المتباينات التالية، ومثل مجموعه الحل بيانياً.

$$|x - 6| \leq 5$$

$$-r \leq x + 6$$

$$x - 6 \leq r$$

$$-r \leq x - 11$$

$$r \leq 1$$

$$x \geq 11 - r$$

$$x \leq 1$$

$\{x | x \text{ عدد حقيقي}\}$.



$$|x - 1| \leq 2$$

$$-2 \leq x - 1$$

$$x \leq 1 + 2$$


$$-2 \leq x - 1$$

$$x \leq 3$$

$$x \geq -1$$

$$x \geq 3$$

$\{x | -1 \leq x \leq 3\}$





المثالان ١ ، ٣

حل كلاً من المتباينات الآتية، ومثل مجموعه حلها بيانياً:

$$1) \quad 7 > |y + 3|$$

$$-y - 3 > 7$$


$$y + 3 > 7$$

$$-y > 10$$

$$y < 4$$


$$y < -10$$

$$\{y \mid y < -10 \text{ or } y > 4\}.$$



$$x - \geq |4 + x| \quad (2)$$

مجموعة الحل \emptyset



$$x - < |x + 4| \quad (3)$$

$$x - < x + 4$$


$$x - < x + 4$$

$$0 < 4$$

$$4 < 4$$

$$0 > 0$$

{ ج | ج عدد حقيقي }.




$$A \leq |x - b| \quad (4)$$

$$A \leq x + b -$$

$$x \leq b -$$

$$x \geq b$$

. \{x \leq a \text{ أو } x \geq b\}




$$3 \leq |n + 5| \quad (5)$$

$$3 \leq n + 5 -$$

$$n \leq 5 -$$

$$n \geq -5$$

. \{n \mid n \leq -5 \text{ أو } n \geq 3\}



$$6) |k - 5| > 3$$

$$|k - 5| > 3$$


$$k - 5 > 3$$

$$k > 2 -$$

$$k > 8$$

$$k > 2$$

$$\{k | k > 2\}.$$



مثال ٢

٧) أسهم: بلغ سعر سهم إحدى الشركات ٧٠,٨٥ ريالاً. وقد تذبذب هذا السعر ضمن ٧٥,٠٠ ريال في اليوم. أوجد مدى سعر التداول لهذا السهم.

افتراض سعر التداول k .

$$|k - 70,85| \geq 75$$

$$|k - 70,85| \geq 70,85 + 75$$

$$|k - 70,85| \geq 70,85 - 75$$

$$k - 70,85 \leq 75$$

$$k \geq 71,60$$

$$k \leq 70,10$$

$$\{k | k \geq 71,60 \text{ و } k \leq 70,10\}$$

تدريب وحل المسائل:



المثالان ٣، ٤

حل كلاً من المتباينات الآتية، ومثل مجموعه حلها بيانياً:

$$x \geq |1 - 2| \quad (8)$$

$$x \geq 1 + 2 -$$

$$x \geq 1 - 2$$


$$x \geq 2 -$$

$$x \geq 2$$

$$3 - \leq x$$


$$x \geq 3$$

$$\{x \geq 3 - |x| \}$$



$$x - 5 > 0 \quad (9)$$

مجموعة الحل: \emptyset



$$x < |2 + 4| \quad (10)$$

$$x < 2 - r$$


$$x < 2 + r$$

$$x < -r$$

$$x < 4$$

$$x > r$$

لذلك $x < -r$ أو $x < 4$.



$$|z - \xi| < \delta \quad (11)$$

$$|z - \xi| < \delta -$$

$$|z - \eta| < \delta -$$

$$|\eta| > \delta$$

$$|z - \xi| < \delta$$

$$|\eta| < \delta$$

$$\{|\eta| < \delta \text{ or } |\eta| > \delta\}$$



$$|z - \omega| \leq \delta \quad (12)$$

$$|z - \omega| \leq \delta -$$

$$|z - \omega| \leq \delta$$


$$|\omega| \leq \delta -$$

$$|\omega| \leq \delta$$

$$|z - \omega| \geq \delta$$

$$|\omega| \leq \delta$$

$$\{|\omega| \leq \delta \text{ or } |z - \omega| \geq \delta\}$$



$$9 - < | 3 + 5 | \quad (13)$$

$$9 - < 3 - 5 -$$

$$6 - < 5 -$$


$$1, 2 > L$$

$$9 - < 3 + 5$$

$$12 - < 5$$

$$2, 4 > L$$

$\{L | L$ عدد حقيقي}.



$$4 - < | 3 - 2 - s | \quad (14)$$

$$2s + 3 < 4 -$$

$$7 - s < 2$$


$$s > -3, 5$$

$$4 - < 3 - 2 - s$$

$$-s < 1 - 2$$

$$s > 0, 5$$

$\{s | s$ عدد حقيقي}.



$$16 > |8 + n| \quad (15)$$


$$16 > 8 - n$$

$$n + 6 > 1$$

$$-n > 4 -$$

$$n > -5$$

$$\{n \mid -4 < n < 8\}.$$



$$2 \geq |r + 1| \quad (16)$$


$$2 \geq 1 - r -$$

$$2 \geq 1 + r$$

$$r - 3 \leq$$

$$r \geq 1$$

$$\{r \mid 1 \leq r \leq 3\}$$



مثال ٢

١٧) غوص: يجب أن يبقى ضغط أسطوانة الغوص ١١٣٦ كجم لكل بوصة مربعة، بزيادة أو نقصان لا يتجاوز ٢٢٧ كجم. اكتب مدى الضغط المثالي لأسطوانة الغوص.

$$|s - 1136| \leq 227$$

$$-227 \leq s - 1136 \leq 227$$

$$909 \leq s \leq 1363$$

$$\{s \mid 909 \leq s \leq 1363\}.$$

حل كلاً من المتباينات الآتية، ومثل مجموعه حلها بيانياً:

$$18 \leq |3 + 4n| \quad (18)$$

$$18 \leq 3 - 4n$$

$$18 \leq 3 + 4n$$


$$21 \leq -4n$$

$$15 \leq 4n$$

$$5, 25 \geq n$$

$$3, 75 \leq n$$

$$\{n \mid n \geq -5, 25 \text{ أو } n \leq 3, 75\}.$$



$$x > \left| \frac{1 + 5x}{2} \right| \quad (19)$$

$$16 > 1 - 5x -$$

$$16 > 1 + 5x$$


$$17 > 5x -$$

$$15 > 5x$$

$$5, 7 - < 5$$

$$5 > 5$$

$$\{x > -5 > 5 \frac{2}{3} - \mid 5\}$$



$$9 \leq \left| \frac{8 - b}{\xi} \right| \quad (20)$$

$$36 \leq 8 + b -$$

$$28 \leq b -$$


$$14 - \geq b$$

$$36 \leq 8 - b$$


$$44 \leq b$$

$$22 \leq b$$

$$\{22 \leq 14 - \geq b | b\}$$



$$0 - \geq \left| \frac{3 + 7}{2} \right| \quad (21)$$



الحل: \emptyset

$$\forall - < \left| \frac{3+2}{2} \right| \quad (22)$$

$$14 - < 3 - 2 -$$

$$11 - < 2 -$$


$$5,5 > 2 -$$

$$14 - < 3 + 2$$

$$17 - < 2$$

$$8,5 < 2$$

$\{q | q \text{ عدد حقيقي}\}.$



$$3 > \left| 1,5 + h - \right| \quad (23)$$

$$3 > 1,5 - h$$


$$3 > 1,5 + h -$$

$$4,5 > h$$

$$1,5 > h -$$

$$1,5 < h$$

$\{4,5 > h > 1,5 - | h\}$



$$|t - 5| \geq 1 \quad (24)$$


$$|t + 5| \geq 1$$

$$|t - 5| \geq 1$$

$$|t - 1| \leq 1$$

$$|t - 1| \geq 1$$

$$\{ |t - 1| \geq 1 \mid t \}$$



$$|3t - 7| < 5 \quad (25)$$

$$|3t + 7| < 5$$

$$|3t - 7| < 5$$


$$-2 < 3t < 12$$

$$-12 < 3t < 2$$

$$-4 < t < 1$$

$$1 < t < 4$$

$$\left\{ t \mid -4 < t < 1 \right\}$$



٢٦) ادخار: يدخر سعد في العادة ٥٠٠ ريال شهرياً، بزيادة أو نقصان لا يتجاوز ٦٠ ريالاً.

أ) اكتب مدى المبلغ الذي يدخره سعد شهرياً.

$$60 \geq m + 500$$

$$60 \geq m - 500$$


$$m \leq 440$$

$$m \geq 560$$

$$m \leq 440$$

المدى $\{m : 440 \leq m \leq 560\}$.

ب) مثل هذا المدى بيانياً.




٢٧) **كيمياء:** يوجد الماء في حالات ثلاثة: صلبة وسائلة وغازية. وينجمد عند درجة 0° سيليزية، وينبخر عند درجة 100° سيليزية. اكتب مدى درجات الحرارة التي لا يكون فيها الماء سائلاً.


مدى درجات الحرارة التي لا يكون فيها الماء سائلاً:

$$\{d \mid d > 0 \text{ أو } d < 100\}.$$


اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة لكل من التمثيلات البيانية الآتية:



$$|s| > 2$$



$$2 \leq |x + 1|$$



$$4,5 < |5,5 - x|$$

٣١) **حيوانات:** تبلغ درجة الحرارة الطبيعية لجسم الشاة السليمة 39° سيلزيه، وقد تزيد أو تقل عن ذلك بمقدار 1° سيلزيه. فما مدى درجة حرارة جسم الشاة السليمة؟

$$|d - 39| \geq 1$$

$$1 \geq 39 + d -$$

$$d \geq 39 - 1$$

$$38 \geq d -$$

$$d \geq 39 + 1$$

$$38 \leq d$$

$$d \geq 40$$

$$\{d | 38 \leq d \leq 40\}.$$

عبر عن كل من العبارتين الآتتين باستعمال متباينة تتضمن قيمة مطلقة:

٣٢) تبلغ درجة الحرارة المثلثي داخل الثلاجة 38° ف بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $1,5^{\circ}$.

$$|s - 38| \leq 1,5$$

٣٣) يحفظ مثبت السرعة سرعة السيارة عند ٨٨ كيلومترًا / ساعة بزيادة أو نقصان مقداره ٥ كيلومترات / ساعة.

$$| s - 88 | \leq 5$$

٣٤) يجب أن تبقى درجة حموضة بركة السباحة ٥,٧ بزيادة أو نقصان لا يتجاوز ٠,٣ ، اكتب مدى درجة الحموضة المثالية للبركة.

$$| h - 5,7 | \leq 0,3$$


٣٥)  **تمثيلات متعددة:** سوف تكتشف في هذه المسألة التمثيل البياني لمتباينات القيمة المطلقة في المستوى الإحداني.

أ) جدولياً، انقل الجدول الآتي وأكمله، وعرض في المتباينة قيمة s وقيمة $d(s)$ لكل نقطة، ثم بين هل العبارة الناتجة صحيحة أم خاطئة:


النقطة	$d(s) \leq s - 1 $	$d(s) \geq s - 1 $	صحيحة / خاطئة	صحيحة / خاطئة
(٢,-٤)				
(٢,-٢)				
(٢,٠)				
(٢,٢)				
(٢,٤)				

النقطة	$d(s) \leq s - 1 $	$d(s) \geq s - 1 $	صحيحة/خطأ	صحيحة/خطأ	النقطة
(٢,-٤)	$5 \leq 2$	$5 \geq 2$	خطأ	صحيحة	$ s - 1 \leq d(s)$
(٢,-٢)	$3 \leq 2$	$3 \geq 2$	خطأ	صحيحة	$ s - 1 \geq d(s)$
(٢,٠)	$1 \leq 2$	$1 \geq 2$	صحيحة	خطأ	$ s - 1 \leq d(s)$
(٢,٢)	$1 \leq 2$	$1 \geq 2$	صحيحة	خطأ	$ s - 1 \geq d(s)$
(٢,٤)	$3 \leq 2$	$3 \geq 2$	خطأ	صحيحة	$ s - 1 \leq d(s)$

ب) بيانياً، مثل الدالة $d(s) = |s - 1|$ بيانياً.




ج) بيانياً، عين في المستوى الإحداثي جميع النقاط التي تجعل $d(s) \leq |s - 1|$ عبارة صحيحة بلون أحمر، وعين جميع النقاط التي تجعل $d(s) \geq |s - 1|$ صحيحة باللون الأزرق.




د) منطقياً، كون تخيمنا حول شكل التمثيل البياني للمتباينتين $d(s) \leq |s - 1|$ ، $d(s) \geq |s - 1|$ ، وأضف إلى الجدول نقاطاً جديدة للتحقق من صحة تخمينك.

$$d(s) \leq |s - 1|$$




$$d(s) \geq |s - 1|$$




هـ) بيانياً، استعمل ما اكتشفه في هذه المسألة لتمثيل المتباينة $d(s) \leq |s - 3|$.

$$d(s) \leq |s - 3|$$



مسائل مهارات التفكير العليا:



٣٦) اكتشف الخطأ: مثل أحمد حل المتباعدة $|3 - 2| > 1$.

كما في الشكل المجاور. فهل كان على صواب؟ فسر إجابتك.

لا، لأن أحمد نسي تغيير اتجاه إشارة المتباعدة في الحالة السالبة للقيمة المطلقة.

٣٧) برهن: هل يمكن التمثيل البياني لمتباعدة القيمة المطلقة من اتحاد تمثيلين أحياناً أم دائماً، أم أنه لا يمكن كذلك أبداً؟ اشرح إجابتك.

أحياناً، قد يكون التمثيل تقاطع تمثيلين، أو مجموعة خالية أو جميع الأعداد الحقيقة.

٣٨) تحد: ين لم اذا لا يكون حل المتباعدة $|t| > \text{صفر}$ مجموعه الأعداد الحقيقية جميعها.

إذا كان $s = 0$ ، فإن القيمة المطلقة $= 0$ ، وليس أكبر من صفر.

٣٩) مسالة مفتوحة: اكتب متباعدة قيمة مطلقة تمثل موقفاً من واقع الحياة، وحلها، ثم فسر الحل.

حرارة الإنسان السليم بين ٩٧,٢ و ١٠٠ درجة فهرنهايتية.

٤) اكتب: أشرح كيف تحدد ما إذا كانت متباعدة القيمة المطلقة تحول إلى متباعدة مركبة تحتوي (و)، أو متباعدة مركبة تحتوي (أو).

إذا كانت القيمة المطلقة إلى يمين رمز المتباينة < أو \geq فتستعمل (و) في الجمل المركبة، أما إذا كان رمز المتباينة < أو \leq فتستعمل (أو) في الجمل المركبة، فإذا كانت | س | < ن فالحل هو س < ن و س > -ن وإذا كانت س | < ن فالحل هو س < ن أو س > -ن.

تدريب على اختبار

٤١) إجابة قصيرة : سحبت بطاقة عشوائياً من كيس يحتوي ٩ بطاقات مرقمة بأرقام مختلفة من ١ - ٩ . ما احتمال أن يكون الرقم المنسحوب فردياً؟

$$\text{الاحتمال} = \frac{5}{9}$$

٤٢) مجموعة حل المعادلة $|2n - 3| = 5$ هي :

ج) $\{1, 1\}$

أ) $\{-1, 4\}$

د) $\{4, 4\}$

ب) $\{-1, 4\}$

الإجابة: ب) $\{-1, 4\}$.

مراجعة تراكيمية


(٤٣) حل المُتباينة: $6 \geq 2t - 4$ ، ثم مثّل مجموعه حلها بيانياً. (الدرس ٤-٤)

$$8 \geq 4 - 2t \quad 6 \geq 2t - 4$$

$$12 \geq 2t \quad 12 \geq 2t$$

$$t \leq 6 \quad t \leq 5$$

$$\{t \mid t \leq 5\}$$



(٤٤) حدد ما إذا كان المستقيمان $s + t = 2$ ، $s + t = 3$ متعامدين أم لا، وفسر إجابتك. (الدرس ٤-٢)

المستقيمان غير متعامدان؛ لأن حاصل ضرب ميلهما لا يساوي -1 .

٤٥) هندسة، يزيد قياس إحدى زوايا مثلث 10° عن قياس الزاوية الثانية، وقياس الزاوية الثالثة يساوي مثلثي مجموع قياسي الزاويتين الأولى والثانية. أوجد قياس كل من زوايا المثلث. (الدرس ٣٠)

افتراض الزاوية الأولى s ،

والزاوية الثانية $s + 10^\circ$

والزاوية الثالثة $2(s + s + 10^\circ)$

$$2(s + s + 10^\circ) = 2(2s + 10^\circ) = 4s + 20^\circ$$

بما أن مجموع زوايا المثلث $= 180^\circ$

$$s + s + 10^\circ + 4s + 20^\circ = 180^\circ$$

$$6s + 30^\circ = 180^\circ$$

$$6s = 150^\circ$$

$$s = 25^\circ$$

إذاً الزاوية الأولى $= 25^\circ$

الزاوية الثانية $= 10^\circ + 25^\circ = 35^\circ$

الزاوية الثالثة $= (4 \times 25^\circ) + 20^\circ = 120^\circ$

٤٦) حل المعادلة: $\frac{ت}{٥} = ٢٠$ ، ثم تحقق من صحة الحل: (الدرس ٢٠)

$$20 = \frac{ت}{5}$$


$$20 \times 5 = \frac{ت}{5} \times 5$$

$$100 = ت$$


الاستعداد للدرس اللاحق

مثل كل معاذه مما يأتي بيانياً:

$$ص = ٤٧$$



$$3 = \text{مس} (4\lambda)$$



$$x^3 + 2 = 0$$

المقطع السيني عند $x = 0$:

$$0 = x^3 + 2$$

$$x = \frac{3}{2}$$


$$(0, \frac{3}{2})$$

المقطع الصادي عند $x = 0$:

$$x = 0 + (0)^3$$

$$x = 0$$

$$(0, 0)$$



$$4 = 2s + c$$

المقطع السيني عند $s = 0$

$$4 = 0 + c$$

$$c = 4$$


$$(0, 4)$$

المقطع الصادي عند $s = 0$

$$c = 4 - (0)^2$$

$$c = 4$$

$$(4, 0)$$



اختبار الفصل

حل كلاً من الممتحنين الآتيين، ومثل مجموعة حلها على خط الأعداد:

$$1) \text{ } s - 4 > 9$$

$$s - 9 > 4 - 9$$


$$s > 5$$



$$2) b - 3 \leq b - 5$$

$$b - 5 \leq b - 3$$

$$3 - \leq b$$



(٣) اختيار من متعدد: لدى سعد ٣١ كتاباً ولدى خالد ٥٨ كتاباً. فكم كتاباً يجب أن يضيف سعد إلى مجموعته ليصبح لديه عدد من الكتب أكبر مما لدى خالد؟

أ) ٢١ على الأقل

ب) ٢٧

ج) ٢٨ على الأقل

د) أكثر من ٣٠

الإجابة: ج) ٢٨ على الأقل.

حل كلاً من المطالبات الآتية، وتحقق من صحة حلها:

$$3 < \frac{1}{5} \quad (4)$$

ضرب طرفي المطالبة في 5 $3 < \frac{1}{5}$

$$3 \times 5 < \frac{1}{5} \times 5$$

$$15 < 1$$

للتحقق: $4 = 20 \times \frac{1}{5}$ أي أكبر من 3.

$$42 - 7 \geq 0 \quad (5)$$

اقسم طرفي المطالبة على 7 $42 - 7 \geq 0$

$$6 - 7 \geq 0$$

للتحقق: $6 - 7 = -1$

$$36 - m > 6$$

$$36 - m >$$

$$m < 4$$

للحقيق: $-36 = 5 \times 9 - 45$ أي أصغر من

$$9 - \geq 3 + \frac{5}{4} (7)$$

$$9 - \geq 3 + \frac{5}{4}$$

اطرح 12 من كلا الطرفين

$$36 - \geq 12 + 12$$

$$36 - \geq 24$$

$$24 \geq 48 - q$$

للحقيق: $(4 \div 50) + 9,5 = 3$ أي أصغر من

$$13 - 2(s - 4) < 5s - 8$$

$$13 - 2(s - 4) < 5s - 13$$

خاصية التوزيع

$$13 - 2s + 8 < 5s - 13$$

$$13 - 2s - 5s + 8 < 5s - 5s - 13 \quad \text{اطرح } 5s \text{ من طرفي المتباينة}$$

اطرح 8 من طرفي المتباينة

$$13 - 8 < 8 - 2s \quad 8 - 8 < 8 - 2s$$

$$21 < -2s$$

$$s > 3$$

$$13 - 2 \times 5 < 2 - 2(s - 4)$$

٤ < -٣ العبرة صحيحة.

٩) **مدينة الألعاب:** زار أحمد مدينة الألعاب خلال عيد الأضحى المبارك. وقرر أن يصرف مبلغًا لا يزيد على ٤٠ ريالًا. إذا كانت أجرة اللعبة الواحدة تكلف ٧ ريالات، فاكتتب متباينة تمثل هذا الموقف.


افرض أن اللعبة س وتكلفه ركوبها ٧ ريال.

$$7s \leq 40$$

حل كلاً من الممتاليتين المركبتين الآتتين، ومثل مجموعه حلها بيانياً:

$$19 < 5 - 3 \text{ أو } 5 + 10 > x$$

$$x < 5 \text{ أو } x > 14$$



$$13 \geq 5 - 5x \geq 11 - (1)$$

$$13 \geq 5 - 5x$$

$$5 - 5x \geq 11 -$$

$$5 + 13 \geq 5x$$

$$5x \leq 5 + 11 -$$

$$18 \geq 5x$$

$$5x \leq 6 -$$

$$9 \geq 5$$

$$5 \geq 3 -$$



عرف المتغير في كل مما يأتى، واتب المتباعدة، ثم حلها، وتحقق من صحة الحل:

١٢) عدد ناقص ٤ لا يزيد على ٨.

افتراض العدد س

$$س - 4 \geq 8$$

$$س \geq 12$$

للحقيق: $12 - 4 = 8$

١٣) تسعة أمثال عدد ناقص أربعة يساوى ثلاثة وعشرين على الأقل.

افتراض العدد س


$$9s - 4 \leq 23$$

$$9s \leq 27$$

$$s \leq 3$$

للحقيق: $9 \times 3 - 4 = 23$

١٤) اخْتِيَارُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ: أي المُتَبَاينَاتُ الْمُرْكَبَةُ الْأَتِيَّةُ حُلُّهَا مُمَثَّلٌ عَلَى خَطِ الأَعْدَادِ أَدْنَاهُ؟



ج) $s > -2$ أو $s \leq 3$ أ) $-2 \geq s > 3$


ب) $s \geq -2$ أو $s \leq 3$ د) $-2 > s \geq 3$

الإجابة: ب) $s \geq -2$ أو $s \leq 3$

حل كلاً من المتباينات الآتية، ومثل مجموعه حلها بيانياً:


$$3 > |5 - b| \quad (15)$$

$$\begin{array}{ll} 3 > 5 + b - & b - 3 > 5 - 5 + b - \\ 5 - 3 > 5 - 5 + b - & 3 + 5 > 5 + 5 - \\ b < 2 & b > 8 \\ .\{b > 2 \mid b < 8\} \end{array}$$



$$21 \leq |7 + f| \quad (16)$$

$$\begin{array}{ll} 21 \leq 7 - f & 21 \leq 7 + f \\ 28 \leq f & 14 \leq f \\ 14 \geq f & 7 \leq f \\ .\{f \leq 7 \text{ أو } f \geq 14\} \end{array}$$



$$15 \geq |3 + m| \quad (17)$$

$$15 \geq 3 - m$$

$$18 \geq m$$


$$4,5 \geq m$$

$$15 \geq 3 + m$$

$$12 \geq m$$

$$3 - \leq m$$

$$\{4,5 \geq m \geq 3 - \mid m\}$$



$$5 < \left| \frac{3 - s}{4} \right| \quad (18)$$

$$5 < \frac{3 + s -}{4}$$

$$20 < 3 + s -$$


$$17 < s -$$

$$s > 17$$

$$5 < \frac{3 - s}{4}$$

$$20 < 3 - s$$

$$s < 23$$



١٩) **بيع بالتجزئة:** عرض أحد المتاجر خصمًا قدره ١٥ ريالاً على أي زوج من الأحذية.

أ) إذا كان أعلى ثمن لزوج من الأحذية ١٤٩,٩٥ ريالاً، وأقل ثمن ٨٤,٩٥ ريالاً. فما مدى أثران الأحذية بعد الخصم؟

$$149,95 \geq S - 15 \geq 84,95$$

$$134,95 \geq S \geq 69,95$$

ب) إذا خير شخص عند شراء زوج من الأحذية ثمنه ١٠٩,٩٥ ريالات بين أن يحصل على خصم مقداره ١٥ ريالاً أو خصم بنسبة ١٥٪، فـأي العرضين أفضل له؟

العرض الأفضل هو الخصم ١٥٪.

لأنه عند خصم ١٥ ريال يكون سعره ٩٤,٩٥ ريال،

أما عند خصم ١٥٪ يكون سعره ٩٣,٤٦ ريال.

اختبار تراكمي

القسم ١: اختبار من متعدد



١) مع يزيد ١٠٠ ريال دفع منها ٣٨ ريالاً ثمناً لوجبة الغداء، واشترى عدداً من الهدايا لأصدقائه، عبر عن المتباينة التي تمثل عدد الهدايا التي اشتراها يزيد، إذا كان ثمن الهدية الواحدة ١٢ ريالاً.

a) $n \geq 6$

c) $n \leq 5$

b) $n > 5$

الإجابة: d) $n \geq 5$

٢) يتلقى موظف أجرًا عن كل ساعة عمل بحسب الجدول أدناه.

الشركة	الإيجار عن كل ساعة (ريال)
أول ٤ ساعة	١٢٨
بعد ٤ ساعة	١٩٢

إذا كان هدف الموظف جمع مبلغ ٦٠٠٠ ريال خلال الأسبوع القادم، فما أقل عدد من الساعات يمكن أن يعمله الموظف؟

- أ) ٤٣ ساعة ج) ٤ ساعه

- ب) ٤٥ ساعة**

الإجابة: ب) ٥ ساعـة

٣) اكتب معادلة المستقيم الذي ميله $-\frac{2}{3}$ ، ومقطعه الصادي يساوي ٦.

أ) $ص = ٦س + \frac{2}{3}$


ب) $ص = -\frac{2}{3}س + ٦$

ج) $ص = -\frac{2}{3}س - ٦$

د) $ص = \frac{2}{3}س - ٦$

الإجابة: ب)

٤) قرأت منها في اليوم الأول ١٤ صفحة من قصة، إذا كان مجموع ما قرأته منها في اليومين الأول والثاني على الأقل ٣٠ صفحة، فائي من التمثيلات التالية يعبر عما قرأته منها في اليوم الثاني؟




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

الإجابة: (أ)

٥) أي المستقيمات التالية ميلها غير معروف؟

ج) $2s + 3c = 1$

أ) $s = 5$

د) $2s + 3c = 4$

ب) $c = 5$

الإجابة: ب)

إجابة قصيرة

٦) حل المتباعدة: $23 \leq 3s + 8 < -4$

بإضافة -8 لأطراف المعادلة $23 \leq 3s + 8 - 8 < -4 - 8$

بقسمة أطراف المعادلة $\div 3$ $12 \leq 3s < -4$

$s \leq -\frac{4}{3}$

٧) جوال، يريد مسعود شراء جوال ثمنه 750 ريالاً على الأقل، إذا وفر مسعود 50 ريالاً كل أسبوع، فاكتبه المتباعدة التي تعبر عن عدد الأسابيع التي يحتاج إليها مسعود ليوفر ثمن الجوال، وحلها.

افتراض أن s عدد الأسابيع


$750 \leq 50s$

٨) حل المتباعدة: $|s - 4| > 2$

$$s - 4 > 2 \quad \text{أو} \quad s - 4 < -2$$
$$s > 6 \quad \text{أو} \quad s < 2$$

٩) مثل بيانيا حل المتباعدة $3s - 6 \geq 4s - 4 \geq 3s + 1$

$$3s - 6 \geq 4s - 4 \quad \text{و} \quad 4s - 4 \geq 3s + 1$$
$$3s - 4s \geq -4 + 6 \quad \text{و} \quad 4s - 3s \geq 1 + 4$$
$$-s \geq 2 \quad \text{و} \quad s \leq 5$$
$$s \geq -2 \quad \text{و} \quad s \leq 5$$



١٠) حدد ما إذا كانت الدالة التالية خطية أم لا، وفسر إجابتك.

العنوان	النوع
١٢,٥	٣
١٦	٤
١٩,٥	٥
٢٣	٦
٢٦,٥	٧

$$\text{معدل التغيير} = \frac{16 - 12,5}{4 - 3}$$

$$\text{معدل التغيير} = \frac{19,5 - 16}{5 - 4}$$

$$\text{معدل التغيير} = \frac{23 - 19,5}{6 - 5}$$

$$\text{معدل التغيير} = \frac{26,5 - 23}{7 - 6}$$

بما أن معدل التغيير ثابت فإن الدالة خطية

١١) **مدينة الألعاب:** دفعت هند ١٠ ريالات رسوم دخول مدينة الألعاب وَ ٥ ريالات لاستعمال كل لعبة مرة. اكتب معادلة خطية باستعمال الميل والمقطع الصادي تعبّر عن المبلغ الذي أنفقته هند في مدينة الألعاب.

افرض س المبلغ الذي انفقته هند، وص هي عدد الألعاب
 $S = 5s + 10$

١٢) يخطط مروان للذهاب لرحلة عمرة في إجازته على نفقته الخاصة. إذا كانت تكلفة رحلة العمرة ٦٤٠ ريالاً، وقرر مروان أن يوفر كل أسبوع ٣٥ ريالاً.

أ) فاكتب متباينة تعبّر عن الموقف لمعرفة عدد الأسابيع N التي يحتاج إليها مروان لتوفير المبلغ.

$$640 \leq 35s$$

ب) حل الممتباينة في الفقرة أ، وأوجد أقل عدد ممكن من الأسابيع يحتاج إليه مروان.

$$640 \leq 35$$

بقسمة طرفي المعادلة $\div 35$

$$s \leq 18$$

أقل عدد من الأسابيع هو ١٨ أسبوع

ج) إذا وفر مروان ٤٥ ريالاً كل أسبوع، فما أقل عدد من الأسابيع يحتاج إليه لتوفير المبلغ؟

$$640 \leq 45$$

$$s \leq 14$$

أقل عدد من الأسابيع هو ١٤ أسبوع