



تم تحميل ملف المادة من مكتبة طلابنا
زورونا على الموقع 

www.tlabna.net

مكتبه طلابنا تقدم لكم كل ما يحتاج المعلم والمعلمه والطلبه ، الطبعات الجديده للكتب والحلول ونماذج الاختبارات والتحاضير وشروحات ال دروس بصيغة الورد والبي دي اف وكذلك عروض البوربوينت.



tlabna



www.tlabna.net

التهيئة

أوجد قيمة $a^3 - 2ab + jc$ عند القيم المعطاة :

$$(1) \quad a = 2, b = 1, jc = 5$$

$$5 + (1)(2)^2 - (2)^3$$

$$5 + 4 - 8$$

$$5 + 4 - 8$$

$$5 + 8$$

$$(2) \quad a = 1, b = 0, jc = 1$$

$$1 + (0)(1)^2 - (1)^3$$

$$1 + 0 - 1$$

$$1$$

$$٩ = ج = ب، ٣ = ج - ب = ٥ \quad (٣)$$

$$٩ = (٣ - ج)(٥)٢ - ج(٥)٣$$

$$٩ = ٣٠ + ٢٥ \times ٣$$

$$٩ = ٣٠ + ٧٥$$

$$٩ = ١٠٥$$

$$٩٦$$

٤) استئجار سيارة: تمثل تكلفة استئجار سيارة بالمعادلة

$$ت = ٤٩س + ٣٠ص ، حيث يمثل س عدد الأيام ،$$

و ص عدد الكيلومترات. أوجد تكلفة استئجار السيارة

مدة ٥ أيام لقطع مسافة ٤٢٥ كيلومتر.

$$ت = ٤٩س + ٣٠ص$$

$$ت = (٤٩ + ٣٠)(٤٢٥)$$

$$١٢٧,٥ + ١٢٥ =$$

$$٣٧٢,٥ = \text{ريالاً}$$

حُلَّ كُلِّ مُعَادْلَةٍ فِيمَا يَأْتِي : (الدُّرُوسُ ١، ٢، ٣، ٤)

$$5 = 3 + s \quad (5)$$

$$s = 5 - 3$$

$$s = 2$$

$$6 = 4 - 2s \quad (6)$$

$$4 + 6 = 2s$$

$$10 = 2s$$

$$s = 5$$

$$3 + 2 = 2s - 2 \quad (7)$$

$$2 + 3 = 2s$$

$$s = 5$$

(٨) هندسة: إذا علمت أن قانون محيط المستطيل مع هو
 $مع = ٢L + ٢ض$: L = الطول، $ض$ = العرض، فأوجد
 قيمة ض بدلالة كل من L ، مع .

$$مع = ٢L + ٢ض$$

$$ض = مع - ٢L$$

$$ض = \frac{مع}{٢} - L$$

$$ض = \frac{مع}{٢} - L$$

اكتب الزوج المركب الذي يمثل كل نقطة فيما يأتي:

(٩) أ

$$أ = (٤, ٢)$$

(١٠) ب

$$ب = (٣, ٠)$$

ج (۱۱

$$(i - i) = \Delta$$

د (۱۲


$$(i - i) = \Delta$$

ه (۱۳

$$(v - v-) = \Delta$$

و (۱۴

$$(v, v-) = \Delta$$



١-٣

تمثيل المعادلات المكتوبة بصيغة الميل والمقطع بيانيًا

تحقق

اكتب معادلة المستقيم في كل مما يأتي بصيغة الميل والمقطع، ثم مثلها بيانيًا:

$$(\text{أ}) \text{ الميل} = -\frac{1}{2}, \text{ المقطع الصادي} = 3$$

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

عوض عن $m = -\frac{1}{2}$ ، وعن $b = 3$


$$ص = -\frac{1}{2}s + 3$$

بيانياً:

الخطوة ١: عين النقطة $(0, 3)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢: الميل = $-\frac{1}{2}$ ، تحرك من النقطة $(0, 3)$ بمقدار وحدة إلى الأسفل ووحدتين إلى اليمين وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣: ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.



١ ب) الميل = -٣، المقطع الصادي = -٨

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عرض عن م بـ -٣، وعن ب بـ (-٨)


$$ص = -٣ س - ٨$$

بيانياً:

الخطوة ١: عين النقطة (٠، -٨) التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢: الميل = -٣، تحرك من النقطة (٠، -٨) بمقدار ثلث وحدات إلى الأعلى ووحدة إلى اليسار وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣: ارسم خط مستقيم يمر بهماتين النقطتين.



تحقق

مثل كل معادلة فيما يأتي بيانياً:

$$12 = 3s - 4s$$

المعادلة الأصلية

$$3s - 4s = 12$$

اطرح $3s$ من طرفي المعادلة

$$-4s = 12 - 3s$$

اقسم طرفي المعادلة على -4

$$-4s = -3s + 12$$

صيغة الميل والمقطع

$$s = \frac{3}{4}s - 3$$


بيانياً:

الخطوة ١: عين النقطة $(0, -3)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢: الميل = $\frac{3}{4}$ ، تحرك من النقطة $(0, -3)$ بمقدار ثلث

وحدات إلى الأعلى و، وحدات إلى اليمين وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣: ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.



$$10 - 2s + 5c = 0$$

أضف $2s$ إلى طرفي المعادلة

$$-2s + 5c = 10$$

اقسم طرفي المعادلة على 5

$$c = 2s + 10$$

صيغة الميل والمقطع


$$c = \frac{2}{5}s + 2$$

الخطوة 1 : عين النقطة $(0, 0)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة 2 : الميل $= \frac{2}{5}$ ، تحرك من النقطة $(0, 0)$ بمقدار وحدتين إلى

ال أعلى و 5 وحدات إلى اليمين وعين النقطة الجديدة.

الخطوة 3 : ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.




تحقق

مثل كل معادلة فيما يأتي بيانياً:

$$ص = ٥$$

الخطوة ١ : عين المقطع الصادي $(٥, ٠)$.

الخطوة ٢ : الميل = ٠، ارسم خط مستقيم يمر بالنقط التي إحداثها الصادي $= ٥$.




$$ص = ٣ بـ ٢$$

$$ص = \frac{1}{2}$$


الخطوة ١ : عين المقطع الصادي $(0, 0)$ ، $(\frac{1}{2}, 0)$.

الخطوة ٢ : الميل = ٠ ، ارسم خط مستقيم يمر بالنقطة التي
إحداثها الصادي = $\frac{1}{2}$.



تحقق

٤) أي مما يأتي يمثل معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور؟



ج) $ص = 4س + 4$

د) $ص = \frac{1}{4}س + 4$

أ) $ص = \frac{1}{4}س - 1$

ب) $ص = 4س - 1$

(٤)

الخطوة ١ : بما أن المستقيم يقطع محور الصادات في النقطة (٠، -١)

إذا المقطع الصادي = -١ ، وتكون الإجابة الصحيحة هي أ أو ب.

الخطوة ٢ : للانتقال من النقطة (٠، -١) إلى النقطة (٤، ٠)، تحرك

وحدة واحدة إلى الأعلى و ٤ وحدات إلى اليمين،

إذا الميل = $\frac{1}{4}$

الخطوة ٣ : اكتب المعادلة: $ص = مس + ب$

$$ص = \frac{1}{4}س - 1$$

الإجابة الصحيحة هي: أ) $ص = \frac{1}{4}س - 1$

تحقق


٥) **مهرجان خيري:** بلغت تكلفة وجبات العشاء في مهرجان خيري ١١٦٠ ريالاً، فإذا بيعت الوجبة الواحدة بـ ٥ ريالات.

أ) فاكتب معادلة تبين مقدار ربح المهرجان عند بيع (ن) وجبة .

$$\text{الربح} = \text{معدل التغير} \times \text{عدد الوجبات المباعة} - \text{سعر بيع الوجبة}$$

$$R = 5n - 1160$$

ب) مثل هذه المعادلة بيانياً.



ج) أوجد مقدار الربح إذا بيعت ٨٠٠ وجبة.

اكتب المعادلة

$$r = 5n - 1160$$

اعوض عن n بـ ٨٠٠

$$1160 - (800 \cdot 5) =$$

$$= 2840 \text{ ريالاً}$$



مثال ١

اكتب معادلة كل مستقيم فيما يأتي بصيغة الميل والمقطع، ثم مثلها بيانياً:

١) الميل: ٢، المقطع الصادي: ٤

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عوض عن م بـ ٢، وعن بـ ٤


$$ص = ٢ س + ٤$$

بيانياً

الخطوة ١ : عين النقطة (٠، ٤) التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢ : الميل = ٢، تحرك من النقطة (٠، ٤) بمقدار وحدتين إلى الأسفل ووحدة واحدة إلى اليسار وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣ : ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.



٢) الميل: $\frac{3}{4}$ ، المقطع الصادي: -1 .

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

عوض عن m بـ $\frac{3}{4}$ ، وعن b بـ (-1)

$$ص = \frac{3}{4}s - 1$$

بيانياً


الخطوة ١: عين النقطة $(0, -1)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢: الميل = $\frac{3}{4}$

تحرك من النقطة $(0, -1)$ بمقدار ٣ وحدات إلى الأعلى

و ٤ وحدات إلى اليمين وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣: ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.



المثالان ٢ ، ٣

مثل كل معادلة فيما يأتي بياناً:

$$2 - 4s + c =$$


أضف s إلى كلا الطرفين $-4s + 4s + c = 2 + s$

صيغة الميل والمقطع $c = s + 2$

الخطوة ١ : عين النقطة $(0, 2)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢ : الميل = ٤، تحرك من النقطة $(0, 2)$ بمقدار ٤ وحدات إلى الأسفل ووحدة واحدة إلى اليسار وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣ : ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.



$$4) 2s + c = -6$$

$$\text{طرح } 2s \text{ من كلا الطرفين} \quad -2s^2 + c = -6 - 2s$$

$$\text{صيغة الميل والمقطع} \quad c = -2s - 6$$


الخطوة ١ : عين النقطة $(0, -6)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢ : الميل = -2 .

تحرك من النقطة $(0, -6)$ بمقدار وحدتين إلى الأعلى


ووحدة واحدة إلى اليسار وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣ : ارسم خط مستقيم يمر بهاتين النقطتين.




مثال ٤

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الممثل في كل مما يأنى:



$$ص = \frac{2}{3}س + 2$$



$$ص = -\frac{1}{5}س - 1$$


مثال ٥

٧) **نقد:** اشتري محمد أجهزة كهربائية بالتقسيط حيث دفع ٧٥٠ ريالاً دفعة أولى، ويدفع ١٠٠ ريال كل أسبوع.

أ) اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد (س) أسبوعاً.

$$\text{معادلة المبلغ الكلي هي: } M = 100s + 750$$

ب) مثل المعادلة بيانياً.



ج) أوجد المبلغ الذي يدفعه محمد بعد ٨ أسابيع.

$$750 + 8 \times 100 = \text{المبلغ الذي سيدفعه محمد}$$

$$= 1550 \text{ ريال}$$


تدريب وحل المسائل:




مثال ١

اكتب معادلة كل مستقيم فيما يأتي بصيغة الميل والمقطع، ثم مثلها بيانياً:

٨) الميل: ٥، المقطع الصادي: ٨



٩) الميل: ٣، المقطع الصادي: -٤



المثلثان ٢ ، ٣

مثل كل معادلة فيما يأتي بيانياً:


$$١٠) -٥s + c = 1$$

أضف $5s$ إلى كلا الطرفين


$$-5s + c = 1$$

صيغة الميل والمقطع

$$c = 5s + 1$$




$$١١) c = v$$



مثال ٤


اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الممثل في كل مما يأتى:

(١٢)



$$ص = \frac{3}{5}س + 4$$

(١٣)



$$ص = \frac{4}{7}س - 2$$


مثال ٥

١٤) **المها العربي**: المها العربي من الثدييات المعرضة للانقراض. وقد أنشأت المملكة عدة محميات للحفاظ عليها، فكان عددها عام ١٤١٧هـ، نحو ٤٠٠ رأس، وقد ازداد هذا العدد بمعدل ٥٠ رأساً تقريباً كل سنة.

أ) اكتب معادلة تمثل عدد المها في المملكة بعد (س) سنة من ١٤١٧هـ.

$$\text{المعادلة هي: } U = 400 + 50s$$

ب) مثل المعادلة بيانياً.



ج) قدر عدد المها عام ١٤٣٣ هـ؟

$$ع = ٤٠٠ + (١٦)$$

$$= ١٢٠٠ \text{ رأس.}$$

١٥) اكتب معادلة المستقيم الذي ميله = $-\frac{3}{7}$ ، ومقطعه الصادي: ٢

$$\text{معادلة المستقيم هي: } ص = -\frac{3}{7}س + ٢$$

١٦) مثل المعادلة $ص = \frac{3}{4}s - 3$ بيانياً:


$$ص = \frac{3}{4}s - 3$$

الخطوة ١: عين النقطة $(0, -3)$ التي تمثل المقطع الصادي.

الخطوة ٢: الميل = $\frac{3}{4}$ ، تحرك من النقطة $(0, -3)$ بمقدار ٣

وحدات إلى الأعلى و ٤ وحدات إلى اليمين وعين النقطة الجديدة.

الخطوة ٣: ارسم خط مستقيم يمر بـ ٢ نقطتين.



اكتب معادلة كل مستقيم فيما يأتي بصيغة الميل والمقطع :

١٧) الميل: -١ ، المقطع الصادي: ٠

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عوض عن م بـ -١، وعن ب بـ (٠)

$$ص = -س$$

١٨) الميل: -٥، المقطع الصادي: -٢٥، ٠

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عوض عن م بـ -٥، وعن ب بـ (-٢٥، ٠)

$$ص = -٥س - ٢٥$$

١٩) اكتب معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وميله ٣.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

عوض عن م ب ٣، وعن ب ب (٠)


$$ص = ٣س$$

٢٠) دراجات: يتضمن محل تأجير الدراجات النارية ٥ ريالات بالإضافة إلى ٢٥ ريالاً عن كل ساعة.

أ) اكتب معادلة التكلفة الكلية لاستئجار دراجة نارية مدة (س) ساعة بصيغة الميل والمقطع.

التكلفة الكلية لاستئجار دراجة نارية مدة س هي: $ك = ٢٥س + ٥$

ب) مثل المعادلة بيانياً.



ج) ما تكلفة تأجير دراجتين مدة ٨ ساعات؟

$$\text{تكلفة تأجير دراجتين} = ٢٥ \times ٨ + ٥$$

$$= ١٠٤ \text{ ريالات}$$

٢١) **مجلات**: تم بيع ٥٠٠٠٠ نسخة من إحدى المجالات في سنتها الأولى، وازداد هذا العدد بعد ذلك بمعدل ٥٠٠٠ في السنة.

أ) اكتب معادلة تمثل عدد النسخ المباعة (ن) بعد (ص) سنة.

$$\text{معادلة تمثل عدد النسخ المباعة هي: } n = 50000 + 5000s$$

ب) ماذا يمثل الميل؟

يمثل الميل الزيادة في عدد نسخ المجلة المباعة كل سنة.

ج) ماذا يمثل المقطع الصادي؟

يمثل المقطع الصادي عدد النسخ في السنة الأولى.

د) إذا بدأت المجلة سنة ١٤١٠هـ، ففي أي سنة يصل عدد النسخ المباعة إلى ١٥٠٠٠٠ فوق المعدل نفسه؟

$$n = 50000 + 5000s$$

$$150000 = 50000 + 5000s$$

$$100000 = 5000s$$

$$s = 20$$


١٤٣٠هـ يصل عدد النسخ المباعة إلى

١٥٠٠٠٠ نسخة.

مسائل مهارات التفكير العلية:

٤٢) مسالة مفتوحة: اكتب موقعاً من واقع الحياة يمكن تمثيله بـ دالة خطية، ثم اكتب هذه الدالة ومثلها بيانياً.

رسم الدخول إلى مدينة الألعاب ١٥ ريالاً وتكلفة اللعبة الواحدة ٣ ريالات، ص = ٣س + ١٥



٤٣) تبرير: بين ما إذا كان من الممكن كتابة معادلة الخط الرأسي بصيغة الميل والمقطع أم لا، وفسّر إجابتك.

لا؛ لأن الخط الرأسي ليس له ميل.

٢٤) تحد: لخُص الخصائص المشتركة للتمثيلات البيانية للمعادلات الآتية:

$$ص = 2س + 3, ص = 4س + 3, ص = -س + 3, ص = -10س + 3$$

جميعها مستقيمات تقطع محور الصادات عند ٣.

٢٥) اكتب: وضح كيف تجد معدل تغير معادلة بالصيغة القياسية.

افتراض أن معامل ص لا يساوي صفرًا، فعلينا أولاً إعادة كتابة المعادلة بصيغة الميل والمقطع، وبما أن معدل التغير يساوي الميل أيضاً، إذا فإن معامل المتغير س هو معدل التغير.

تدريب على اختبار

(٢٦) يحتوي مخزن للإلكترونيات على س قرصاً مدمجاً، فإذا بيع منها ٣٥٠ قرصاً، وأضيف إليها ٣ ص من الأقراص، فأي عبارة مما يأتي تمثل عدد الأقراص التي أصبحت موجودة في المخزن؟

أ) $س - 350 + 3$ ص ج) $س + 350 + 3$ ص

ب) $س - 350 - 3$ ص د) $350 - س - 3$ ص

العبارة التي تمثل عدد الأقراص التي أصبحت موجودة بالمخزن

هي: (ب)

س - 350 + 3 ص

٢٧) تحتاج وصفة كعكة الفواكه إلى ٥٠ ملليترًا من عصير البرتقال لـكل ١٥٠ ملليترًا من عصير الليمون، فإذا استعملت فدوى ٦٠٠ ملليتر من عصير الليمون، فكم ملليترًا من عصير البرتقال تم استعماله؟

ج) ٢٠٠

أ) ١٥٠

د) ٥٠

ب) ٦٠٠

عصير البرتقال الذي تم استعماله

ج) = ١٦ لترًا.

مراجعة تراكمية

٤٨) اكتب معادلة الحد النوني للمتتابعة الحسابية ٣، ٧، ١١، ١٥، ... (الدرس ٦-٢)

معادلة الحد النوني هي:

معادلة الحد النوني بشكل عام

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

عوض عن $a_1 = 3$ ، وعن $d = 4$

$$a_n = 3 + (n - 1)(4)$$

$$a_n = 3 + 4n - 4$$

$$a_n = 4n - 1$$

٤٩) أوجد العدين الرابع والخامس للمتتابعة ٥، ٢، ٦، ١، ٧، ... (الدرس ٦-٢)

$$d = 2 - 1 = 1$$

$$\text{الحد الرابع} = 1 + 3 \times 1 = 4$$

$$\text{الحد الخامس} = 1 + 4 \times 1 = 5$$

العدين الرابع والخامس للمتتابعة هما: ٤، ٨، ٥، ٩

٣٠) حل المعادلة $3 - 2s = 6$. (الدرس ١ - ٣)

$$3 - 2s = 6$$

$$3 - 2s = 6$$

$$s = \frac{3}{2}$$

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة:

أوجد ميل المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط الآتية:

(٧، ٩)، (٣، ٢)، (٧، ٩)

$$\frac{3 - 7}{2 - 9} = \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_1} = m$$

$$m = \frac{4}{7}$$

(٣٢) (-٤، ٣)، (٦، ٢)، (٧، ٩)

$$\frac{6 - 4}{3 + 2} = \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_1} = m$$

$$m = \frac{2}{5}$$

(٣، ١)، (٣، ٣-) (٣٣)

$$\frac{0}{4} = \frac{3-3}{1-3} = \frac{ص - 2}{س - 2} = م$$

$$= م$$

٢-٣

كتابة المعادلات بصيغة الميل والقطع

تحقق

١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2, 5)$ وميله 3 .

الخطوة ١:

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والقطع

$$ص = م س + ب$$

عرض عن $م$ بـ 3 ، وعن $ص$ بـ 5 ، وعن $س$ بـ -2

$$5 = 3(-2) + ب$$

بسط

$$5 = -6 + ب$$

أضف 6 إلى كل طرف

$$5 + 6 = -6 + 6 + ب$$

$$11 = ب$$

الخطوة ٢ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

$$ص = م س + ب$$

$$ص = ١١ س + ٣$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = ٣ س + ١١$

تحقق

أوجد معادلة المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط الآتية:

$$(12, 4), (8, -1).$$

الخطوة ١ :

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين.

صيغة الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{12 - 8}{1 + 4}$$

$$m = 4$$

الخطوة ٢ :

اختر أحدي النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = m s + b$$

عوض عن $m = 4$ ، وعن $s = 12$ ، وعن $c = 8$

$$8 = 4(12) + b$$

أضف 16 إلى كلا الطرفين

$$16 = 8 + b$$

$$b = 8$$

الخطوة ٣:

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$ص = م س + ب$$

$$ص = -٤ س + ٨$$

٢ ب) (٤ - ، ٥ - ، ٦ -).

الخطوة ١ :

اوجد ميل المستقيم المار بال نقطتين.

صيغة الميل

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = m$$

$$\frac{2 + 6 -}{4 + 5 -} =$$

$$m = 4$$

الخطوة ٢ :

اختر احدى النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = m s + b$$

عوض عن $m = 4$ ، وعن $c = -6$ ، وعن $s = -5$

$$-6 = 4(-5) + b$$

$$-6 = -20 + b$$

$$b = 14$$

الخطوة ٣ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$c = m s + b$$

$$c = 4s + 14$$

تحقق

٣) **رواتب**: يتقاضى طلال أجرة أسبوعية قدرها ٣٥١ ريالاً مقابل ساعات عمله الأساسية مضافاً إليها ساعة عمل إضافية . فإذا عمل الأسبوع الماضي ٥ ساعات إضافية وتقاضى مبلغاً إجمالياً قدره ٤١٥ ريالاً، فاكتب معادلة خطية لإيجاد أجراه الكلية (ج) إذا عمل (س) ساعة إضافية.

عندما يعمل طلال ساعة واحدة إضافية يتتقاضى ٣٥١ ريال: أي (١، ٣٥١)

عندما عمل ٥ ساعات إضافية تقاضي ٤١٥ ريال: أي (٥، ٤١٥)

أوجد الميل م.

$$m = \frac{w_1 - w_2}{s_1 - s_2}$$

$$\frac{64}{4} = \frac{315 - 415}{1 - 5} =$$

$$m = 16$$

اختر النقطة (١، ٣٥١) وأوجد المقطع الصادي للمستقيم.

صيغة الميل والمقطع

$$c = ms + b$$

اطرح ١٦ من الطرفين

$$351 = 16(1) + b$$

$$b = 335$$

استعمل $m = 16$ ، $b = 335$ لكتابة المعادلة.

$$c = ms + b$$

$$j = 16s + 335$$



٤) رواتب: استعمل المعادلة (الناتجة في التحقق من فهمك ٣) للتبؤ بالمبلغ المستحق الذي ينفذه انه طلال في الأسبوع إذا عمل ٨ ساعات إضافية.

المعادلة الأصلية

$$ج = ٦١٦ + ٣٣٥$$

عوض عن س بـ ٨

$$ج = ٦١٦ + ٨ \times ٣٣٥$$

$$ج = ٣٣٥ + ١٢٨$$

$$ج = ٤٦٣$$
 ريالاً.



مثال ١

١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٤، ٦) وميله -٢.

معادلة المستقيم هي

الخطوة ١ :

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عوض عن م بـ -٢، وعن ص بـ ٦، وعن س بـ -٤

$$٦ = -٢(-٤) + ب$$

بسط

$$٦ = ٨ + ب$$

اطرح ٨ من كل طرف

$$٢ = ب$$

الخطوة ٢ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = م س + ب$$

عوض عن م بـ -٢، وعن بـ ٢

$$ص = -٢ س - ٢$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = -٢ س - ٢$

مثال ٢

٢) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(-3, 5)$ ، $(-7, 3)$.

معادلة المستقيم هي

الخطوة ١ :

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين.

صيغة الميل

$$m = \frac{w_2 - w_1}{s_2 - s_1}$$

$$\frac{3 + 5}{7 + 3} =$$

$$m = 2$$

الخطوة ٢ :

اختر احدى النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = ms + b$$

اعوض عن m بـ 2 ، وعن c بـ 5 ، وعن s بـ -3 .

$$5 = (-3)(2) + b$$

$$5 = -6 + b$$

$$b = 11$$

الخطوة ٣ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$c = ms + b$$

$$c = 2s + 11$$

المثالان ٣ ، ٤

٣) سكان: بلغ عدد سكان المملكة عام ١٤٢٦هـ نحو ٤,٢٣ مليون نسمة، ويرداد عددهم بمعدل ٧٥,٠ مليون نسمة سنويًا.

أ) اكتب معادلة خطية لإيجاد عدد سكان المملكة (ك) بالملايين بعد (ص) سنة منذ ١٤٢٦هـ.

المعادلة الخطية لإيجاد عدد سكان المملكة بالملايين هي:

$$ك = ٤ + ٧٥ \cdot ص$$

ب) إذا استمرت الزيادة نفسها، فكم يصبح عدد سكان المملكة عام ١٤٤٠هـ؟

$$ك = ٤ + ٧٥ \cdot ص$$

$$ك = ٤ + ٧٥ \cdot (٤٠)$$

$$ك = ١٠,٥ + ٢٣,٤$$

$$ك = ٣٣,٩$$

عدد سكان المملكة عام ١٤٤٠هـ هو: ٣٣,٩ مليون نسمة.

تدريب وحل المسائل:



مثال ١

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والمعلوم ميله في كل مما يأتي :

$$4) (1, 3)؛ \text{الميل} = 2.$$

الخطوة ١ :

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = m_s + b$$

$$\text{عوض عن } m \text{ بـ } 2, \text{ وعن } ص \text{ بـ } 1, \text{ وعن } s \text{ بـ } 3$$

$$1 = 2(3) + b$$

بسط

$$1 = 6 + b$$

اطرح ٦ من كل طرف

$$-5 = b$$

الخطوة ٢ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = m_s + b$$

$$\text{عوض عن } m \text{ بـ } 2, \text{ وعن } b \text{ بـ } -5$$

$$ص = 2s - 5$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = 2s - 5$

٥) (-١، ٤)؛ الميل = -١.

الخطوة ١:

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

عوض عن $m = -1$ ، وعن $c = 4$ ، وعن $s = 1$

$$4 = -1(-1) + ب$$

بسط

$$4 = 1 + ب$$

اطرح ١ من كل طرف

$$3 = ب$$

الخطوة ٢:

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

عوض عن $m = -1$ ، وعن $b = 3$

$$ص = -س + 3$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = -س + 3$

٦) (١، ٠)، الميل = ١.

الخطوة ١:

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

اعوض عن $m = 1$ ، وعن $s = 0$ وعن $b = 1$

$$ص = 1 * 0 + ب$$

بسط

$$ص = 0 + ب$$

$$ص = ب$$

الخطوة ٢:

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

اعوض عن $m = 1$ ، وعن $b = -1$

$$ص = س - 1$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = س - 1$

مثال ٤

اكتب معادلة المستقيم المار بكل نقطتين فيما يأتي :

(٧ ، ٩) ، (٤ ، ٣) ، (٢ ، ١).

الخطوة ١ :

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين.

صيغة الميل

$$m = \frac{w_2 - w_1}{s_2 - s_1}$$

$$\frac{2 + 3}{9 - 4} =$$

$$m = 1$$

الخطوة ٢ :

اختر إحدى النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = ms + b$$

عوض عن m بـ ١، وعن s بـ ٣، وعن c بـ ٤

$$3 = (1)(4) + b$$

$$3 = 4 + b$$

$$b = 1$$

الخطوة ٣ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$ص = م س + ب$$

$$ص = -س + ٧$$

.(٧-، ٠)، (٣، ٥-) (٨

الخطوة ١ :

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين.

صيغة الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{3 - 7}{5 + 0} =$$

$$m = -2$$

الخطوة ٢ :

اختر إحدى النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = m s + b$$

عوض عن $m = -2$ ، وعن $s = 0$ ، وعن $c = 7$.

$$7 = -2(0) + b$$

$$7 = 0 + b$$

$$b = 7$$

الخطوة ٣ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$c = m s + b$$

$$c = -2s + 7$$

(٤) (١-، ٣-) ، (٢-، ٣-) .

الخطوة ١ :

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين.

صيغة الميل

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$$

$$\frac{3 + 3}{1 + 2 -} =$$

$$m = 6 -$$

الخطوة ٢ :

اختر احدى النقطتين لإيجاد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$c = m s + b$$

عوض عن $m = 6$ ، وعن $s = 3$ ، وعن $c = 2$.

$$2 = (-6)(3) + b$$

$$2 = 18 + b$$

$$b = 9 -$$

الخطوة ٣ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع الصادي.

$$c = m s + b$$

$$c = -6s + 9$$

١٠) سيارات، يحرك سامي سيارة لعبة باستعمال جهاز التحكم عن بعد بسرعة ثانية، فبدأ بتحريك السيارة عندما كانت على بعد ٥ أقدام منه، وبعد ثانيةين أصبح بعدها ٣٥ قدمًا.

أ) اكتب معادلة خطية لإيجاد بعد السيارة (ف) عن سامي بعد (ن) ثانية.

$$\text{المعادلة الخطية هي: } F = 15n + 5$$

ب) قدر المسافة التي تقطعها السيارة بعد ١٠ ثوان.

المسافة التي تقطعها السيارة في ١٠ ثوان هي:

$$F = 15n + 5$$

$$F = 15 + 10 \times 15$$

$$F = 150 + 5$$

$$F = 155 \text{ قدم}$$

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والمعلوم ميله في كل مما يأنني :

$$11) (4, 2); \text{الميل} = \frac{1}{2}.$$

الخطوة ١:

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

اعوض عن m ب $\frac{1}{2}$ ، وعن c ب 2 ، وعن s ب :

$$2 = \frac{1}{2}(4) + ب$$

بسط

$$2 = 2 + ب$$

اطرح 2 من كل طرف

$$0 = ب$$

الخطوة ٢:

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

$$ص = \frac{1}{2}s$$

ف تكون المعادلة هي: $ص = \frac{1}{2}s$

$$12) (4, 6); \text{الميل} = \frac{3}{4}.$$

الخطوة ١ :

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

$$\text{عوض عن } م \text{ بـ } \frac{3}{4}, \text{ وعن } ص \text{ بـ } 6, \text{ وعن } س \text{ بـ } 4$$

$$6 = \frac{3}{4}(4) + ب$$

بسط

$$6 = 3 + ب$$

أضف ٣ إلى كل طرف

$$ب = 9$$

الخطوة ٢ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$ص = مس + ب$$

$$ص = \frac{3}{4}س + 9$$

$$\text{ف تكون المعادلة هي: } ص = \frac{3}{4}س + 9$$

$$. \frac{3}{5} = 4 - 2 ; \text{الميل} =$$

الخطوة ١ :

أوجد المقطع الصادي.

صيغة الميل والمقطع

$$\text{ص} = \text{م س} + \text{ب}$$

عوض عن م بـ $\frac{3}{5}$ ، وعن ص بـ ٢، وعن س بـ ٤

$$\text{ب} + (4 -) \frac{3}{5} = 2 -$$

بسط

$$\text{ب} + \frac{12}{5} = 2 -$$

اطرح $\frac{2}{5}$ من كل طرف

$$\text{ب} + 2\frac{2}{5} = 2 -$$

$$\text{ب} = 4\frac{2}{5} -$$

الخطوة ٢ :

اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

صيغة الميل والمقطع

$$\text{ص} = \text{م س} + \text{ب}$$

$$\text{ص} = 4\frac{2}{5} - \frac{3}{5} \text{س} -$$


ف تكون المعادلة هي: $\text{ص} = 4\frac{2}{5} - \frac{3}{5} \text{س} -$

١٤) طلاب: قدر عدد خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس في المملكة عام ١٤٢٠هـ بـ ٣٨ ألف طالب وطالبة، ووصل هذا العدد عام ١٤٢٤هـ إلى ٥٣ ألف طالب وطالبة.

أ) اكتب معادلة خطية لإيجاد عدد الخريجين من حملة البكالوريوس (k) بعد (u) سنة من العام ١٤٢٠، حيث $u = \text{صفر}$ في العام ١٤٢٠هـ.

$$\text{المعادلة الخطية لعدد الخريجين هي: } k = 5 + 38u$$

ب) مثل المعادلة بيانياً.



جـ) قـدر عـدـد الـخـرـيـجـين عـام ١٤٣٦ هـ.

$$ك = ٣٨ + ٧٥$$

$$ك = ٣٨ + (١٦٣,٧٥)$$

$$ك = ٣٨ + ٦٠$$

$$ك = ٩٨$$

عـدـد الـخـرـيـجـين عـام ١٤٣٦ هـ: ٩٨ أـلـف طـالـب و طـالـبـة.

(١٥) نـادـرـيـاضـيـ: يـقـدـم نـادـرـيـاضـي عـرـضـا لـلـعـضـوـيـة مـقـابـل ٢٦٥ رـيـالـا، وـدـرـوـسـا فـي التـمـارـين الرـيـاضـيـة بـمـبـلـغـ إـضـافـي مـقـدارـه ٥ رـيـالـات لـكـل درـس.

أ) اـكـتـب معـادـلـة تـمـثـل التـكـلـفـة الـكـلـيـة لـعـضـو حـضـرـس درـسـا.

$$\text{معـادـلـة التـكـلـفـة الـكـلـيـة لـعـضـو حـضـرـ درـسـ هي: } ص = ٢٦٥ + ٥s$$

بـ) إـذـا كـان المـبـلـغ الـذـي دـفـعـه مـالـك ٥٠٠ رـيـالـ في إـحـدى السـنـوـات، فـما عـدـد درـوـس التـمـارـين الرـيـاضـيـة التي حـضـرـها؟

$$ص = ٢٦٥ + ٥s$$

$$٥٠٠ = ٢٦٥ + ٥s$$

$$٢٣٥ = ٥s$$

$$٤٧ = s$$

عـدـد الدـرـوـس الرـيـاضـيـة التي حـضـرـها مـالـك: ٤٧ درـسـ.

اكتب معادلة المستقيم المار بكل نقطتين فيما يأتي :

$$(16) \quad (-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}), (\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$$

$$ص = \frac{1}{6}س + \frac{19}{24}$$

$$(17) \quad (\frac{1}{6}, -\frac{3}{4}), (-\frac{1}{12}, \frac{5}{4})$$

$$ص = -\frac{7}{12}س$$

بَيْنَ هَلْ تَقُوْنُ النَّقْطَةُ عَلَىِ الْمُسْتَقِيمِ المُعْطَى مَعَادِلَتِهِ؟ وَبَيْنَ سَبَبِ ذَلِكَ.

$$(18) \quad ص = \frac{1}{3}س + 5$$

لا؛ عَوْضٌ عَنِ السَّبَبِ ٣ وَعَنِ الصَّبَبِ ١ فَتَكُونُ النَّتِيْجَةُ خَاطِئَةً.

$$(19) \quad ص = -\frac{1}{3}س + 5$$

نعم؛ عَوْضٌ عَنِ السَّبَبِ ٦ وَعَنِ الصَّبَبِ ٢ فَتَكُونُ النَّتِيْجَةُ صَحِيْحَةً.

٢٠) **بيئة**: طبق مصنع برنامجاً لتقليل النفايات، ففي عام ١٩٩٨م كانت كمية النفايات ٩٤٦ طناً، ثم بدأت تتناقص بعد ذلك بمعدل ٤٤ طناً سنوياً.

أ) كم طناً تصل كمية النفايات عام ٢٠١٠م؟

$$\text{كمية النفايات عام } 2010 \text{ م} = 12 \times 28,4 + 340,8 = 340,8 \text{ طناً.}$$


$$340,8 - 946 = 605,2 \text{طنان.}$$

ب) في أيّ عام يصبح الاستمرار في هذا الاتجاه مستحيلاً؟ وضح إجابتك.


يصبح استمرار هذا الاتجاه مستحيلاً عام ٢٠٣٢م؛ ستكون في هذا العام كمية النفايات صفر وبعد ذلك تصبح كمية سالبة وهذا مستحيل.

٢١) **تمثيلات متعددة**: ستكتشف في هذا السؤال، العلاقة بين ميلي المستقيمين المتعامدين.

أ) بيانياً، مثل المستقيم $s = \frac{3}{4}s + 1$ على ورقة رسم بياني.



ب) شكلياً، ارسم مستقيماً يعادل المستقيم المرسوم باستعمال مسطرة غير مدرجة ومنقلة.



ج) جبرياً، أوجد معادلة المستقيم الذي يتعامد مع المستقيم الأصلي، وصف الطريقة التي استعملتها لكتابه المعادلة.

يمر المستقيم بال نقطتين $(1, 0)$ ، $(-3, 5)$ وباستعمال هاتين النقطتين

نجد أن ميل المستقيم $= -\frac{4}{3}$ ، وبما أن المقطع الصادي هو 1،

لذا نعرض 1 في المعادلة $s = ms + b$ بدلًا من b و $(-\frac{4}{3})$

من m فنحصل على $s = -\frac{4}{3}s + 1$

د) تحليلياً، قارن ميل المستقيمين، وصف العلاقة بينهما.

ميل المستقيم الأصلي $\frac{3}{4}$ وميل المستقيم المتعامد معه $-\frac{4}{3}$

إذاً ميل أحد المستقيمين هو مقلوب معكوس ميل الآخر.

مسائل مهارات التفكير العليا:

اكتشف الخطأ: كتب كل من أحمد وسمير معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٣، ٢)، (٤، ٦). فأيهما كانت إجابته صحيحة؟ وضع السبب.

للسمير

$$٢ = \frac{٦ - ٤}{٣ - ٢} = \frac{٢}{١} = ٢$$

$$\text{ص} = ٢\text{س} + ب$$

$$٦ = ٢(٤) + ب$$

$$٦ = ٨ + ب$$

$$ب = ٦ - ٨$$

$$\text{ص} = ٢\text{س} - ٦$$

أحمد

$$٢ = \frac{٦ - ٤}{٣ - ٢} = \frac{٢}{١} = ٢$$

$$\text{ص} = ٢\text{س} + ب$$

$$٢ = ٢(٣) + ب$$

$$٢ = ٦ + ب$$

$$ب = ٢ - ٦$$

$$\text{ص} = ٢\text{س} - ٦$$

أحمد؛ لأن سمير قام بتبديل الأحداثيين س، ص في النقطة التي استعملها في الخطوة ٣.

نها:

٢٣) إذا كانت النقاط $(3, 7)$, $(1, 6)$, $(-1, 9)$ تقع على المستقيم نفسه، فأوجد قيمة h ، وبين خطوات الحل.

١١؛ استعمل أول نقطتين لإيجاد معادلة المستقيم، ثم استبدل قيمتي s ، ص ب 9 ، ب على الترتيب وحل المعادلة بالنسبة لـ b .

٢٤) **تبرير:** تعلم أن الصورة القياسية للمعادلة الخطية هي: $as + b = c$.

أ) أعد كتابة هذه المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

$$\text{المعادلة بصيغة الميل والمقطع هي : } c = -\frac{a}{b}s + \frac{b}{a}$$

ب) ما ميل المستقيم؟


$$\text{ميل المستقيم} = -\frac{a}{b}$$

ج) ما قيمة المقطع الصادي؟

$$\text{قيمة المقطع الصادي} = \frac{b}{a}$$

٢٥) مسالة مفتوحة:

اكتب مسالة من واقع الحياة تناسب التمثيل المجاور، ثم عرف المتغيرين، وصف العلاقة بينهما، واكتب معادلة تمثل هذه العلاقة، وصف معنى كل من الميل والمقطع الصادي.



يتدفق الماء من قارورة بها $\frac{1}{2}$ لتر في الثانية، افرض أن c تمثل عدد لترات الماء الموجودة في القارورة، s تمثل زمن (بالثانية) تدفق الماء من القارورة؛ بزيادة ثانية واحدة تقل كمية الماء في الإبريق $\frac{1}{2}$ لتر، فتكون المعادلة هي $c = -\frac{1}{2}s + 4$ ؛ حيث يمثل الميل معدل تغير الماء المتذبذب من القارورة وهو $\frac{1}{2}$ لتر في الثانية، والمقطع الصادي يمثل كمية الماء في القارورة عندما كان ممتلئا وهي 4 لترات.

٤٦) اكتب: ما المعلومات الضرورية لكتابة معادلة مستقيم؟ وضع إجابتك.



المعلومات الضرورية لكتابة معادلة المستقيم هي: معرفة الميل والمقطع الصادي، أو الميل وإحداثيات نقطة تقع عليه، أو إحداثيات نقطتين.

تدريب على اختبار

٢٧) يحصل ماجد على خصم نسبته ١٢٪، فإذا اشتري سلعة بمبلغ ٣٥٥ ريالاً، فما مقدار الخصم على هذا المبلغ إلى أقرب ريال؟

ج) ٣٦ ريالاً

أ) ١٢ ريالاً


د) ٤٣ ريالاً

ب) ٣٠ ريالاً

آخر:

$$\text{مقدار الخصم على المبلغ} = \frac{12}{100} \times 355 \approx 43 \text{ ريالاً.}$$

٢٨) هندسة، في الشكل أدناه، تم توصيل منتصفات أضلاع المربع للحصول على مربع أصغر. فما مساحة المربع المظلل؟



ج) ٢٤٨ سم^٢

أ) ٦٤ سم^٢

د) ٢٥٦ سم^٢


ب) ١٢٨ سم^٢

اختر:

$$\text{مساحة المربع المظلل} = \pi (64 + 64)^2 = 128 \text{ سم}^2.$$


مراجعة تراكمية

٢٩) مثل المعادلة: $s = 3t + 2$ بيانياً. (الدرس ٣ - ٢)



٣٠) أرصاد جوية: يُعبر عن المسافة (ف) بالأمتار التي يقطعها صوت الرعد (ن) بالثانية بالمعادلة: $f = 21n + 2$. (الدرس ٣ - ٢)

أ) مثل المعادلة بيانياً.



ب) استعمل التمثيل البياني لتقدير الزمن المستغرق بين حدوث الرعد وسماع صوته من مسافة 3 أميال.

الزمن المستغرق بين حدوث الرعد وسماع صوته = ١٤ ث تقريرياً.

(٣١) حل المعادلة: $-14 - \frac{n}{9} = 9$ ، وتحقق من صحة الحل. (الدرس ٢-١)

حل المعادلة هو $128 - n = 81$

$$n = 207$$

(٣٢) حل المعادلة: $3s = 3s + 1$. (الدرس ٤-١)

حيث 3s في طرفي المعادلة إذن المعادلة لا يوجد لها حل.

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة :

أوجد قيمة (ر) التي تجعل ميل المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط الآتية كما هو معطى:

$$م = 4 \quad (33) \quad (6 - 2, r), (r, 6)$$

$$م = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$$

$$\frac{4 - 2}{r - 6} = \frac{6 - 2}{r - 6} = 4$$

$$4 = (r - 6)$$

$$4 = 6 - r$$

$$r = 6 - 4$$

$$r = 2$$

$$r = 2$$

$$\frac{4}{3} = m, (3-2), (r, 5) \quad (34)$$

$$\frac{s_1 - s_2}{c_1 - c_2} = m$$

$$\frac{r-3}{3} = \frac{r-3}{2-5} = \frac{4}{3}$$

$$12 = (r-3)^3$$

$$12 = r^3 - 9 -$$

$$12 - 9 - = r^3$$


$$21 - = r^3$$

$$r - =$$

اختبار منتصف الفصل

3

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الممثل في كل مما
يأتي: (الدرس ١-٣)




$$ص - ص_٠ = م (س - س_٠)$$

$$ص - ٢ = ٣ (س - ٠)$$

$$ص - ٣س = ٢$$

$$ص = - ٣س + ٢$$

(٢)



$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

$$ص - ٣ = \frac{٣}{٥} (س - ٥)$$

$$ص - ٣ = \frac{٣}{٥} (س - ٥)$$

$$ص + \frac{٣}{٥} س = ٣ + \frac{٣}{٥} (٥)$$

مثل كل معادلة فيما يأتي بيانياً:

$$x^3 + 2x = 0$$

المقطع السيني:

$$x^3 + 2x = 0$$

$$x^3 = -2$$

$$x = 1\frac{1}{2}$$


$$\left(0, 1\frac{1}{2}\right)$$

المقطع الصادي:

$$x^3 + 0 = 0$$

$$x = 0$$

$$(0, 0)$$



$$4) \quad ص = \frac{1}{3} س - ٢$$

المقطع السيني:

$$س = \frac{1}{3} ص + ٢$$

$$س = \frac{1}{3} ص + ٢$$

$$س = ٦$$


$$(ص , س) = (٠ , ٦)$$

المقطع الصادي:

$$ص = س - ٣$$

$$ص = س - ٣$$

$$(ص , س) = (٣ , ٠)$$



٥) خدمة توصيل: طلب مجموعة موظفين عدداً من الوجبات من مطعم، فإذا كان ثمن الوجبة الواحدة ٢٥ ريالاً، وأجر خدمة التوصيل ١٠ ريالات، فاكتب معادلة لإيجاد المبلغ الذي يجب دفعه للمطعم. (الدرس ٢-٣)

$$\text{المبلغ} = ٢٥n + ١٠$$

اكتب معادلة المستقيم في كلٌ من الحالات التالية:

٦) يمر بالنقطة (٢ ، ٥)، وميله يساوي ٣

$$ص - ص_١ = م(س - س_١)$$

$$ص - ٥ = ٣(س - ٢)$$

٧) يمر بالنقطة $(-1, 3)$ ، وميله يساوي $\frac{1}{3}$

$$ص - ص_1 = م(س - س_1)$$

$$ص + 1 = \frac{1}{3}(س + 3)$$

٨) يمر بال نقطتين $(-4, 3), (1, 12)$.

$$م = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$$

$$\frac{4 - 12}{3 + 1} =$$

$$2 = \frac{8}{4} =$$

$$ص = مس + ب$$

$$ص = 2س + 12$$

$$ب = 12$$

$$ص = 2س + 12$$

٩) يمر بال نقطتين (٤، ٢)، (٦، ١).

$$m = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$$

$$\frac{6-4}{1+2} =$$

$$\frac{2}{3} =$$

$$ص = m س + ب$$

$$ب + \left(\frac{2}{3} \times 1 \right) = 4$$

$$\frac{4}{3} + 4 = ب$$

$$5\frac{1}{3} =$$

$$ص = 5\frac{1}{3} س + \frac{2}{3}$$

١٠) يمر بالنقطة (٢، ١)، وميله يساوي صفرًا.

$$ص - ص_1 = m (س - س_1)$$

$$ص - 1 = 0 (س - 2)$$

$$ص - 1 = 0$$

١١) اختيار من متعدد: اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة
(٤،٠) وميله يساوي -٤ (الدرس ٢-٣)

أ) $ص = س - 4$

ب) $ص = س + 4$

ج) $ص = -4س$

د) $ص = 4 - س$

٣-٣

كتابة المعادلات بصيغة الميل ونقطة

تحقق

١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة $(-1, 2)$ وميله -6 بصيغة الميل ونقطة، ثم مثلها بيانياً.


صيغة الميل ونقطة

$$(\mathbf{1}\mathbf{s} - \mathbf{s})\mathbf{L} = \mathbf{1}\mathbf{w} - \mathbf{w}$$

$$\mathbf{s} - (1) = -6(\mathbf{s} - (-2))$$

$$\mathbf{s} - 1 = -6(\mathbf{s} + 2)$$

والتمثل البياني عين النقطة $(-2, 1)$ ، واستعمل الميل لإيجاد نقطة أخرى على المستقيم، ثم ارسم المستقيم الواصل بين هاتين النقطتين.



٢) اكتب $s - 1 = 7(s + 5)$ بالصورة القياسية .

المعادلة الأصلية

$$s - 1 = 7(s + 5)$$

خاصية التوزيع

$$s - 1 = 7s + 35$$

اطرح s من كل طرف

$$1 - s = 35 - s$$

اطرح 35 من كل طرف

$$1 - 35 = -s$$

المعادلة بالصورة القياسية: $1 - 35 = -s$

تحقق

٣) اكتب المعادلة $s + 6 = -3(s - 4)$ بصيغة الميل والمقطع.

المعادلة الأصلية

$$s + 6 = -3(s - 4)$$

خاصية التوزيع

$$s + 6 = -3s + 12$$

اطرح 6 من كل طرف

$$s = -3s + 6$$

المعادلة بصيغة الميل والمقطع: $s = -3s + 6$

تحقق

١٤) اكتب معادلة المستقيم الذي يتضمن الضلع $\overline{B\text{-}J}$ بصيغة الميل ونقطة.

الخطوة ١ :

أوجد ميل $B\text{-}J$.

$$\frac{{}_1\mathbf{w} - {}_2\mathbf{w}}{{}_1\mathbf{s} - {}_2\mathbf{s}} = m$$

$$(8, 4) = ({}_2\mathbf{w} @ \mathbf{s}), (5, 7) = ({}_1\mathbf{w} @ \mathbf{s}) \quad \frac{5 - 8}{7 - 4} = m$$

$$m = -1$$

الخطوة ٢ :

اعرض في صيغة الميل ونقطة.

صيغة الميل ونقطة

$$({}_1\mathbf{s} - \mathbf{s})\mathbf{L} = {}_1\mathbf{w} - \mathbf{w}$$

$$s - 5 = -1(s - 4) \text{ أو } s - 8 = 1(s - 7)$$

٤ب) اكتب معادلة المستقيم الذي يتضمن الضلع $\overline{B-C}$ بالصورة القياسية .

معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

$$ص - ٥ = ١(س - ٧)$$

خاصية التوزيع

$$ص - ٥ = س + ٧$$

أضف س إلى كل طرف

$$س + ص - ٥ = ٧$$

أضف ٥ إلى كل طرف

$$س + ص = ١٢$$

المعادلة بالصيغة القياسية هي: $س + ص = ١٢$




مثال ١

اكتب معادلة المستقيم في كل حالة مما يأتي بصيغة الميل ونقطة، ثم مثلها بيانياً:


١) يمر بالنقطة $(-2, 5)$ ، وميله -6

$$ص = -6(s + 2) + 5$$



٢) يمر بالنقطة $(-2, -8)$ ، وميله $\frac{5}{6}$

$$ص + 8 = \frac{5}{6}(س - 2)$$



مثال ٢

اكتب كل معادلة فيما يأتي بالصورة القياسية:

$$(3) \quad 8s + 2 = \frac{7}{8}(s - 3)$$

اضرب كل طرف في ٨

$$8s + 16 = 7(s - 3)$$

خاصية التوزيع

$$8s + 16 = 7s - 21$$

اطرح ٨s من كل طرف

$$16 - 8s = 21 - 7s$$

اضف ٢١ إلى كل طرف

$$37 = 7s - 8s$$

$$37 = 7s - 8s$$

$$(4) \quad ص + ٧ = ٥ - (٣ + س)$$

خاصية التوزيع

$$ص + ٧ = ٥ - س$$

أضف $-س$ إلى كل طرف

$$١٥ = ٧ + ص$$

اطرح ٧ من كل طرف

$$٤٢ = س + ص$$

$$(5) \quad ص + ٢ = ٣ - (٦ + س)$$

اضرب كل طرف في ٣

$$٣ص + ٦ = ٦ - (س + ٣)$$

خاصية التوزيع

$$٣ص + ٦ = ٣٠ + س$$

اطرح ٣ $ص$ من كل طرف

$$٦ = ٣٠ + س - ٣ص$$

اطرح ٣٠ من كل طرف

$$٦ = س - ٣٠$$

مثال ٣

اكتب كل معادلة فيما يأتي بصيغة الميل والمقطع:

$$(6) \quad ص - ١٠ = ٤(س + ٦)$$

خاصية التوزيع

$$ص - ١٠ = ٤س + ٢٤$$

أضف ١٠ إلى كل طرف

$$ص = ٤س + ٣٤$$

$$(7) \quad ص - ٧ = \frac{٣}{٤}(س + ٥)$$

اضرب كل طرف في ٤

$$٤ص - ٢٨ = ٣(س + ٥)$$

خاصية التوزيع

$$٤ص - ٢٨ = ٣س - ١٥$$

أضف ٢٨ إلى كل طرف

$$٤ص = ٣س + ١٣$$

اقسم كل طرف على ٤

$$ص = \frac{٣}{٤}س + \frac{١٣}{٤}$$

$$(8) \quad ص - ٩ = س + ٤$$

أضف ٩ إلى كل طرف


$$ص - ٩ = س + ٤$$

$$ص = س + ١٣$$

مثال ٤

٩) هندسة: استعمل المثلث القائم فـ قـ هـ للإجابة عما يأتي:

أ) اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم الذي يتضمن
الضلوع ق هـ.



الخطوة ١: أوجد ميل ق. ه.

$$\frac{1\mathbf{W} - 2\mathbf{W}}{1\mathbf{s} - 2\mathbf{s}} = \mathbf{p}$$

$$(1, t) = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 2 & s \end{pmatrix} \cdot (V, T) = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & s \end{pmatrix} \quad \frac{7-1}{3+4} = e$$

$$\frac{6}{7} - = ?$$

الخطوة ٢ :

عوض في صيغة الميل ونقطة.

صيغة الميل ونقطة

$$(\mathbf{L} - \mathbf{s}_1) = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}$$

$$s - 7 = 3(s + \frac{6}{7})$$

معادلة المستقيم بصيغة الميل والنقطة هي: $s - 7 = 3(s + \frac{6}{7})$

ب) اكتب معادلة المستقيم نفسه بالصورة القياسية.

اضرب كل طرف في ٤

$$4s - 28 = 12(s + \frac{6}{7})$$

اضف ٢٨ إلى كل طرف

$$4s + 28 = 12s + 72$$

$$8s = 44$$

$$s = 5.5$$

معادلة المستقيم بالصورة القياسية هي: $s = 5.5$

تدريب وحل المسائل:




مثال ١

اكتب معادلة المستقيم في كل حالة مما يأتي بصيغة الميل ونقطة، ثم مثله بيانياً:


١٠) يمر بالنقطة $(5, 3)$ ؛ وميله ٧

$$ص - ٣ = ٧(س - ٥)$$



١١) يمر بالنقطة $(1, -2)$ ؛ وميله -3

$$ص = 1 - 3(س)$$



١٢) اكتب معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة $(0, -6)$ بصيغة الميل ونقطة.

$$ص = صفر$$

مثال ٢

اكتب كل معادلة فيما يأنى بالصورة القياسية:

$$(13) \quad ١٠ - ٢s = ٨ - s$$

$$٦ - s = ٢s$$

$$(14) \quad ٦ - ٣s = ٢ + s$$

$$٣s + s = ٦$$

$$(15) \quad ٤s + ٤ = \frac{٢}{٣}(s + ٧)$$

بضرب طرفي المعادلة في ٣

$$٣(٤s + ٤) = ٢(s + ٧)$$

$$١٢s + ١٢ = ٢s + ١٤$$

$$١٠s = ٢$$

مثال ٣

اكتب كل معادلة فيما يأتي بصيغة الميل والمقطع :

$$(16) \quad ص - ٦ = ٢(س - ٧)$$

$$ص - ٦ = ٤س + ١٤$$

$$ص = ٤س + ٢٠$$

$$(17) \quad ص + ٥ = ٦(س + ٧)$$

$$ص + ٥ = ٦س + ٤٢$$

$$ص = ٦س + ٣٧$$

$$18) \quad ص + ٢ = \frac{1}{٦}(س - ٤)$$

$$ص = \frac{1}{6}س - \frac{1}{3} + ٢$$

$$ص = \frac{1}{6}س + \frac{5}{3}$$

مثال ٤

١٩) معتمداً على الشكل الوارد في مثال ٤، اكتب معادلة المستقيم الذي يتضمن الف slutم \overline{AD} بصيغة الميل ونقطة، ثم بالصورة القياسية.

معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة هي:

$$ص - ٥ = -(س - ١) ، أو ص - ٢ = -(س - ٤)$$

المعادلة بالصورة القياسية هي: $س + ص = ٦$

اكتب معادلة المستقيم في كل من السؤالين الآتيين بالصورة القياسية:

$$(20) \quad ص + 8 = \frac{11}{12}(س - 14)$$

$$\frac{154}{12} + س + \frac{11}{12} = 8 + ص$$

$$154 + 11س = 96 + 8ص$$

$$11س - 8ص = 58$$


$$(21) \quad ص - 3 = 2(س + 5)$$

$$ص - 3 = 2س + 10$$

$$ص - 6 = 5س + 5$$

$$5س - 2ص = 11$$

٢٢) اكتب معادلة المستقيم الممثل في الشكل المجاور بصيغة الميل ونقطة.



معادلة المستقيم بصيغة الميل والنقطة هي:

$$ص = ٧ + \frac{4}{3}(س - ٣)$$

٤٣) طقس: الضغط الجوي هو دالة خطية في الارتفاع. فالضغط الجوي يساوي ٥٩٨ ملتر زئبق عند ارتفاع ١,٨ كيلومتراً، ويساوي ٥٧٧ ملتر زئبق عند ارتفاع ١,٢ كيلومتراً.

أ) اكتب صيغة الضغط الجوي على صورة دالة في الارتفاع.

صيغة الضغط الجوي على صورة دالة هي:

$$d(s) = -70s + 724, \quad s \text{ تمثل الارتفاع.}$$

ب) ما الارتفاع بالكيلومترات الذي تساوي عنده قيمة الضغط الجوي ٦٥٧ ملتر زئبق؟

$$d(s) = -70s + 724$$

$$657 = -70s + 724$$

$$724 = 657 + 70s$$

$$657 = 724 - 70s$$

$$70s = 67$$

$$s = 0,957$$

الارتفاع بالكيلو مترات هو: ٠,٩٦ كيلو متر تقريراً.

مسائل مهارات التفكير العليا:

(٢٤) **اكتشف الخطأ:** يكتب كل من أنس وأيمان معادلة المستقيم المار بـالنقطتين $(3, -7)$ ، $(4, -6)$ بـصيغة الميل ونقطة. فأيهما إجابتـه صحيحة؟ فـسر ذلك.

أيمان

$$ص = 4 - \frac{9}{11}(س + 6)$$

أنس

$$ص = 7 - \frac{11}{9}(س + 3)$$

كلاهما إجابتـه خاطئـة؛ فقد استعمل علـاء النقطـة $(-3, 7)$ بدلاً من $(3, -7)$ ، واستعمل أيمـان التـغير في سـ مـقـسـومـاً عـلـى التـغير في صـ.

(٢٥) تبرير: اكتب معادلة المستقيم المارّ بال نقطتين $(-4, 3)$ ، $(8, 4)$ ، $(-7, 3)$. وما ميله؟ وأين يقطع كلاً من محوري السينات والصادات؟

معادلة المستقيم هي:

$$ص = -\frac{4}{7}س - \frac{15}{7}$$

$$\text{الميل هو: } م = -\frac{15}{7}$$

يقطع محوري السينات والصادات عند $- \frac{4}{7}$ ، $\frac{4}{15}$.

(٢٦) تحد: اكتب معادلة المستقيم المارّ بال نقطتين $(ف، ج)$ ، $(هـ، يـ)$ بصيغة الميل ونقطة.

معادلة المستقيم هي:

$$ص - ج = \frac{يـ - ج}{هـ - ف}(س - ف)$$

٤٧) مسالة مفتوحة: صنف موقفاً من واقع الحياة يتضمن معدلاً ثابتاً للتغير وقيمة للمتغير ص تقابل قيمة محددة للمتغير س ، ومثل هذا الموقف باستعمال معادلة خط مستقيم بصيغة الميل ونقطة، وبصيغة الميل والمقطع.

أنفق على ٤ ريالاً في مدينة الألعاب، وتتضمن المبلغ رسم الدخول، ولعب ٥ ألعاب سعر الواحدة منها ريالان؛ ص - ٤ = ٢ (س - ٥)؛
ص = ٢س + ٤.

٤٨) اكتب: وضح كيف يمكنك استعمال صيغة الميل لكتابة معادلة مستقيم بصيغة الميل ونقطة.

اكتب المعادلة وذلك بكتابة الكسر الذي يمثل الميل في الجزء الأيمن واتخذ (س، ص) نقطة أولى، و (س١، ص١) نقطة ثانية، ثم اضرب كل طرف من طرفي المعادلة في (س - س١) الذي يمثل مقام الكسر إلى يسار إشارة المساواة.

تدريب على اختبار

٤٩) **قسائم مشتريات:** يقدم متجر قسيمة مشتريات لعملائه بقيمة ٥ ريالات عن كل ٧٥ ريالاً من المشتريات. إذا أراد عميل أن يحصل على قسيمة شرائية بقيمة ٣٥ ريالاً، فكم ريالاً عليه أن يدفع؟

ج) ٥٢٥ ريالاً


أ) ٣٧٥ ريالاً

د) ٢٦٢٥ ريالاً

ب) ١٠٥ ريالات

الإجابة: ج)
 $\frac{22}{25}$

٣٠) أي العبارات الآتية يمثلها الشكل أدناه؟



أ) لديك ١٠٠ ريال، وتصرف ج) تحتاج ١٠٠ ريال لشراء جهاز، منها ٥ ريالات أسبوعياً.

ب) ب) لديك ١٠٠ ريال، وتتوفر ٥ ريالات أخرى أسبوعياً.
د) تحتاج ١٠٠ ريال لشراء جهاز، وتصرف ٥ ريالات أسبوعياً.

الإجابة: ب) لديك ١٠٠ ريال ، وتتوفر ٥ ريالات أخرى أسبوعياً.

مراجعة تراكمية

٣١) اكتب معادلة المستقيم المار بال نقطتين $(-4, 2)$ ، $(2, 4)$ بصيغة الميل والمقطع . (الدرس ٤٠٣)

$$\text{معادلة المستقيم هو: } ص = س - ٢$$

٣٢) اكتب معادلة المستقيم الذي ميله -2 ، وقطعه الصادي 6 بصيغة الميل والمقطع . (الدرس ٤٠٤)

$$\text{معادلة المستقيم هي: } ص = -٢ س + ٦$$

٣٣) مسرح مدرسي: يحتوي مسرح على ٧ صفوف من المقاعد المرتبة على شكل متتابعة حسابية، كما في الجدول المجاور. فإذا حضر الحفل ٣٨٦ شخصاً، فهل يكون المسرح قد تجاوز ما يستوعبه؟ (الدرس ٤٠١)

الصف	عدد المقاعد
السابع	٧٦
السادس	٦٨
الخامس	٦٠

نعم؛ فهناك ٣٦٤ مقعداً فقط.

الاستعداد للدرس اللاحق

حل كل معادلة فيما يأتي:

$$6 + 3x = 36 \quad (34)$$

$$x = 36 - 6$$

$$x = 30$$

$$x = 3$$

$$2 - b = 0 - b \quad (35)$$

$$2 = 0$$

$$2 = b$$

$$b = 2$$

$$1\frac{2}{5} = \frac{7}{5} = b$$

٤-٣

المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

تحقق

١) اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤، -١) والموازي للمستقيم $s = \frac{1}{4}s + 7$.

$$(\mathbf{s}_1 - s)L = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}$$

الخطوة ١: بما أن ميل المستقيم $s = \frac{1}{4}s + 7$ يساوي $\frac{1}{4}$

فإن ميل المستقيم الموازي له يساوي $\frac{1}{4}$ أيضاً.

الخطوة ٢: أوجد المعادلة العامة للمستقيم بصيغة الميل ونقطة.

صيغة الميل ونقطة

$$(\mathbf{s}_1 - s)L = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}$$

$$s + 1 = \frac{1}{4}(s - 4)$$

تحقق

٢) إنشاءات: تظهر على واجهة منزل عارضتان خشبيتان، مُثلت إحداهما بالقطعة المستقيمة \overline{kr} التي طرفاها $(-2, -6)$ ، $(-1, -8)$ ، و مُمثلت العارضة المتصلة بها بالقطعة المستقيمة \overline{st} التي طرفاها من $(-3, -6)$ ، $(-5, -8)$. فهل هاتان العارضتان متوازيتين؟ وضح إجابتك.

$$\frac{6}{5} = \frac{2-8}{6+1-} = \overline{v}; \text{ ميل}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{6-5}{3+8-} = \overline{js} \text{ ميل المستقيم}$$

ليستا متوازيين لأن حاصل ضرب ميلهما لا يساوي -1 .



٣) حدد ما إذا كانت التمثيلات البيانية للمستقيمات الآتية متوازية أم متعامدة، وفسر إجابتك :
 $6s - 2c = 2$ ، $c = 3s - 4$ ، $s = 4$.

$$6s - 2c = 2$$

$$2c = 6s + 2$$

$$c = 3s + 1$$

$$\text{ميل المستقيم} = 3$$

$$c = 3s - 4$$

$$\text{ميل المستقيم} = 3$$

أي المستقيمين متوازيان؛ لأن لهما نفس الميل.

ولا يوجد مستقيمات متعامدة.

تحقق

٤) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤، ٧) والمعامد للمستقيم $s = \frac{3}{2}s - 1$ بصيغة الميل والمقطع.

ميل المستقيم الأول = $\frac{2}{3}$ ، إذا ميل المستقيم الثاني = $-\frac{3}{2}$

$$s - s_1 = m(s - s_1)$$

$$s - \frac{3}{2} = 7 - (s - 4)$$

$$s + 6 + \frac{3}{2} = 7 + 7 -$$

$$s = 13 + \frac{3}{2} -$$



مثال ١

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والموازي للمستقيم المعطاة معادلته في كل مما يأتي بصيغة
الميل والمقطع :

$$1) \text{ ص} = \frac{1}{2}s - 3$$

$$\frac{2 - w}{(1 -) - s} = \frac{1}{2}$$

$$2) \text{ ص} = s + 1$$

$$3) \text{ ص} = s + 5$$

$$\text{ص} = 2\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}$$

$$٥ + ٤ = ص - ٤$$


$$\frac{4 - w}{0 - s} = 4 -$$

$$ص - ٤ = - ٤ س$$

$$ص = - ٤ س + ٤$$

مثال ٢


٣) **حديقة:** حديقة على شكل مضلع رباعي
رؤوسه: أ (-١، ٢)، ب (٣، ٣)، ج (٥، ٧)،
د (-٣، ٤)، يقطعها الممран أ ج ب د . فهل
هذان الممران متعامدان؟ فسر إجابتك.



نعم المتران متعامدان؛ لأن ميل $\overline{AJ} = \frac{6}{7}$ ، وميل $\overline{f} = \frac{7}{6}$

وحاصل ضربهما - ١.

٤) هندسة: المربع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، وكل ضلعين متجاورين متعامدان، وقطراته متعامدان أيضًا.
حدد إذا كان الشكل الرباعي في هي هل مربعًا أم لا، وفسر إجابتك.



بما أن القطعتين المستقيمتين $y = \overline{gt}$ ، $y = \overline{gi}$ موازيتان لمحور الصادات فهما متوازيان، وبما أن $y = \overline{t}$ ، $y = \overline{gi}$ موازيان لمحور السينات فهما متوازيان ، $y = \overline{t}$ عمودية على كل من $y = \overline{t}$ ، $y = \overline{gi}$ وبالمثل $y = \overline{gt}$ عمودية على كل من $y = \overline{t}$ ، $y = \overline{gi}$ وبما أن ميل $y = \overline{t} = -1$ وبما أن ميل $y = \overline{gt} = 1$ وبما أن ميل إحدى القطعتين المستقيمتين مقلوب معكوس ميل الأخرى فإن $y = \overline{gt}$ و يكون الشكل الرباعي الناتج مربع.

مثال ٣

حدد إذا كانت التمثيلات البيانية للمسنوبات في كل من السؤالين ٥، ٦ متوازية أم متعامدة، وفسر إجابتك.

$$5) \quad s = -2x, \quad 2s = x, \quad 4s = 2x + 4$$

تمثيل $s = -2x$ يعادل التمثيل البياني للمستقيمين الآخرين ميله مقلوب معكوس ميل الآخر $2s = x$ و $4s = 2x + 4$ متوازيان؛ لأن الميل متساوي.

$$6) \quad ص = \frac{1}{2}س, \quad 3ص = س, \quad ص = -\frac{1}{2}س$$

ليس بينهما توازي أو تعمد؛ لأنه ليس هناك علاقات بين ميل كل مستقيم منهم.

مثال ٤

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والمعادل للمستقيم المعطاة معادله في كل مما يأنى :

$$7) \quad (-2, 3), \quad ص = -\frac{1}{2}س - 4$$

ميل المستقيم المطلوب = ٢

$$\frac{3 - w}{(-2) - s} = 2$$

$$ص - 3 = 2س + 4$$

$$ص = 2س + 7$$

$$ص = ٣ + ٥ \quad (٨)$$

$$\text{میل المستقیم المطلوب} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{4 - w}{(1 -) - s} = \frac{1}{3}$$

$$ص - ٤ = \frac{1}{3}(١ + س)$$

$$ص = س \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$$

تدريب وحل المسائل:



مثال ١

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والموازي للمستقيم المعطاة معادلته في كل مما يأتي:

$$(9) \quad ص = 3 - 5x \quad (4, 3)$$

$$\text{ميل المستقيم المطلوب} = 3$$

$$\frac{(3) - w}{4 - s} = 3$$

$$ص + 3 = 3s - 12$$

$$ص = 3s - 15$$

$$\Delta + \text{S}^5 = (2,0) \quad (10)$$

$$m = 5$$

$$\frac{2-w}{0-s} = 5 -$$

$$s^5 - = \text{S}$$

$$\Delta + \frac{3}{4} = (3,2-) \quad (11)$$

$$m = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3-w}{(2-)-s} = \frac{3}{4} -$$

$$(2+s)\frac{3}{4} - = 3 - \text{S}$$

$$\text{S} = s \frac{3}{4} -$$

٤) (١٢، ٩)، ص = ١٣ س -


$$م = ١٣$$

$$\frac{12 - w}{9 - s} = 13$$

$$ص = ١٣ س - ١٠٥$$


مثال ٢

١٣) هندسة: يمثل الشكل جـ دـ هـ و طائرة ورقية.
هل قطراتها متعامدان؟ فسر إجابتك.



نعم؛ لأن ميلهما = $\frac{2}{3}$ وحاصل ضربهما - 1.

١٤) هندسة: شبه المترافق هو شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط. فهل الشكل أب جـ د شبه متراافق؟ فسر إجابتك.



نعم؛ لأن ميل \overline{f} = ميل \overline{d} = $\frac{1}{3}$

١٥) حدد ما إذا كان المستقيمان ص = -٦س + ٤، ص = $\frac{1}{6}$ س متعامدين أم لا، وفسر إجابتك.

نعم؛ متعامدان لأن ميلهما -٦ و $\frac{1}{6}$

مثال ٣

حدّد ما إذا كانت التمثيلات البيانية للمستقيمات في كل من السؤالين ١٥، ١٦ متوازية أم متعامدة، وفسر إجابتك:

١٦) ٢س - ٨ص = -٤، ٤س + ص = ٢، س - ٤ص = ٤

٢س - ٨ص = -٤ و ٤س + ص = ٢ متعامدان.

٢س - ٨ص = -٤ و س - ٤ص = ٤ متوازيان.

١٧) ٣س - ٩ص = ٩، ١٢ + ٢س = س + ٣ص

جميعها متوازية

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة والمعادل للمستقيم المعطاة معادله في كل مما يأتي:

$$ص = ٤ - ٢س \quad (١٨)$$

$$\frac{1}{2} = م$$

$$\frac{(2-) - w}{(3-) - s} = \frac{1}{2}$$

$$ص = ٤ + س - ٣$$

$$ص = س - ١$$

$$\frac{1}{2} - س = \frac{1}{2} ص$$

$$ص = \frac{١}{٣} س - ٣ \quad (١٩)$$

$$٤ - = م$$

$$\frac{2 - w}{(5-) - s} = ٤ -$$

$$ص = ٤ - س - ٨$$

$$٢٠) ص = \frac{١}{٣} س + ٦$$

$$م = ٣ -$$

$$\frac{٥ - w}{(٤ -) - s} = ٣ -$$

$$ص - ٥ = ٣ س - ١٢$$

$$ص = ٣ س - ٧$$

مثال ٤

٢١) اكتب معادلة المستقيم المعماد للمستقيم $ص = -\frac{١}{٢} س - ٤$ والمار بقطعه السيني بصيغة الميل والمنقطع.

$$ص = ١٦ + ٢ س$$

حدّد ما إذا كان المستقيمان في كل مما يأتي متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك:

$$٢٢) ص = ٤ س + ٣$$

$$٤ س + ص = ٣$$

غير ذلك

$$23) \quad s = -2s$$

$$3s + s = 2s$$

متوازيان

$$24) \quad 3s + 5s = 10$$

$$6s - 3s = 5$$

متعامدان

25) اكتب معادلة المستقيم الموازي للمستقيم $s = 7 - 3x$ والمار بنقطة الأصل.

$$v = m$$

$$\frac{\mathbf{0} - \mathbf{w}}{\mathbf{0} - \mathbf{s}} = v$$

(٢٦) علم الآثار: وجد عالم آثار في منطقة ما قطعة فخارية عند النقطة (٦، ٢)، وقطعة معدنية عند النقطة (٤، ١)، فهل يتعامد المستقيم المار بكل من القطعة الفخارية والقطعة المعدنية مع المستقيم المار بال نقطتين (٧، ٧)، (١٤، ١٠)؟ فسر إجابتك.


نعم المستقيمان متوازيان متعامدان ميل الأول = $-\frac{7}{2}$ وميل الثاني = $\frac{2}{7}$.

(٢٧) تصميم: أنشأ عبدالله تصميماً باستعمال برنامج حاسوبي حيث رسم قطعة مستقيمة تمر بالنقطتين (١، ٢)، (٤، ٣)، ثم قطعة أخرى تمر بالنقطتين (٢، ٧)، (٨، ٣)، فهل تصلح هذه النقاط لتكون رؤوساً للمستطيل؟ فسر إجابتك.

لا، القطعة المستقيمة الواقلة بين (-٢، ١)، (٤، ٣) لا تعتمد القطعة المستقيمة الواقلة بين (٤، ٣)، (٨، -٣).

٤٨) تمثيلات متعددة: ستكشف في هذه المسألة المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة.

أ) بيانياً، مثل النقاط أ(-٣، ٣)، ب(٣، ٥)، ج(-٤، ٣) على المستوى الإحداثي.



ب) تحليلياً، حدد إحداثيات النقطة الرابعة التي تشكل متوازي أضلاع من النقاط الأربع، وفسّر إجابتك.

النقطة د (٢ ، ٢)

$$\text{أ } \overline{f} , \text{ ج } \overline{d} \text{ لها نفس الميل} = \frac{1}{3}$$

$$\text{أ } \overline{g} , \text{ ب } \overline{d} \text{ لها الميل نفسه} = 3$$

مسائل مهارات التفكير العليا:

٢٩) **نحو:** إذا وازى المستقيم المار بال نقطتين $(-4, 2)$ ، $(5, 0)$ المستقيم $s = 3x + 4$ ، فما قيمة d ؟

المستقيم $s = 3x + 4$ ميله يساوي ميل المستقيم المار بال نقطتين

$-(-4, 2), (5, 0)$ يساوي ٣.

$$\frac{4 - 0}{2 + 5} = 3$$

$$4 = 6 + 3d$$

$$4 = 6 - 3d$$


$$d = 2$$

٣٠) تبرير: هل المستقيم الأفقي يعادل المستقيم الرأسي أحياناً أم دائمًا أم لا يعادله أبداً؟ فسر إجابتك.

دائمًا المستقيم الأفقي يعادل المستقيم الرأسي؛ لأن تقاطعهما بشكل زوايا قائمة.

(٣١)

مسالة مفتوحة: مثل بيانياً مستقيماً يوازي المستقيم $y = 2x - 1$ ، ومستقيماً آخر يعادله.



اكتشف الخطأ:

(٣٢) يحاول فيصل وأسامي إيجاد معادلة المستقيم العمودي على المستقيم ص = $\frac{1}{3}s + 2$ والمدار بالنقطة (-٣، ٥). فما إجابتهما صحيحة؟ فسر إجابتك.

أسامة

$$\begin{aligned} ص - 5 &= 3 - (س - (-3)) \\ ص - 5 &= 3 - (س + 3) \\ ص &= س - 9 + 3 \\ ص &= س - 6 \end{aligned}$$

فيصل

$$\begin{aligned} ص - 5 &= 3 - (س - (-3)) \\ ص - 5 &= 3 - (س - 3) \\ ص &= س - 3 - 9 + 3 \\ ص &= س - 6 \end{aligned}$$

إجابة فيصل هي الصحيحة؛ لأنّه حدد ميل المستقيم العمودي بشكل صحيح.

**٣٣**

اكتب: وضع كيف يمكنك أن تحدد ما إذا كان مستقيمان معطيان متوازيين أم متعامدين.

إذا كان ميل المستقيمان متساوياً فإنّهما متوازيان، إذا كان حاصل

ضرب ميلهما يساوي - ١ فإنّهما متعامدان.

تدريب على اختبار

٣٤) أي نقطتين فيما يأتي يمر بهما مستقيم يوازي مستقيماً

ميله $\frac{3}{4}$ ؟

ج) (٢، ٠)، (٠، ٠)

أ) (٥، ٠)، (٢، ٤)

د) (٢، ٠)، (٢، ٤)

ب) (٢، ٠)، (٤، ١)

الإجابة: أ) (٥، ٠)، (٢، ٤)

٣٥) اجابة قصيرة، يملاً خالد بركة ماء سعتها ٦٠٠٠ غالون بمعدل ثابت، وبعد ٤ ساعات كان في البركة ٨٠٠ غالون. فما عدد الساعات اللازمة لملء البركة كاملة؟

$$\text{عدد الساعات} = \frac{6000 - 800}{800} = 30 \text{ ساعة}$$

مراجعة تراكمية

اكتب كل معادلة مما يأتي بالصورة القياسية: (الدرس ٣٠٣)

$$ص - ١٣ = ٤(س - ٢) \quad (٣٦)$$

$$ص - ١٣ = ٤(س - ٤) \quad$$

$$ص - ١٣ = ٤س - ٨ \quad$$

$$٤س - ص = ٥ \quad$$

$$ص - ٢ = ٥(س + ٢) \quad (٣٧)$$

$$ص - ٥ = ٢(س + ٢) \quad$$

$$ص - ٥ = ٢س - ٤ \quad$$

$$٢س + ص = ١ \quad$$

$$ص + ٣ = ٥(س - ١) \quad (٣٨)$$

$$ص + ٣ = ٥(س - ١)$$

$$ص + ٣ = ٥س - ٥$$

$$٨ = ص + ٥$$

(٣٩) تأجير قوارب: استأجر محمود ورفاقه قاربًا لمدة ٣ ساعات مقابل ٩٠ ريالاً. (الدرس ١٠٢)

أ) اكتب معادلة خطية لإيجاد التكلفة الكلية (ك) لاستئجار القارب مدة (ه) ساعة.

$$ك = ١٥ + ٥٢٥$$


ب) كم ريالاً يكلف استئجار القارب مدة ٨ ساعات؟

$$ك = ١٥ + ٨ \times ٢٥$$

$$ك = ١٥ + ٤٠٠$$

$$ك = ٤١٥ \text{ ريالاً}$$

٤٠) مثل المستقيم $y = 3x - 2$ بيانياً. (الدرس ١-٣)



٤١) أوجد المقطعين السيني والصادي للمستقيم $y + 2x = 8$ (الدرس ٢-٣)

$$\text{المقطع السيني} = 4$$

$$\text{المقطع الصادي} = 8$$

الاستعداد للدرس اللاحق

حُلَّ كُلُّ مُعَادِلَةٍ فِيمَا يَأْتِي:

$$67 - L = 104 \quad (42)$$

$$67 - L = 104$$

$$67 + 104 = L$$

$$L = 171$$

$$7 - S = 4 - (43)$$

$$7 - S = 4 -$$

$$S = 4 -$$

$$S = 3 -$$

$$١٤ = \frac{٢}{٣} (٤٤)$$

$$14 = ص \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{2} \times 14 = \frac{3}{2} \times ص \frac{2}{3}$$

$$ص = ٢١$$

$$٢٧ - = \frac{٩}{س} (٤٥)$$


$$27 - = \frac{9}{s}$$

$$٩ = س ٢٧ -$$

$$\frac{1}{3} - = \frac{9}{27} - = س$$

اختبار الفصل

١) مثل المعادلة $s = 2t - 3$ بيانياً.



٢) اختيارات متعددة: اشتري أسامي فطيرة بيتزا بـ ٢٨ ريالاً وعددًا من علب العصير، ما المعادلة التي تعبر عن المبلغ الإجمالي (t) الذي دفعه أسامي، إذا كان ثمن علبة العصير ١,٥ ريال؟

أ) $t = 28s + 1,5$

ب) $t = 29,5s$

ج) $t = 1,5 + 28s$

د) $t = 1,5s - 28$

٣) قوارب: اكتب بصيغة الميل والمقطع المعادلة التي تمثل تكلفة استئجار قارب (ص) واستعماله مدة (ن) ساعة.



$$ص = ٦٠ + ٩n$$

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم في كل من الحالات التالية:

٤) يمر بالنقطة (-٤، ٢)، وميله يساوي -٣

$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

$$ص - ٢ = -٣(س + ٤)$$

٥) يمر بالنقطة (٣، -٥)، وميله يساوي $-\frac{2}{3}$

$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

$$ص + ٥ = -\frac{2}{3}(س - ٣)$$

٦) يمر بال نقطتين (١، ٤)، (١٠، ٣)

$$\frac{ص - ص_1}{س - س_1} = م$$

$$\frac{4 - 10}{1 - 3} =$$

$$3 = \frac{6}{2} =$$

$$ص = م س + ب$$

$$ب + (١ \times ٣) = ٤$$

$$ب = ١$$

$$ص = ٣ س + ١$$

٧) يمر بال نقطتين (٠، ٤)، (٠، ٣)

$$\frac{ص - ص_1}{س - س_1} = م$$

$$\frac{4 - 0}{4 - 3} =$$

$$\frac{4}{7} = \frac{4}{7} =$$

$$ص = م س + ب$$

$$ب + (٠ \times \frac{4}{7}) = ٤$$

$$ب = ٤$$

$$ص = ٤ س + \frac{4}{7}$$

٨) يمر بال نقطتين (٢،٥)، (٤،٨)

$$\frac{ص_1 - ص_2}{س_1 - س_2} = م$$

$$\frac{5 - 8}{2 - 2} =$$

$$\frac{3}{4} - =$$

$$ص = م س + ب$$

$$ب + \left(٢ \times \frac{3}{4} - \right) = ٥$$

$$\frac{3}{2} + ٥ = ب$$

$$6\frac{1}{2} = ب$$

$$6\frac{1}{2} + س \frac{3}{2} - = ص$$

٩) اكتب المعادلة $s + 3 = \frac{1}{2}(s - 5)$ في الصورة القياسية.

$$s + 3 = \frac{1}{2}(s - 5)$$

$$s + 3 = \frac{1}{2}s - \frac{5}{2}$$

$$s + 6 = s - 5$$

$$s - 2s = 11$$

اكتب بصيغة الميل والمقطع كل معادلة فيما يأتى:

$$10) s - 3 = 4(s + 3)$$

$$s - 3 = 4(s + 3)$$

$$s - 3 = 4s + 12$$

$$s = 4s + 15$$

$$(s - \frac{1}{2}) = 1 + s$$

$$(s - \frac{1}{2}) = 1 + s$$

$$s - \frac{1}{2} = 1 + s$$

$$s - \frac{1}{2} = 1 + s$$

$$(s - \frac{1}{2}) = 1 + s$$

$$s - \frac{1}{2} = 1 + s$$

$$s - \frac{1}{2} = 1 + s$$

$$s - \frac{1}{2} = 1 + s$$

١٣) يُّبَيَّن ما إذا كان المستقيمان :
 $s = -6s + 8$ ، $s = 3s + \frac{1}{2}s = -3$ متوازيين ، أم متعامدين ،
أم غير ذلك . وفسّر إجابتك .

$$s = -6s + 8 \quad \text{أي الميل} = -6$$

$$s = 3s + \frac{1}{2}s = -\frac{1}{2}s$$

$$6s + s = -6$$

$$s = -6s - 6 \quad \text{أي الميل} = 6$$

بما أن ميلهما متساوي إذا هما متوازيان .

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة
والمعامد للمستقيم المعطاة معادلته في كل مما يأتي :

$$14) (3, -4), s = -\frac{1}{3}s - 5$$

$$\text{الميل} = 3$$

$$s - s_1 = m(s - s_1)$$

$$s + 4 = 3(s - 3)$$

$$s + 4 = 3s - 9$$

$$s = 3s - 13$$

$$ص = ٤ + ٣ - (٠ ، ٠)$$

$$\text{الميل} = \frac{1}{2}$$

$$ص - ص_١ = م(س - س_١)$$

$$ص + \frac{1}{2} = ٣ - (س - ٠)$$

$$ص + \frac{1}{2} س = ٣$$

$$ص = \frac{1}{2} س - ٣$$

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة والموازي للمستقيم المعطاة معادلته في كل مما يأتي بصيغة الميل والمقطع:

$$ص = ٥ - ٤ س + ٤$$

$$ص = ٦ - ٤ س$$

$$ص = ٦ - ٤ س$$

$$ص = \frac{4}{5} س - \frac{6}{5}$$

$$ص - ص_١ = م(س - س_١)$$

$$ص + ٥ = \frac{4}{5}(س + ٤)$$

$$ص + \frac{4}{5} س = ٥ + \frac{16}{5}$$

$$ص = \frac{4}{5} س - \frac{9}{5}$$

$$ص - ٢س = ٤ - (١ - ٤)$$

$$ص - ٢س = ٠$$

$$ص - ٢س = س$$

$$ص = س - \frac{1}{2}$$

$$ص - ص_١ = م(س - س_١)$$

$$ص + \frac{1}{2} = س + \frac{1}{2}$$

$$ص + \frac{1}{2} س - \frac{1}{2} س = س + \frac{1}{2}$$

$$ص = س + \frac{1}{2}$$

١٨) اختيار من متعدد: ثمن وجبة الطعام في أحد المطاعم
١٢ ريالاً مضافاً إليها ٢٥٠ ريال لكل نوع إضافي من
المقبلات. أي المعادلات الآتية تمثل ثمن وجبة طعام مع
العدد(t) من المقبلات.

ج) $ص = ٢,٥ + ١٢ ت$

أ) $ص = ١٢ + ٢,٥ ت$

د) $ص = ٢,٥٠ - ١٢ ت$

ب) $ص = ١٤,٥٠ ت$

الإجابة: ج) $ص = ١٢ + ٢,٥ ت$

اختبار تراكمي

اختيار من متعدد:

اقرأ كل سؤال فيما يأتي، ثم اختر رمز الإجابة الصحيحة:

١) إذا كان للمستقيم ميل موجب ومقطع صادي سالب، فماذا يحدث للمقطع السيني إذا زاد كل من الميل والمقطع الصادي إلى مثليه؟

أ) يصبح المقطع السيني أربعة أمثال الأصلي.

ب) يصبح المقطع السيني مثل الأصلي.

ج) يصبح المقطع السيني $\frac{1}{2}$ الأصلي.

د) يبقى المقطع السيني كما هو.

٢) يبين الجدول أدناه العلاقة بين درجات الحرارة السيليزية والفهرنهايتية. فأي المعادلات الخطية الآتية تمثل هذه العلاقة؟

الدرجات الفهرنهايتية (ف)	الدرجات السيليزية (س)
٥٠	١٠
٥٩	١٥
٦٨	٢٠
٧٧	٢٥
٨٦	٣٠

$$ا) ف = ٣٥ + \frac{٨}{٥} س$$

$$ب) ف = ٤٢ + \frac{٤}{٥} س$$

$$د) ف = ٢٦ + \frac{١٢}{٥} س$$

$$ج) ف = ٣٢ + \frac{٩}{٥} س$$

الإجابة: ج) $ف = \frac{9}{5} س + 32$

٣) ميل المستقيم المار بال نقطتين $(5, 0)$ ، $(6, 2)$ يساوي:

جـ) ٢

$\frac{1}{2}$ (أ)

د) -٢

$-\frac{1}{2}$ (ب)

الإجابة: ب) - $\frac{1}{2}$

٤) حل المعادلة: $\frac{s}{12} = 5$ هو:

ج) ١٧

د) ٦٠

أ) $\frac{12}{5}$

ب) $\frac{5}{12}$

$$5 = \frac{s}{12}$$

$$5 \times 12 = \frac{s}{12} \times 12$$

$$s = 60$$

الإجابة: د)

٥) حل المعادلة: $9 - 3t = 6 + t$ هو:

جـ

دـ

أـ

بـ

$$6 + 3t = 9 -$$

$$6 - 6 + 3t = 6 - 9 -$$

$$3t = 15 -$$

$$t = 5 -$$

الإجابة: جـ

٦) حل المعادلة: $3(b + 4) = 23$ هو:

١٥ ج)

٧ (أ)

٢٦ د)

١١ ب)

$$3(b + 4) = 23$$

$$3b + 12 = 23$$

$$12 - 12 + b^3 = 23 - 12$$

$$b^3 = 11$$


$$b = \sqrt[3]{11}$$

الإجابة: أ)

إجابة قصيرة

أجب عن الأسئلة الآتية:

٧) مثل الدالة $ص = ٢س + ٣$ بيانياً.



ص	س
٣	٠
١	-٠,٥

٨) وضح كيف تحدد ما إذا كان مستقيمان متوازيين أم متعامدين.

يمكن تحديد المستقيمان المتوازيان إذا كان الميل متساوي أما إذا كان ميل أحدهما يساوي مقلوب معكوس ميل الآخر فهما متعامدان.

٩) حل المعادلة $2(s-1)=8$ إذا كانت مجموعة التعويض هي:
. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$$8 = 2(s - 1)$$

$$8 = 2s - 2$$

$$2 + 8 = 2 + 2s$$

$$10 = 2s$$

$$s = 5$$

م.ح: $\{5\}$

١٠) اكتب كلاً من مجال ومدى العلاقة:
 $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)\}$.

المجال: $\{1, 2, 3, 4\}$

المدى: $\{3, 4, 5, 6\}$

١١) حدد ما إذا كانت العلاقة الآتية دالة أم لا، وفسر إجابتك:
 $\{(8, 4), (6, 4), (4, 2), (2, 1), (0, 0)\}$

نعم العلاقة يمكن أن تكون دالة؛ لأن كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد من المدى.

١٢) حل المعادلة: $|s - 6| = 11$.

$$s - 6 = 11$$

$$s - 6 = 11$$

$$s - 6 = 11$$

$$s = -5$$

$$s = 17$$

م.ح : $\{-5, 17\}$

١٣) حل المعادلة: $220 - 5s = 220$

$$220 - 5s = 220$$

$$220 - 5s = 220 - 5s$$

$$0 = 220 - 220$$

$$0 = 220 + 220 - 220$$

$$220 = 220$$

$$s = 11$$

م.ح: {١١}

١٤) اكتب المعادلة: $25 - 5s = 35$ ص بالصورة القياسية.

$$25 - 5s = 35$$

$$35 - 5s = 25$$

$$5s - 5s = 7$$

إجابة مطولة

أجب عن كل سؤالٍ موضحاً خطوات الحل:

١٥) اشتري مروان سيارة بـ ٧٥٠٠٠ ريال، إذا كانت قيمة السيارة تتناقص بمعدل ٥٠٠٠ ريال سنوياً.

أ) كُون جدولًا يبين قيمة السيارة بعد عام، وعامين، و٣ أعوام، و٤ أعوام من شرائها.

السنوات	٤	٣	٢	١	الأعوام
قيمة السيارة	٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	قيمة السيارة

ب) لتكن (ن) عدد السنوات منذ شراء السيارة، اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد (ق) قيمة السيارة بعد (ن) سنة.

$$q = 75000 - 5000n$$

ج) استعمل المعادلة التي كتبتها، وأوجد قيمة السيارة بعد ٨ سنوات من تاريخ شرائها.

$$q = 75000 - 5000(8)$$

$$= 35000$$